

522.2 ✓

Phyt. 460

Historia naturalis. Regn. vegetab.

~~Florae~~ 644
Systemata & meth.

~~Phyt. = N^o 548.~~

7.


COMPENDIUM
REGNI VEGETABILIS
QUOD
IN USUM
SUORUM AUDITORUM
ELUCUBRATUS EST

AUGUSTINUS MICHELAZZI

PROTONOT. APOST. CÆS. REG. IN GORIT.

LICEO PHYSICES ET HIST. NAT.

PROF. PUBL. ET ORD.



TYPIS VALERII DE VALERIIS CÆS. REG. GUB.
TYPOGRAPHI, ET BIBLIOPOLÆ.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

Est animorum, ingeniorumque natu-
rale quoddam quasi pabulum con-
sideratio contemplatioque Naturæ.
Cic. Quæst. Acad. 2. Cap. 41.

P R A E F A T I O.

Clarissimi Viri Caroli Linnæi noti sunt
 Reipublicæ litterariæ, ac egregii
 plane in Re Herbaria labores. Hoc Ma-
 gistro potissimum usus, illius lucubra-
 tiones in rem meam verti, eo consilio,
 ut discipulis, quibus nulla est librorum
 supellex, & prodessem, & eos ad pul-
 cherrimum æque, ac utilissimum Historiæ
 Naturalis studium animarem. Nihil igi-
 tur hoc in libello mihi tribuo, sed totum
 summo illi viro; tum Pontederæ, Du-
 hamel, Geoffroy, aliisque. Amicis *
 etiam, a quorum humanitate ac bene-
 volentia clarissimorum, quos memini, vi-
 rorum opera commodata habui, laborem
 mire levatum, atque adeo opellæ partem
 non exiguam gratus adscribo. Id modo
 efficere conatus sum, ut, quæ ii diversis
 ediderunt libris, paucis paginis indica-
 rem, atque ad tironum intelligentiam ac-
 commodarem; quod an assequutus sim,
 Benevolus Lector judicabit.

* Nob. ac Cl. Viri Ant. Pravidali J. U. D.
 Barth. Patuna Med. D. Georg. Alles. Joann.
 Bapt. Tunis, & D. Laur. Morandini.

INDEX CAPITUM

SECTIO I.

DE PLANTARUM NOTIONE ET DISPOSITIONE.

CAP. I. De Plantarum vita & familiis .	pag.	1
CAP. II. De Plantarum organis, radice, & caudice .	- - - - -	11
CAP. III. De flore & fructu .	- - -	25
CAP. IV. De floris & fructus natura - - -	- - -	46
CAP. V. De actu, quo secundum redditur semen .	- - -	57
CAP. VI. De caprificatione .	- - -	70
CAP. VII. De Plantarum sexu .	- - -	80
CAR. VIII. De variis Plantarum systematibus .	- - -	86
CAP. IX. Classes, Ordines, & Genera Plantarum .	- - - - -	121

SECTIO II.

DE PLANTARUM VIRIBUS.

CAP. I. De modo vires Plantarum explorandi .	161
CAP. II. De Plantarum in genere & viri- bus convenientia .	172
CAP. III. De Naturalibus Plantarum Ordinibus .	176
CAP. IV. De quorundam Ordinum Nat. viribus .	187
CAP. V. De Plantarum tum liquidis tum con- cretis succis, eorumque viribus .	217
CAP. VI. De Plantarum sapore .	242
CAP. VII. De Plantarum odore .	257
CAP. VIII. De Plantarum colore, natali loco, easque colligendi tempore .	264

SECTIO I.

DE PLANTARUM NOTIONE ET DISPOSITIONE

CAPUT I.

De Plantarum vita, & familiis.

I.



OMNIA Telluris nostræ corpora in tres classes, tria Historiæ Naturalis regna constituentes, dividuntur. Alia tantum crescunt, ut in *Compendio Regni lapidei* innuimus, & *lapideum* regnum efficiunt; alia & crescunt, & vivunt, in regno *vegetabili* comprehensa; alia & crescunt, & vivunt, & sentiunt, ex quibus regnum *animale* consurgit. Plantæ quidem sensu destituuntur, eas tamen æque ac animalia vita esse præditas, manifesta inter hæc corpora analogia comprobant. Organorum structura in utrisque mirabilis deprehenditur, ut ex Malpighii

ghii & Grewii plantarum anatomia elucet. Cui bono tantus vasorum N. 5. 6. apparatus? Scilicet ut vegetabilia quoque nutrimentum de terra capiant, digerant, & per glandulas undique apte fecernant. Spontaneus ergo humorum propulsus adsit, necesse est; in hoc a Cl. Linnæo vegetabilium vita generatim accepta constituitur: id enim vivere dicimus, in quo motum non interruptum invenimus. Plantarum igitur vita ab ea, qua animalia fruuntur, in sanguinis nempe circulatione ab Harvæo reposita, haud multum abludit, ea solum inter utramque intercedente differentia, quod animalium vita sensu gaudeat, minime vero vegetabilium. Annon idem plantarum, & animalium ex femine seu ovo N. 27. ortus? Annon actus, quo fecunda redduntur semina, in utrisque pernecessarius N. 28. 29.? Annon eadem ætatis vicissitudines? *Infantiam* velut primum infirmam, imbecillem, flore, & fructu destitutam animadvertimus; *juventutem* dein omni cum venustate luxuriantem, speciosisque su-

per-

perbientem floribus ; tum *virilitatem* robustam, fertilem, fructus ferentem ; denique *senectutem* languidam, variis afflictam morbis, donec tandem, ut in animantibus, mors ipsa sequatur, seu humorum propulsus cesset, planta exarescat, putrescat, in terram veratur, unde primos duxit ortus.

- * Hiemis tempore plantæ calido in conclavi servatæ lucem versus inclinantur, inque fenestrarum foramina sese insinuant. Plures præsertim *luteis compositis floribus* motum solis sequuntur. Aliæ sereno cœlo flores pandunt, & veluti hilari vultu luce ipsa perfrui videntur, nocte vero, aut ingruentibus imbribus eosdem complicant, & ab injuriis aeris tuentur. Aliæ e contra, postquam sol occubuit, flores aperiant, amœnumque spargunt odorem, ut in *Cacto grandifloro*, *Geranio tristi* &c. videre est. *Draba verna*, *Euphorbia germanica*, *Geranium striatum*, *Ranunculus polyanthemus* &c. nocturno tempore flores suos deorsum somno quasi correptæ demittunt. *Trifolia*, *Oxalis*, *Hymenæa*, *Mimosæ*, *Cassia* &c. folia ante procellas complicant, sereno vero cœlo explicant. Annon hæc in vegetabilibus motum denotant? Plantas vivere etiam Veterum quidam opinati sunt ; sed justo longius progressi, eisdem animam ad-

dixerunt; tria enim animarum genera con-
fingentes *rationalem* hominibus, brutis *sen-*
sitivam, *vegetativam* plantis attribuerunt.

2. Aliæ præterea qualitates anima-
lia inter & plantas analogiam indicant.
Animalia equidem mutationibus ob-
noxia advertimus præprimis Insecta,
ut alla brevitatis causa præteream,
Larvam enim glabram, longam spino-
sam, maxillis & quatuordecim instru-
ctam pedibus invenimus, ex hac *Pa-*
pilionem, quatuor præditum alis, for-
mari, quis, nisi id videat, sibi per-
suadebit? Ex levi autem, albo, longo,
ad caudam pellucido, & intra terram
recondito verine annon durus, niger,
alis & squamulis tectus *Scarabæus* ex-
furgit? Vegetabilia quoque vicissitudi-
nibus subjecta sunt: aliis exornata sunt
foliis, dum e terra primum erumpunt,
ut non nisi a peritis agnoscantur; aliam
dein induunt formam, flores expan-
dunt, seseque noscenda præbent; tan-
dem plurima ex his, productis ovu-
lis, seu seminibus, emoriuntur, ac pe-
reunt, uti ex insectis plurima id tan-
tummodo, facta formæ mutatione,

curare videntur , ut copulentur , & ovula deponant , tum citissime intereant.

* *Hedera* oblongis primum foliis , & utrinque sensim extremitatem versus attenuatis gaudet ; dein foliis , in quinque distantes partes ad medium divisus , induitur ; in medio vitæ suæ curriculo constituta , in tres tantum distantes partes distincta ad medium , folia protrudit ; denique senio velut jam correpta , ovata expandit folia.

3. An non plantæ , & quidem quo teneriores , eo avidius somno indulgent , non fecus ac animalia ? Hoc est , annon vegetabilia quoque quam plurima , ut ipsa animalia , formam quasi faciemque noctu diversam induunt ab ea , quam interdiu præ se ferunt ? Simia hominis instar lateri noctu incumbere , & integumento se ad caput usque obtegere dicitur . Camelus , capite anteriores inter pedes posito somnum capit . Potior avium pars intra alam caput recondit . Insecta pleraque , posterioribus suspensa pedibus , quieti se tradunt . Hac ratione plures plantæ

Sua noctu folia contrahunt , & complicant , non tam ut a ventis procel-
lisque se tueri , sed etiam ut , quiete
tranquilla fruantes , novas quasi vires
recuperare videantur : & profecto si
quis æstivo tempore prata , sylvas , hor-
tos noctu perlustret , novam fere rerum
faciem conspiciet . In aliis folia duo op-
posita , occumbente sole , tam arcte ad
se mutuo applicantur , ut in unicum
veluti abeant , sic in *Atriplice hortensi* ,
Asclepiade &c. In aliis folia ad hori-
zontem posita sursum noctu eriguntur ,
& caulem aut ramorum apicem cin-
gunt , ita ut infundibuli formam refe-
rant , ut in *Iva annua* , *Parthenio* &c.
In aliis supremæ petiolorum extremi-
tates interdiu erectæ , nocturno tem-
pore reflectuntur , ita ut folia , ad ho-
rizontem patentia , ad perpendiculum
circumcirca scuti instar , aut fornicis
pendeant , ut in *Hibisco sabdariffa* ,
Milleria quinqueflora &c. In aliis nocte
foliola apicibus concurrunt , & intra
se cavum formant , ut in *Trifolio re-*
supinato ac *incarnato* &c. In aliis quie-
tis tempore pendentia omnino foliola

evadunt, ut in *Lupino albo*, *Robinia pseudasacia* &c.

- Nocturnam hanc foliorum motionem ex eo quidam fieri autumant, quod calore solis, aut luce folia, eorumque petioli molliores reddantur, & flaccescant, nocte vero propter frigus, aut humores coarctentur. Cur ergo iis etiam in cellis, in quibus diu noctuque idem caloris gradus conservatur, aut forte major noctu excitatur, plantæ se vesperi contrahunt, summo autem mane sese iterum expandunt? Hoc ipsum Cl. Mairan *Mem. de l'Acad.* 1729. & Cl. Duhamel Dumonceaux *Physique des Arbres* in planta, quam *sensitivam spinosam* appellat, expertus est, in loco licet obscurissimo, eodem coloris gradu interdium, & noctu servato. Hic igitur vegetabilium motus nec luci nec solis calori attribuentus videtur.

4. Plantarum nomine ea corpora intelligimus, quæ ita exquisitis instructa sunt organis, ut iis duntaxat, certo loco affixa, & nutrimentum de terra, aereque capere, & digerere, & apte undique distribuere valeant. Hæc Cl. Linnæus in septem familias divisit. L.


In *Fungos*, quos imperfectas plantas quidam vocant; hi ex habitu externo, & ipso ortu ab aliis vegetabilibus facile dignoscuntur, eorum enim substantia neutiquam herbacea est, sed poris, squamis, lamellulis distincta, quandoque densa, & solida. Pluribus duæ partes sunt, altera ex terra prodit, *stipesque* nuncupatur, altera, & quidem lata, ac rotunda priori insidet, *pileique* nomine insignitur. Alii fungi stipite destituuntur, solaque pilei substantia vegetabilibus, & faxis accrescit; alii, pauci hi pileo carentes, ex unico stipite constant. II. In *Algas*, quarum radices folia, & caudices in unum coacervantur. In maris quoque Adriatici limosis littoribus algam invenire est, seu folia duos tresve pedes longa, tenuia, parum, at æqualiter lata, quibus probe exsiccatis vitra, aliaque fragilia corpora, alio expedienda, involvi solent. III. In *Muscos* seu plantas pusillas, perennes, exsuccas, jam terræ jam vegetabilibus jam faxis accrescentes: hæ antheris N. 16. absque filis donantur, pistilli N.

18. loco pellucida quinque foliola in floris fundo armatis oculis observantur, uti & femina cotyledonibus N. 20. & tunica propria carentia. IV. In *Filices*, plantas scilicet conspicuis floribus destitutas, utriculosque copiosos in foliorum superficie gestantes, quos elasticus ambit annulus; is, postquam ad maturitatem pervenit, capsulas, & femina, pulverem nempe tenuissimum excutit; hinc etiam plantæ *dorsiferæ* vel *epiphyllispermæ* appellantur. V. In *Gramina*, quorum folia simplicissima, oblonga, integerrima, culmus N. 8. articulofus caulis loco, ex convolutis foliis compactus, in calyce, gluma N. 13 *. nempe, semen unicum. VI. In *Palmas*, quibus caudex simplex, apice frondosus, fructificatio N. 12. in spadice N. 22. cum spatha N. 13 *. VII. In *Plantas* proprie dictas, seu reliqua vegetabilia, sex prioribus familiis non comprehensa: hæc item dividuntur in *herbas*, hujusmodi scilicet plantas, quæ supra radicem quotannis pereunt; in *frutices*, quorum caudex N. 7. supra terram absque gemmis ascendit; in

arbo-

arbores, quarum caudex una cum gemmis supra terram ascendit.

- Plantas alii dividunt in *herbas*; *frutices* seu plantas perennes, & gemmiferas, ad arboris tamen proceritatem non assurgentes; in *suffrutices*, plantas fruticibus humiliores, haud gemmiferas, ut *Salvia*, *Ruta*; denique in *arbores* plantas perennes excelsas.



C A P U T II.

De Plantarum organis, radice & caudice.

5.



Egetabilium organa varia sunt: alia fibras seu fistulas lymphaticas constituunt, quæ nihil aliud sunt, quam tenuissimi canaliculi lympham, seu aquam vehentes, a Cl. Boerhaave venis absorbentibus animalium comparati; alia utriculos efficiunt, aut cellulas succo refertas, quarum series tum ad perpendiculum, tum ad horizontem per plantam porriguntur; alia tracheas effingunt, hoc est canales paulo ampliores, aerem attrahentes. An præter hæc omnibus plantis communia, alia quoque cuivis plantæ peculiaris vasa? Annon forte in diversis plantis diversa horum constructio? Profecto in ligno, & præprimis in cortice humor a lymphâ longe diversus animadvertitur, lacteus in *Ficu* & *Tithymalo* &c., gummosus
in

in *Ceraso* & *Amygdalo* &c., resinofus in *Pino*, *Pistacia Terebintho*, *Abiete*, *Junipero* &c. In aliis rubro colore distinguitur, flavo in aliis; in aliis vi ro-dendi præditus est, vi obstupefaciendi in aliis, in aliis vi depurgandi; sæpius amoenum spargit odorem, & optimi saporis est, sæpius nullius odoris, nulliusque saporis, ita ut in variis plantis diverse variet, & in multis plantis a lymphâ facili negotio discernatur. Cum igitur quodvis plantarum genus speciali fruatur succo, necesse est, in singulis plantis peculiararia vasa adsint, specialem hunc deferentia succum.

* De plantarum structura superioribus sæctis minus cognitum fuerat: non nisi per microscopia minimæ vegetabilium fibræ, & fila detecta sunt, plurimumque Clarissimis Viris Marcello Malpighio Bononiensi, & Nehemiæ Grewio Anglo debemus, qui præclaros suos conatur A. 1671. Societati Londinensi obtulit.

6. Tria potissimum in singulis plantis examinanda jam veniunt, *radix* scilicet, *caudex* vel *truncus*, & *fructificatio*, ut ajunt, seu subsequens floris in fru.

fructum commutatio . Radix ea est plantæ pars, quæ terræ inserta per poros & meatus crudum adhuc succum excipit, in reliquas distribuendum partes . Universim cortice exteriori, & interiori, libro, ligno, & medulla constat . Cortex *exterior* epidermidis instar innumeris pertusus est foraminibus, per quæ nutritius succus & aer in radicem sese insinuat . *Interior* cortex crassior est, & spongiæ instar aquam imbibens, ex lymphaticis fistulis diverse copulatis vasisque propriis, quæ inter trachæas, & utriculi inserti sunt, compositus . Radicis cortex crassior quam trunci esse solet . *Liber* intima est corticis cuticula ceteris subtilior, pluribus fibris quam utriculis constans . *Lignum* ex plurimis subtilissimisque lymphaticis fibris, vasis propriis, tracheisque admodum compactis secundum radicis longitudinem confurgit, paucioribus interpositis utriculis . *Medulla* spongiæ plerumque similitudinem refert, plena receptaculis ex utriculis enatis . Substantiam ejusdem in variis plantis variam deprehendimus, spongiæ

giæ instar in *Sambuco*, in *Vite* carnosam, duriorē & solidiorē in *Pino*, vix a reliquo ligni textu distinctam in *Quercu*, in *Ulmō* fere nullam. Plerumque alba est, attamen colore quoque interdum variat, aut fusci, aut rubescentis, aut flavescentis in quibusdam plantis invenitur.

- Nec eadem est radicis forma, nec eadem quantitas. In aliis vegetabilibus ad perpendiculum recta descendit; ad horizontem in aliis, & transversim intra terram sese extendit, ut in *Iride*; simplex est in aliis, nec dividitur; ramosa in aliis in plurima ac subtilissima fila protenditur; in aliis fusi instar, oblonga, crassa, sensim attenuata, ut in *Pastinaca*; in aliis tuberosa est, subrotundis constans corporibus in unum collectis, ut in *Pæonia*, *Solano*; repens in aliis, longe excurrens & radículas hinc atque illinc emittens &c. &c.

7. Caudex, seu truncus proxime radicem excipit, iisdem ac radix partibus eademque substantia præditus. *Rosa* enim si media parte terræ inferatur, radices inferius, superius gemmas agit.

Tiliam Cl. Leewenhoeck ita terræ commisit, ut ex sepultis ramis radices, ex radicibus extra terram prostantibus rami enati sint. Species trunci *Caulis* est, *Culmus*, *Scapus*, *Pedunculus*, *Petiolus*, *Frons*, *Stipes*, *Ramus* vero pars trunci.

8. *Caulis* est proprie caudex, seu truncus, folia fructificationemque ferens *. *Culmus* est proprius graminum caudex, vel continuus nullisque interceptus articulis, vel iisdem connexus, vel squamis velut imbricatis cooperatus. *Scapus* est universalis truncus, fructificationem tantum proferens, ut in Hyacintho & Narcisso. *Pedunculus* est particularis truncus, fructificationem non vero folia promens, diversa obtinet nomina vel propter locum, ex quo in planta prodit, vel propter modum, quo flores gerit, & fastigio connectit **. *Petiolus* folium sustinet, minime fructificationem; hinc cum pedunculo non est confundendus. *Frons* trunci species, ex ramo, folio, & sæpius fructificatione coadunatur, propria Filicibus & Palmis. *Stipes* basis frondis est,

est, Filicibus, Palmis, & Fungis propria. Stipes quoque filum dicitur, elevans, connectensque pappum & semen N. 21.

* *Caulis* vel simplex est vel compositus. Simplex continua serie apicem versus extenditur, diciturque *integer*, si simplicissimus, aut paucissimis instructus ramis ascendat; *nudus* nuncupatur, si foliis destituatur; *foliatus*, si iisdem ornatus sit; *volutilis* si per alienum ramum ad modum spiræ ascendat; *parasiticus*, si alteri plantæ, non vero terræ, innascatur. Item alter *reclinatus* audit, *repens* alter, alter *flexuosus*, aut *villosus*, aut *scaber* &c. Compositus in ramos distribuitur, appellatur *dichotomus*, si bifariam semper dividatur; *subdivisus*, si in ramos citra ordinem distrahitur; *articulatus* denique, si nodis connexus sit.

** *Pedunculus* loco determinatus, si ex radice proxime prodeat, *radicalis* vocatur; *rameus*, si e ramis oriatur; *solitarius*, si unicus; *sparsi*, si plures sine ordine existant &c. *Pedunculus* modo determinatus, *uniflorus* nominatur, aut *bislorus*, aut *multiflorus* &c. secundum florum numerum ex uno eodemque pedunculo natum. *Fasciculus* dicitur pedunculus ex, quo

quo plures flores erecti paralleli ad instar fasciculi florum erumpunt, ut in *Diantho barbato*. *Capitulum* audit, si plurimos flores in globum ferme compositos ferat, ut in *Gomphrena*. *Spica*, si flores sessiles sint, seu si sparsim alterni flores proxime pedunculo communi adnectantur. *Corymbus*, si flores singuli petiolis suis, situ pro rata parte elevato, instruantur, ut in *Spiraea*, *Opulifolia*, *Siliquosis* &c. *Panicula* nuncupatur, si flores diverse pedunculis iterum divisim insistant. *Thyrsum* est panicula in ovatam formam coarctata, ut in *Syringa*. *Racemus* oblongo pedunculo constat, ex quo laterales breviores pedunculi erumpunt, ut in *Vite*. *Verticillus* ex numerosis, & subsessilibus floribus, caulem ad modum annuli ambientibus, fit. *Pedunculus* particularis *Pedicellus* nuncupatur,

9. Ex trunci medulla tenuissimæ fibræ ad corticem usque porriguntur, quarum extrema in gemmas & ramos abeunt. *Gemma* est plantæ quasi informis partus, autumnii tempore subsquamosa cute delitescens, per hiemem ab aeris injuriis probe custoditus, & insequente anno novum ramum efficiens. In gemma igitur caulibus foliorum, & fructificationis rudi-

menta, defectu vis vegetantis coarctata, continentur, quæ, ingruente veris calore, copiosiore succum attrahunt lætius explicantur, & in novam veluti plantam crescunt. Quemadmodum optime Cl. Mariotte animadvertit, Mense Januario in plantarum gemmis v. g. *Tulipæ* bulbis microscopiorum ope sex floris petala, pistillum, & stamina observari. Hinc pleræque arbores extra tropicos gemmis gaudent, vix ullis autem in calidioribus regionibus.

* Vel proxime radici sub terra reconditæ carnosæ, & major gemma insidet, & tunc *bulbi* nomine venit: est autem bulbus *squamosus*, ut in *Lilio*; *solidus*, ut in *Tulipa*; *tunicatus*, ut in *Cæpa offic.*; *articulatus*, seu lamellis catenulatis constans, ut in *Lathræa* & *Adoxa*. Vel sub squamosa cute minores globuli caudicibus adnascuntur, propriæque *gemmæ* appellantur; quarum aliæ ex annuis caudicibus prodeunt, ac decidunt, ut radices agant, quemadmodum in *Lilio*, *Allio* &c.; aliæ in caule perenni ortæ folia tantum præbent, minime autem flores masculos & femineos, cum hi nudi emergant, ut in *Alno*. In nonnullis *Salicibus* & *Populo* quædam *gemmæ* folia tantum promunt, quæ-

quædam flores masculos, & femineos explicant. *Corylus*, *Carpinus* &c. folia, & femineos flores ex suis gemmis proferunt, nunquam autem intra gemmam masculos includunt; e contrario *Pinus*. *Ulmus*, *Amygdalus* &c. gemmas ferunt alias, ex quibus flores hermaphroditi, alias, ex quibus folia nascuntur. Pleræque denique plantæ gemmis folia, & flores ferentibus gaudent. Foliola intra gemmam latentia varie complicantur; & quidem laterales margines utrinque introrsum in *Pyro* & *Populo*, retrorsum in *Rosmarino* & *Primula* spiræ instar involvuntur; in *Pruno* & *Brassica* alter lateris margo alterum ejusdem folii marginem cuculli in modum circumambit; in *Lauro* & *Syringa* parallele, & superficie recta folia sibi invicem incumbunt; aut folii latera parallele sibi invicem appropinquant, ut in *Quercu* & *Corylo*; aut versus petiolum folia deorsum reflexa sunt, ut in *Aconito*, *Adoxa* &c. De quo fusius Cl. Loeßing. Diff. de Gemmis arborum.

10. Rami iisdem partibus iisdemque vasculis, ac plantæ truncus, gaudent. Plerumque citra ordinem, quandoque eleganti quadam serie, ut in *Cupresso* & *Palma*, quaverfus sese diffundunt. Ex ramis fibræ per petiolum N. 8. in folia excurrunt, in iisque se expandunt,

dunt, & adinstar retis explicantur, quibus utriculi aliaque vascula miro artificio intexuntur. Tanta partium copia, & dispositio ad nutritium succum attrahendum, percolandum, & perficiendum, eumque ulterius large suppeditandum inservit. Floribus igitur, & fructibus folia profunt, his arbores quædam expoliata, aut emoriuntur, aut fructibus destituuntur. Ad finem Augusti Cl. Mariotte foliis *Rosæ* denudavit, ejusque ramusculos excidit, gemmas tantum, ex quibus sequenti vere flores, ut alias, prodissent, relinquens; gemmæ quidem sese explicuerunt, & in ramos, at floribus omnino carentes, surrexerunt. Totus hic organorum in foliis apparatus tenuissima vestitur pellicula, in cujus superficie subtilissimi per microscopium cernuntur pili, innumerique pori, in unica folii *Buxi* superficie ultra 162000 a Cl. Leewenhoeck deprehensi.

* Folium a Botanicis secundum simplicitatem, compositionem, & determinationem examinatus, examenque hoc ad plantarum species facilius dignoscendas apprime uti-

le esse potest. Folium *simplex* dicitur, cum unicum in petiolo insidet: hoc iterum vel *circumscriptione* distinguitur, si peripheria minime angulis est exasperata, sed *circularis*, *elliptica*, *ovalis*, *cuneiformis*, *oblonga* &c. persistit; vel *angulis*, id est, cum folii limbus huc atque illuc in angulos desinit, ita ut folium jam *triangulare*, jam *quadrangulare* &c. vocetur; vel *sinibus*, cum *cordatum*, ut ajunt, est folium, aut *reniforme*, *lunulatum*, *hastatum* &c.; vel *marginibus*, cum latera folii *spinosi* sunt, *dentata*, *serrata* &c.; vel *superficie*, cum superior aut inferior viscida existit, *pilosa*, lana quasi obiecta, *hispida*, *aculeata*, *glabra* &c.; vel ipsa *substantia*, cum folia *cylindrica* concipiuntur, aut *semicylindrica*, *tubulosa*, *carnosa*, *gibbosa*, *membranacea* &c. *Compositum* folium audit, si plura ex unico petiolo folia surgunt, aut ipse petiolum semel; vel sæpius dividitur, antequam folia exhibeat; & quidem *articulatum* nominant, cum folium unum ex alterius apice crescit; *digitatum*, cum ex petioli simplicis apice plura prodeunt folia; *pinna-tum*, cum ex petioli simplicis lateribus folia plura oriuntur &c. Denique juxta *determinationem* folium consideratur, vel quatenus ex diversa plantæ parte protruditur, scilicet ex radice, caule, ramo &c., hinc *radicale*, *caulinum*, *rameum* &c. nuncupatur; vel quatenus diversum in caute obtinet ordinem, ita ut plura stellam re-

præsentent, aut hinc illinc sparsa, aut alterna, aut opposita sint &c.; vel quatenus folium vario modo plantæ insidet, & quidem si basi sua petiolo conjungitur, *petiolatum* vocatur; si vero medio disci, ut in *Nymphaea*, *peltatum* dicitur; *sessile* autem, si petiolo caret, & cauli proxime adhæret &c.; vel denique quatenus folia variam juxta directionem crescunt, nam aliud sursum caulem versus incurvatur, & *inflexum* audit, aliud ad angulum acutissimum cauli insidet, hinc *erectus* appellatur, aliud *revolutum* est, seu deorsum revolvitur, aliud *dependens*, seu recta terram spectat, aliud *horizontale*, seu ad angulum rectum cauli adnectitur &c. &c. Plura vide in *Methodo foliorum* Cl. Sauvages, in *Linnæi Philosophia Botanica*, aliisque.

II. *Fulcra* quoque ad caulem, seu truncum spectant, sunt autem fulcra adminicula quædam pro commodiore plantæ sustentaculo, quibus planta quidem plerumque, quin pereat, carere potest. Septem numerantur fulcra. 1. *Stipula* est squama basi petiolorum, aut pedunculorum enascentium utrinque adstans, ut in *Papilionaceis*, *Tamarindo*, *Rosa*. 2. *Bractea* est folium floreum, figura & colore a ceteris foliis di-

diversum, ut in *Tilia*. Quod si plura sint ejusmodi folia caulem terminantia, *Coma* dicitur, ut in *Corona imperiali*, *Lavandula*, *Salvia*. Bractea cum perianthio N. 13*. minime confundenda est, hoc enim maturo fructu, aut prius etiam marcescit, non item illa.

3. *Spina* est mucro plantæ simplex, aut duplex, aut triplex &c. ex ligno ipso N. 6. protrusus, ut in *Pruno*; cultura tamen sæpius evanescit, uti in *Pyro* observamus.

4. *Aculeus* est plantæ mucro simplex, aut duplex, aut triplex &c. ex cortice N. 6. tantum prodiens, ut in *Rosa*, *Rubo*.

5. *Cirrhus* est vinculum filiforme ad modum spiræ, quo planta alteri corpori alligatur, ut in *Vite*, *Piso* &c., aut acicularum instar, quibus planta aliarum arborum cortici, vel muro adhæret, ut *Bignonia*, *Hedera*.

6. *Glandula* est papilla humorem fecernens, aut petiolis, aut foliorum basi, aut tenellæ stipulæ insidet, ut in *Amygdalo*, *Pasiflora*, *Opulo* &c.

7. *Pilus* ductus est plantæ setæ instar.

* Cl. Guettard plantarum glandulas, & pilos summa industria examinavit, observavitque glandulas in aliis vegetabilibus vesiculæ esse instar, ut in *Myrtbo*, *Sedo* &c; in aliis lamellæ instar squamosæ rotundæ, aut oblongæ, ut in *Filicibus*; in aliis in modum sphaerularum, ut in *Betula* &c. &c; pilos autem vel esse ad instar cylindri, vel conii, vel scalpri, vel hami, vel in duas aut plures cuspides terminatos &c. &c. Utrum glandulæ a natura profectæ sint, vel per morbum contractæ, affirmare non audet; per plures tamen observationes eo devenit, ut animadverteret, plantas ejusdem generis glandulis, aut pilis ejusdem item generis instructas esse: forte ex his tractu temporis naturales aliqui ordines construi poterunt.



C A P U T III.

De flore, & fructu.

12.



Fertia plantæ pars fructificatio est, sic a Botanicis appellata subsequens floris in fructum commutatio : flore igitur, & fructu constat. Floris partes sunt calyx, corolla, stamen, & pistillum; fructus vero pericarpium, semen & receptaculum.

13. Calyx ex primis foliis velut basis, & fundamentum florem sustentantibus confurgit; ea vel pedunculo continua sunt, vel per petiolum contigua, ut plurimum coloris viridis, cum ex plantæ cortice oriantur : attamen interdum diverso tinctum colore calycem deprehendimus, in *Bartisia* sanguineo, in *Corno herbacea* niveo, in *Corno americana* rubro &c., ita tamen ut plerumque vividioris coloris in iis inveniatur plantis, quæ corolla carent,

maxime dum efflorescunt, ut in *Ornithogalo*, *Persicaria*, *Polygono*. Calyx variis in plantis varius est, differtque numero, compositione, partibus, figura, proportionem, loco, tempore, quo durat &c. Numero diversus est, si nullus sit, ut in *Tulipa*, & *Liliaceis* plurimis; aut unicus, ut in *Primula* & plerisque, aut geminus, ut in *Malva*. Compositione discrepat, si ex squamis velut diverse superimpositis confluat, ut in *Hieracio*, *Camellia*; aut ex squamis undique divaricatis maxime patentibus, ut in *Carduo*; aut communis sit multis flosculis, ut in *Scabiosa* &c. Partibus differt, si una, duabus, tribus &c. constet; hinc monophyllus calyx dicitur, ut in *Datura*, diphyllus, ut in *Papavere*, triphyllus ut in *Tradescantia* &c., quæ iterum in alias sectæ veluti in lacinias considerari possunt, hinc bifidus calyx nominatur ut in *Utricularia*, trifidus ut in *Cliffortia*, quadrifidus ut in *Rhinantho*. Figura distinguitur, si ea globosa sit, ut in *Cucubalo*, clavata ut in *Silene*, erecta ut in *Primula* &c.

Item

Item si margo integer sit, aut secus, si apice acuto, aut obtuso præditus sit &c. *Proportione* discernitur, si corollæ æqualis sit, aut eadem brevior vel longior. *Loco* internoscitur, si calyx floris sit, vel fructus, vel fructificationis. *Tempore*, quo durat, denique calyx variat, si nempe ad primam floris explicationem ut in *Papavere*, aut cum corolla ut in *Tetradynamia* N. 60. decidat, vel ad fructus maturitatem persistat ut in *Didynamia* N. 59.

* Calyx a Cl. Linnæo distinguitur. I. In *Perianthium* seu calycem fructificationi contiguum: quod si stamina N. 15. & germen N. 18. includit, *Perianthium fructificationis* appellatur; si vero stamina absque germine, *Perianthium floris*; *Perianthium* denique *fructus*, si germen sine staminibus continet. II. In *Involucrum* seu calycem florum umbellatorum N. 25. Id a flore remotum esse solet. III. In *Amentum* seu calycem ex communi receptaculo paleaceo gemmaceo existentem, idem ac aliis *Nucamentum*, *Fulus*, *Catulus*. IV. In *Spatham*, aut calycem spadicis N. 22. juxta longitudinem ruptum. Veli instar est spatha, ex una aut duabus membranulis constantis, & scapo adhærentis ut in *Narcisso*, aliisque pluribus *Liliaceis*. V. In *Glumam* five

sive calycem graminis, valvis sese ample-
xantibus constantem, huic *arista* insidet,
quæ glumæ mucro est. VI. In *Calyptram*
sive calycem *Musci* cucullatum, antheris
N. 16. superimpositum. VII. In *Volvam*
seu calycem *Fungorum* membranaceum, &
undique lacerum.

14. Ex calyce tenera foliola *Corol-
lam* constituentia, a molli libro N. 6.
orta, emergunt, mirabilem illam,
quam in floribus observamus, colo-
rum varietatem exhibentia. Corolla *Pe-
talo* constat & *Nectario*. Petalum est
membranula illa colorata, pistillum
N. 18. & stamina involvens: differt
numero, figura, proportionem, loco, &
tempore, quo durat. Numero, si mem-
branula unica sit eaque integra, vel
circa medium limbum aut partem su-
periores secta, seu, ut ajunt, laci-
niata, *monopetala* audit; si pluribus
hujusmodi membranulis seu foliolis di-
stinctis gaudeat, *polypetala* nuncupa-
tur; *dipetala* quidem ut in *Circæa*, si
duo sint petala; *tripetala* ut in *Sagit-
taria*, si tria; *hexapetala* ut in *Tuli-
pa*, si sex &c. A corollæ basi nume-
rus petalorum, non vero a medio

limbi desumitur : hinc malvaceos flores pentapetalos esse constat , quos Tournefort monopetalos esse voluit . *Figura* , si undulata sint petala ut in *Gloriosa* , si plicata ut in *Convolvulo* , revoluta ut in *Asparago* , torta ut in *Nerio* ; si margo ferræ instar denticulis asper , si superficies hirsuta &c. *Proportione* , si foliola hæc longissima aut brevissima , si æqualia vel fecus &c. *Loco* , si petalorum basis perianthio proxima , aut a calyce remota , interjecto germine ut in *Adoxa* . *Tempore* denique quo durat , si nempe ad fructus maturitatem persistat , ut in *Nymphæa* , si ad floris explicationem ut in *Actæa* , aut cum flore decidat , si maturescat , quin decidat ut in *Campanula* . *Nectarium* est pars mellifera flori propria , colore & firmitate petalis similis , plerumque flores minus regulares efficiens , ac veluti corollæ appendix . Quandoque plura foliola , quandoque unicum vel in calcaris formam contortum , vel in campanulam ut in *Narcisso* effectum est ; interdum

fossula singulis petalis impressa est ut in *Corona imperiali*, nectariumque constituit; interdum squamula quædam, aut tubulus, aut tuberculum ad uniuscujusque petali basim invenitur, in quibus humor melleus fecernitur, apibus pabulum futurus, interdum præcipue in *labiatis* & *personatis* Tournefortii basis eorundem mel continet, nectariiue vices subit.

* Duplex corollæ monopetalæ pars distinguitur, inferior, qua receptaculo N. 22. adhæret, *tubus* dicitur, pars superior magis dilatata, *limbus* nominatur. Quod si corolla monopetala tubo careat, limbum autem campanæ instar habeat, *campanulata* audit; *infundibuliformis*, si limbus ad instar coni tubo sit impositus; *hypocrateriformis*, si limbus planus tubo adhæreat; *rotata*, si limbus sit planus sine tubo; *ringens*, si corolla non regularis duo velut labia formet, labium superius *galea*, inferius *barba* vocatur, hiatus vero inter duo labia *ristus*, hiatus autem tubi corollæ *faux* nuncupatur. Hujusmodi corollæ seu flores a Tournefortio *labiati* & *personati*, a Rivino *barbati* appellantur. Corollæ polypetalæ pars inferior *unguis*, superior vero *patula*, *lamina* dicitur. Quod si quatuor patentibus, & æqualibus petalis

lis corolla constet, *cruciformis* nominatur; *papilionacea* vero, si dissimilibus petalis papilionis quodammodo forma exprimatur. Vulgo ut navicula concipitur, petalum nempe inferius, aut duo sibi invicem annexa cymbæ instar sunt, & *carina* dicuntur, includuntque stamina, & pistilla; petalum superius maximum ad modum vexilli prominet, hinc *vexillum* vocatur; petala lateralia semper æqualia & sub vexillo posita, *alæ* audiunt.

15. *Stamina* sunt fila intra corollam eminentia, instructa capitibus, quæ *antheræ* vocantur, continentque tenuissimum pulverem, *pollen* dictum, uti in *Tulipis* & *Liliis* facile videre est. Fila vel, ut aliis placet, *filamenta* sæpius tenuis instar fili sunt, interdum membranacæ formæ. In variis floribus numero differunt, de quo alibi; item figura, capillaria enim sunt, aut plana, aut spinæ instar, aut hirsuta, longa, brevia &c. interdum petalis connectuntur, præprimis in monopetalis floribus, ut omnium primus Vailantius observavit, & Pontedera ex 2000. specierum dissectione collegit, in polypetalis autem floris receptacu-
lo

lo uniuntur. Filamentorum horum textura eadem est ac petalorum, basin ut plurimum ampliorem habent, & in cuspidem desinunt.

16. *Antheræ* primum ad modum spongiæ, postmodum pulverulentæ evadunt, ex lamellis plerumque duabus componuntur, hæ introrsum plicatæ intra tenuissimos villos pulverem ferunt, hinc atque illinc dispergendum, lamellulis sese extrorsum evolvantibus, quarum fibræ arctissime initio filamentis cohærent, inde vero quasi emoriuntur. Aliquando antheræ ex florum latere dependent, aliquando filum circa medium ambiunt, aliquando, licet raro, stigmati citra filum conjunguntur, ut in *Aristolochia*. Figura quoque variant, hæc enim non tantum in diversis plantarum generibus, verum etiam in eadem planta eodemque flore diversissima conspiciuntur: quæ oblongæ, & teretes initio, compressæ tandem evadunt; glabræ vero sensim hirsutam acquirunt superficiem; quæ antea manifestis sulcis exa-

ratæ, complanatæ emergunt, quæ viscido humore madidæ, ac tumidæ erant, aridæ subinde & exsuccæ fiunt &c. Facies antherarum externa, internam petali superficiem respiciens, primum plana est, opposita vero tritici ad instar, ut Malpighius ait, ita incisæ, ut diduci quodammodo hac parte queat, ad latera autem convexæ ut plurimum sunt, nec raro sulcum circa medium leviter ductum ostendunt. Faciem hanc, expanso perfecte flore, ita mutatam deprehendes, ut priorem minime agniturus sis. Ceterum *Corni* & *Apii* flores antheris perfecte rotundis præditi nudo oculo apparent; subrotundis *Valerianæ*, *Coriandri* &c.; ovatæ sunt in *Convolvulo*; oblongæ in *Iride*; conicæ in *Tulipa*; sagittæ instar in *Croco*; cristatæ in *Verbascio*; bicornes in *Myrtho*; villosæ in *Squamaria*; quadrangulæ in *Fritillaria*; rictum quasi animalium referunt in *Pervinca*; naviculam in *Galeopside*, renes in *Malva* &c. &c. Interna vero antheræ facies, si necdum maturam dissecamus, hæc est: duo ut plurimum, raro quatuor

cava loca sese offerunt aut oblonga aut rotunda, pro diversa nempe ipsius antheræ figura, loca hæc intermedio septo ita dividuntur, ut binos sacculos, presse sibi invicem appositos, quarum interna superficies villosa, innumerisque hemisphæricis foveolis prædita, repræsentent, in his glutinosa & pinguiuscula materia pulveris instar continetur, quæ sensim intumescit, solidioremque induit naturam, ac tandem, disruptis vinculis, flore jam aperto, aut eodem adhuc clauso, dispergitur. Varietates antherarum aliæ sunt a numero, a cohæsionis modo, a magnitudine, a colore &c. cunctas has recensere, brevitatis, quam nobis proposuimus, non patitur.

17. *Pollen* est congeries exiguorum pellucidorum granulorum, pressis ordinibus sibi invicem accumbentium, uti Cl. Verdriesius in ducentis, & ultra florum speciebus exactissimo microscopio detexit. Horum tanta est tenuitas, ac teneritas, ut vix quidquam certi de interna eorundem structura exponi

poni possit: interne esse cavos, sulphurea, & oleosa refertos materia, odor, si digitis terantur, flamma, si in ardentem candelam sufflentur, & infecta oleo charta, si in eadem præsertim *Liliorum* asserventur, manifeste comprobant. Varietates pollinis a colore potissimum & figura petuntur, licet in eadem interdum florum specie color variet, quin in eodem aliquando etiam flore. Coloris albidi sunt granula in *Malva*, *Urtica*; flavi in *Rosa*, *Lilio*; viridiusculi in *Helleborastro* & *Gladiolo*; cærulei in *Lino*; in quibusdam *Tulipis* violacei; in *Lychnidibus* quibusdam carnei, rubri in *Geo* &c. Figura autem in plurimis ad modum ovi est, juxta longitudinem fulcum habentis, uti videre est in *Buglossa*, *Bryonia*, *Tithymalo* &c; *Meliloti* pollen cylindricam præ se fert figuram; *Malvæ* vero rotatam; dentatam renum instar *Narcissi* &c.

* Stamina etiam in *Fungis* dari Cl. Micheli 1709. primus detexit; Cl. Réaumur *Mémoires de l'Acad.* 1711. in *Fuco*; in *Filicibus* 1739. Cl. Iussæus. Cl. Grew primus 1682. pollinis figuram microscopii ope exploravit, dein Cl. Malpighi; Cl. quo-

que Gèoffroy de natura & figura ejusdem in *Act. Acad. Par.* 1711. fufe agit. Cl. Iuffiæus in iisdem monumentis 1737. modum exponit, quo pollen in aquam emiffum aperiatur. Cl. Needham in *Observationibus microscopis* 1747. demonstrat, pollen in aqua diffilire, & teneriorem subtilioremque substantiam emittere, armato etiam oculo haud distinguendam, nisi eandem aquam plerumque tingeret. Hinc perperam quidam putant, pollen esse globulos ex cera formatos, cum experientia teste ad ignem minime fluant. Tournefortius pulveres hos pro secretis e plantæ corpore inutilibus humoribus habet. *Isagoge Inst. R. Herb. Alimentum*, ait, a pediculo acceptum visceris instar perficiunt flores, & fructui nascenti suppeditant; ineptis humoris partibus per stamina seu vasa excretoria abeuntibus in apices seu receptacula. Et alibi. *Alimento sincero indigent semina*, cujus primum impetum fere non possent, nisi prius illud ab alienis partibus in flore purgaretur. Illæ vero a staminibus tanquam a vasis excretoriis exceptæ deponuntur in apices veluti in cloacas. Verum nobiliorem usum natura pollini attribuit, uti N. 28. 29. ostensuri sumus.

18. *Pistillum* est tubulus plerumque inter stamina medius, pulverem antherarum in se recipiens, cujus tres esse solent

solent partes, *germen*, *stylus*, & *stigma*. *Germen ovarium* a plerisque dictum, quod perficiendis feminibus destinatum sit: ut plurimum pistilli basis est, & rudimentum futuri fructus; aut *uniloculare*, ut ajunt, aut *biloculare*, aut *multiloculare* conspicitur. Cum pericarpium leges observet, vide N. 19. *Stylus* ut plurimum ex germine assurgit, plerumque ex ejusdem apice, interdum ex latere, ut in *Icosandria polygynia* Class. XII.; nonnunquam ex floris fundo crescit, ita ut germen ferat, cui stigma proxime affidet, ut in *Cappari* &c. *Stylus* aut cylindricum refert tubulum ut in *Monotropa*, aut angulatum ut in *Canna*, aut capillarem ut in *Ceratocarpo*, aut superne crassiorum ut in *Leucojo*, aut erectus est ut in *Atropa* seu *Belladonna*, *Jasmino* &c., aut curvus ut in *Leguminosis* &c., aut bifurcus ut in *Artemisia* seu *Abrotano* &c. &c. Item vel simplex est vel multiplex, vel etiam desideratur ut in *Daphne* seu *Thymelæa*, *Ptelea* &c., ad naturam enim floris haud spectat, & tunc stigma proxime germini insidet. Sim-

plex sæpe in varias partes dividitur, quas styli *tubas* appellant, plantasque inde *monostylas*, *distylas*, *tristylas* &c. Hambergerus nominat. Apex pistilli stigma dicitur, cujus figura aut globosa est, ut in *Primula*; aut ovata, ut in *Genipa*; aut coronæ instar, ut in *Pyrola*; aut adinstar unci, ut in *Viola*; aut trigona, ut in *Tulipa* &c. In omni florum specie stigma apertum est velut uteri orificium, madidum illud, aut potius vesiculis glutinoso succo refertis instructum, ut humore deciduum pollen rumpatur, & spiritalis ejusdem substantia in germen sese insinuet; hinc duplex est plerumque stigma, si fructus bilocularis oritur, ut in *Umbellatis*, triplex in *Liliaceis* trilocularibus, quadruplex in *Parnasia* quadriloculari, multiplex in *Malvis* multilocularibus.

19. Altera fructificationis pars est *Fructus*, annum plerumque plantarum opus, alteri plantæ, si terræ inferatur, initium tribuens: hujus partes pericarpium est, semen, & receptaculum.

lum . *Pericarpium* ex germine formatur , fecundatum crescit , seminaque includit . Vulgo pericarpium reipsa pro plantarum fructu sumitur , attamen apud Botanicos haud completam fructus notionem exhibet , eam enim per id fructus partem intelligunt , quæ semina continet , eaque undique custodit , nulla habita receptaculi , & seminum ratione , quæ sane fructus nomine comprehenduntur . In pluribus plantis pericarpium desideratur , harum igitur semina in sinu calycis velut in capsula locata conspiciuntur , cuiusmodi ab Hermanno aliisque *gymnospermæ* vocantur . Si pericarpium externe in capsulas dividatur , *bicapsularis* fructus ut in *Pæonia* , *tricapsularis* ut in *Veratro* , *quadricapsularis* ut in *Rhodiola* &c. nominatur : ab interna vero divisione seu a loculamentis *unilocularis* dicitur ut in *Primula* , *bilocularis* ut in *Nicotiana* , *trilocularis* ut in *Lilio* &c; a valvulis autem *bivalvis* ut in *Brassica* , *trivalvis* ut in *Viola* &c. Varietates item pericarpii a figura tetragona , pentagona , articulata , membranacea &c; a situ , a

modo, quo aperitur, dispergitque femina desumuntur.

- * Juxta Cl. Linnæum pericarpium species sunt. I. *Capsula* seu pericarpium cavum, determinate dehiscens, cujus externus paries, fructum tegens, *valvula* dicitur, paries vero fructum interne in plures concamerationes distinguens, *dissepimentum* audit, pars internos parietes cum feminibus connectens, *columella* vocatur, *loculamentum* denique est ipsa vacua concameratio, excipiendis feminibus destinata. II. *Siliqua* est pericarpium bivalve dissepimento membranaceo separatum, femina continens, utrique valvæ limbo alternatim affixa, ut in *Coclearia*, *Brassica*. III. *Legumen* est pericarpium bivalve dissepimento carens, femina continens alternatim limbo superiori utriusque valvæ affixa. IV. *Conceptaculum* est pericarpium siccum, pulpa destitutum, univalve, juxta lateris longitudinem apertum, a feminibus distinctum. V. *Drupa* est pericarpium evalve pulpa carnosâ, molli, succosa constans in medio nucem, aut nucleum obtinens, ut in *Amygdalo*. VI. *Pomum* est pericarpium evalve, pulpa carnosâ præditum, in medio femina membranaceis involucris defensa, velut intra capsulam, complectens. VII. *Bacca* est pericarpium evalve, femina nuda in pulpæ succosæ medio includens. VIII. *Strobilus* est pericarpium ex amento N.

13 *. factum, quod & *conus* dicitur, ex pluribus vaginis appositis, apice plerumque contortis constans.

20. Altera fructus pars, *semen* est, quoddam quasi plantarum ovum, ex quo fecundato, ac debito humore imbuto nova planta generatur. Quatuor ut plurimum involucris tegitur. Primum seu omnium extimum ceteris durius est, quo semen contra aeris injurias munitur, *arillus*, a quibusdam *calyptra* dictum. Hoc detracto, duæ pelliculæ occurrunt, tum tenuis pellucidaque membrana, quæ *secundina* vocatur. Tunicis his corpus quoddam bibulum comprehenditur, *cotyledon* nuncupatum. In quibusdam una ut in *Fru menti* granis, in plerisque duæ cotyledones ut in *Faba*, in aliis plures ut in *Nasturtio* &c. inveniuntur; in folium vel plura folia abeunt, crassiora, & a reliquis foliis admodum diversa, in prima feminis vel plantæ germinatione decidua. Cotyledonis munus est, *corculum* novæ scilicet plantæ rudimentum in quadam veluti fossula intra se fovere aut circa apicem, aut circa basim, ob-

observante Cæsalpino ; eidem tenerri-
mo adhuc alimentum haurire , nutri-
tiumque succum præparare , donec fir-
miores agat radices ; non secus ac in
ovo vitellus , placenta quasi uterina fa-
ctus , nutrimentum per umbilicalem
funiculum pullo porrigens , si enim co-
tyledones arescunt , ipse informis plan-
tæ partus debito humore destitutus are-
scit , ac emoritur.

21. *Radicula seu rostellum* in corculo
distingui solet , & *plumula* . Radicula
descendens pars corculi est , ex coty-
ledonibus germinans , & in radices
abiens ; hinc pelliculæ perforatæ sunt ,
ut adjacens radicula libere in terram
descendat , nutritiumque succum hau-
riat . Plumula est squamosus corculi
apex , ex tenuissimis filis composita , in
caudicem , folia , & ramusculos abiens :
quare in semine compendium plantæ
includitur , inclusaque ejusdem linea-
menta præprimis in *Faba* vel *Amyg-
dalo* facile conspiciuntur . Proxima cor-
culo cicatrix est , quæ externe in se-
mine observatur , ex ejusdem cum re-
liquis

liquis fructus partibus cohærentia or-
ta, & *hilum* dicitur; calyculus vero
aut lanugo feminis fastigio adhærens,
quo volitare solet, *coronula* appellatur,
& quidem *pappus* vel *corona papposa*,
si ex pluribus tenuibusque pilis con-
stet, *plumea* autem vel *pennata*, si ex
pilis ramosis plumulæ instar coalescat;
ala denique audit, si membranula fe-
mini affixa sit, qua volitante semina
disperguntur.

* Tres seminum species distinguuntur. I. *Se-
men* proprie dictum, cum membranulis
tantum tenuibus aut vesiculis obtectum
est. II. *Nux*, semen scilicet ossea epider-
mide vestitum. III. *Propago*, Muscorum se-
men decorticatum, anno primum 1750.
deprehensum. Royenus Prof. Bot. Leidens.
& Heisterus Prof. Bot. Helmst. alique
pauci, experientia docti, nullam omnino
plantam N. 4. proprie dictam, cotyledoni-
bus carere, his ut characteristica nota in
plantarum distributione usi sunt, hinc *mo-
nocotyledones* appellarunt e terra unico fo-
lio feminali erumpentes, uti *Gramineæ*;
dicotyledones, quæ duplici feminali folio
instructæ sunt, ut pleræque; *polycotyledo-
nes*, quibus plura sunt feminalia folia, ut
in *Pino*, *Cupresso*; *acotyledones* autem *Mu-
scos*, *Fungos*, aliaque vegetabilia voca-
runt,

runt, in quibus nullæ adhuc cotyledones visæ sunt. Plantæ nudum semen absque pericarpio ferentes a Botanicis *gymnospermæ* dicuntur, *angiospermæ* vero, quæ pericarpio obtectum semen producant, *cryptogamiæ* denique, quæ semina ita recondita gignunt, ut oculis distingui nequeant. Quod si semen unicum, aut duo, aut plura nuda sint, *gymnomonospermæ* plantæ, *gymnadispermæ*, *gymnopolypermæ* nuncupantur.

22. Tertia denique fructus pars est *receptaculum* seu basis, qua sex fructificationis partes, de quibus hætenus egimus, connectuntur. In receptaculum proprium, in receptaculum commune, in umbellam, cymam, & spadicem distinguitur. I. *Receptaculum proprium* unicam tantum fructificationem respicit; & quidem si basis communis sit floris & fructus, vocatur *receptaculum proprium fructificationis*; si floris basis sit, germine carentis, *proprium floris* dicitur; *proprium fructus*, si basis fructus sit distincta a floris receptaculo; si autem basis sit, cui semina intra pericarpium insistent, *proprium seminum* nuncupatur. II. *Receptaculum commune* est basis plurium flosculorum,

uti videre est in compositis N. 25*. ,
ad quod lamellula quoque spectat re-
ceptaculo innata, & flosculos distin-
guens, *palea* dicta. Compositorum re-
ceptaculum figura differt, aut planum
est, ut in *Achillea*, aut convexum ut
in *Matricaria*, aut conicum ut in *Me-
lampodio*; superficie autem vel nuda
est ut in *Matricaria*, vel punctis di-
stineta ut in *Tragopogone*, vel villosa
ut in *Andryala*, vel fetosa ut in *Cen-
taurea*, vel paleata ut in *Hypochæri*.
III. *Umbella* est receptaculum ex eo-
dem centro in tenues pedunculos, con-
gruenter formatos, crescens; dicitur
umbella simplex, si secundo haud di-
viditur ut in *Panace*; *composita*, si om-
nes ejusdem pedunculi umbellulas &
ipsi gerunt. IV. *Cyma* est receptacu-
lum, ex eodem centro in pedunculos,
superne altitudine æquales, primarios
quidem ex eodem puncto, secundarios
sparsim productos ut in *Tino* & *Vi-
burno*. V. *Spadix* est receptaculum *Pal-
mis* proprium intra spatham in fructi-
feros ramulos enatum.

CAPUT IV.

De floris & fructus natura.

23.



Ruētificationis igitur partes flos & fructus sunt. Floris natura, seu, ut ajunt, essentia in anthera & stigmate consistit; eam enim floris partem essentiam dicimus, qua flores ejusdem speciei nunquam destituuntur, experientia vero teste tot præstantissimorum Botanicorum constat, in unaquaque vegetabilium specie antheras & stigmata deprehendi, ita ut vel in eodem sint flore v. g. *Narcissi*, *Lilii*, vel in diversis floribus aut ejusdem individui seu plantæ v. g. *Peponis*, *Momordicæ*, aut varii individui attamen ejusdem speciei v. g. *Populi*, *Palmae* &c. Calyx ergo essentia floris minime dicendus est, cum haud paucæ occurrant plantæ eodem destitutæ, ut *Tulipa*, *Convallaria* seu *Lilium convallium*, *Asparagus*, *Clematis* &c.

Co.

Corolla quoque ad floris essentiam non spectat, Gramina enim, Pinus, Urtica, Cannabis, Ephedra, Chenopodium, aliaque plures eadem orbatæ sunt. Staminum fila, aut pistilli stylum ad floris essentiam pertinere, quis statuet? Illis namque *Aristolochia* &c., hoc *Tulipa*, *Parnassia*, *Daphne*, *Ptelea* &c. carent.

* Hinc perspicimus, quam perperam quidam nectaria N. 14. v. g. *Hellebori*, *Passifloræ*, *Nigellæ* &c. florum loco assumpserint, cum partes hæ antheris & pistillis minime gaudeant. Cl. Pontedera in *Antologia* L. II. plantas quasdam Horti Malabarici antheris destitutas esse contendit. *Toddapanna*, Linnæi *Cycas*, ait, est palmæ genus producens de summo caudice embryones foliis affixos, petalis, staminibus, apicibusque carentes, qui crescunt in fructus molles, & carnosos, in quibus ossicula continentur nucleo foeta. Idem de *Noelitali*, Linnæi *Antidesma*, de *Mallamtoddali*, Linnæi *Celti*. Verum in his quoque recentiorum Botanicorum industria antheras deprehendit. Etiam Cl. Knautii sententia, nunquam flores apetalos, seu corolla carentes dari, haud subsistit.

24. Quemadmodum nullam plantam sine femine seu fructu, ut N. 27. ostensuri

furi fumus, ita nullum fructum sine prævio flore invenire est, quod longioris temporis usu & experientia herbarum periti didicerunt. Uti ergo generatio partum, sic flos fructum antecedit, ita ut ne unicum exemplum in ullo individuo contrarium evincat. *Colchicum* quidem & *Hammamelis* autumnino florent, at fructum sequenti anno edunt. In *Musa* germen quidem necdum fecundum majus evadit, attamen, antequam flores prodeant, haud maturefcit.

* Veterum igitur opinio, *Ficum* solam arborem esse floribus carentem, nulli fundamento innititur, cum intra coarctatum calycem antheras, pistilla, dein semen inclusum contineat. Primus Cl. Cordus in grossis seu nondum maturis fructibus pistilla undique emergentia invenit. Malpighius quoque in *Plantarum Anatome* pistilla delineavit; accuratius De la Hire in *Mém. Acad. Par.* 1712. Cl. Pontedera in *Anthologia* uberiores de *Ficus* fructificatione observationes in lucem edidit. Eadem ratione in *Tussilagine anandria*, *Ruellia*, *Campanula pentagonia*, *Ipomœa*, aliisque quibusdam, de quibus forte dubium erat, intra calycem exiguae antherae pistillave inclu-

cluduntur. Nec eorum sententia defendi potest, qui ornamenti tantum causa flores, & præprimis corollam factam esse autumant, generationis enim organa, ad fecundum semen efficiendum N. 28. per-necessaria, flos complectitur, corolla vero antheras pistillave contra frigus aliasve aeris injurias egregie tuetur, rapinam ingluviemque insectorum coercet, ad tene-riorem perfectioremque præparandum sac-cum, ad seminis fecunditatem juvandam quam maxime inservit: idcirco in plantis corolla destitutis partium generationi de-stinatarum structura & firmitas longe alia observatur, ut corollæ defectus suppleatur.

25. Flos alter *completus* est, seu hu-jusmodi, in quo omnes partes ad na-turam seu essentiam spectantes locum habent; alter *haud completus*, cujus pars aliqua ad essentiam spectans destructa cernitur. Completi flores alii *simplices*, si nulla fructificationis parte cum aliis floribus communi gaudent; alii *aggre-gati* vocantur, cum aliqua fructifica-tionis pars receptaculum vel calyx plu-ribus flosculis communis est. *Flosculi* dicuntur singuli singillatim accepti ag-gregatorum flores, qui jam staminibus & pistillis donantur; jam staminibus

tantum, jam pistillis tantum instructi sunt; interdum neque stamina neque stylum; aut stigma obtinent, & tunc *Neutri* appellantur.

- * Aggregatorum species sunt. I. *Aggregati* proprie, dilatato receptaculo gaudentes, quorum flosculi pedunculis insident, ut *Scabiosa*, *Cephalanthus*, *Globularia* &c. II. *Compositi* seu plures flosculi monopetali, sessiles, id est petiolo carentes, receptaculo dilatato integro communi & perianthio contenti, quorum antheræ in cylindrum connatæ, quod essentielle est, & singulorum germen monospermum, seu unicum semen continens. Hi iterum dividuntur. 1. In *Ligulatos*, quorum omnes planæ corollulæ versus exterius latus expanduntur, quales sunt *semiflosculosi* Tournefortii. 2. In *Tubulosos*, quorum corollulæ omnes tubuli speciem referunt, & subæquales sunt, a Tournefortio *flosculosi* dicti. 3. In *Radiatos*, cum floris discus tubulosus constat flosculis, diversæ vero formæ ejusdem ambitus, ita ut radios formare videantur. In iis, qui a Tournefortio radiati dicuntur, tubulosi in disco flosculi, ligulati in ambitu seu peripheria conspiciuntur. Compositorum plures species in Classe XIX.prehendes. III. *Umbellati*, quorum plures flosculi receptaculo ex eodem centro, æquali ambitu, in peduncu-

los

los producto insident: si receptaculum semel in pedunculos dividitur, *umbella simplex* est, ut in *Corno*; si omnes pedunculi communes in umbellulas iterum dispescuntur, *umbella composita* exsurgit. IV. *Cymosi* receptaculum in pedunculos primarios ex eodem centro enatos divisum obtinent, secundariis pedunculis sparsim prodeuntibus, ut in *Tino*, *Viburno*. A *Vaillantio* completus flos dicitur, qui perianthio & corolla gaudet, secus non est completus. *Apetalus* vulgo a Botanicis vocatur, qui corolla tantum; *nudus*, si tantum calyce destitutus sit: aptius tamen *nudum* dicimus eum, qui calyce & corolla privatur.

26. *Non completi* flores, aut etiam *luxuriantes* dicti, perianthium, & corollam ita multiplicant, ut quædam ad essentiam spectantes partes destruantur, idque plerumque a nimia alimenti copia provenit: sicut e contra ob sufficientis defectum caloris haud raro corolla privantur, & idcirco *mutili* nominantur. *Luxurians* flos alter est *multiplicatus*, *plenus* alter, alter *prolifer*. *Multiplicatus* est, cujus corolla duplex aut triplex fit, ita ut stamina quædam in exuberantia petala abeant. *Mono-*petali flores plerumque tales evadunt,

ut *Primula*, *Hyacinthus*. Perianthium raro florem multiplicatum constituit, etiamsi colore distinctum deprehendatur, ut in nonnullis *Primulis proliferis* Tournefortii videre est. Si vero corolla ita multiplex crescat, ut omnia stamina in petala transeant, plenus evadit flos: id in polypetalis sæpius accidit, in quibus non raro ita ex staminibus petala multiplicantur, ut pistillum suffocent. *Prolifer* flos ex nimium exuberante alimento ita generatur, ut intra florem alii flores cum suis pedunculis enascantur, & quidem hæc prolis generatio apud simplices in pistillo, apud aggregatos in receptaculo peragitur; atque hinc ob germinis defectum steriles hujusmodi flores prodeunt. Quare luxuriantes minime naturales, sed florum monstra censendi sunt, partes enim ad naturam spectantes immutantur, diversamque figuram & structuram acquirunt.

* Flores simplices pleni communi pistillo in centro, compositi vero naturales antheris & pistillis suis gaudent, hacque inter se ratione differant: hinc simplices pleni fructum

Etum communem, multiplicatis petalis; compositi autem naturales totidem fructus, quot flosculi numerantur, obtinent. Flores compositi pleni, petalis planis, eatenus a compositis naturalibus, petalis itidem planis, distinguuntur, quatenus pleni antheris destituuntur, stigmata eorundem longiora evadunt, & germina admodum aucta, ac divergentia conspiciuntur, naturales e contra antheris fruuntur.

27. Uti floris essentia in antheris est & stigmatibus, ita fructus in femine, nullum enim fructum sine femine deprehendimus, vel potius nullam plantam sine femine, quod ejusdem re ipsa fructus est, præ manibus habemus. Et ratio ipsa & experientia idipsum comprobant. Quis vegetabilia ex fortuita materiæ coagmentatione oriri putabit, aut corpora tam mira partium varietate & ordine contexta sine ratione sufficiente? Ratio profecto sufficiens an in alio, quam in prius existentibus quibusdam plantæ rudimentis seu seminibus, non secus ac ratio sufficiens animalium omnium existentium in ovulis seu feminibus inveniri poterit? An in dubium quis vocabit, plantis omni-

bus esse sua femina, postquam incredibilis Botanicorum diligentia non tam in majoribus quam in minimis etiam plantulis eadem deprehendit? *Filicum* profecto femina Bobartius detexit, novæque ex iis plantæ obtentæ sunt, ut Morisoni experimenta in *Hist. Plant.*, & Dillenii in *Hist. Musc.* testantur. *Fungorum* femina Michelius in lucem protulit, ex iisque, terræ commissis, novos fungos consecutus est, ut ejusdem tentamina in *Novis plantarum generibus* docent. *Muscorum* femina Linnæus, *Lemnæ* Vallisnerius, *Fucorum* Reaumurius, *Pilulariæ* Jussæus, in quibus res haud parum ambigua erat, invenerunt.

* Audiendi igitur minime sunt, qui ignobiliores faltem plantas ex putri casu prodire autumant. Veteres, quod *Viscum* sæpe in inferiori ramorum latere enasci viderint, absque femine productum putabant; captu enim erat perdifficile, qua ratione *Visci* femina ad inferiores has ramorum partes ventorum ope delata sint, iis adhæserint, nec gravitate sua deciderint. At compertum est, turdum baccas *Visci* comedere, pulpaque vesci, semina vero
intec

integra reddere, una cum excrementis ramo adhærentia, quæ cum a pluviis eluuntur, fit, ut unum alterumve seminis granum cum aqua subinde in inferius ramulatus deferatur, ibique germinet. *Agaricos* esse vitium per morbum ab arboribus contractum, plures sibi persuadent. Attamen constat, ejusdem speciei *Agaricos* ex terra erumpere, pileis quidem & stipitibus instructos, ut reliqui fungi, quorum semina dispersa, & ad humidum arborum truncum delata, plantam protrudunt, dimidiatos pileos absque stipitibus nactam. Quod si ex difracto ramo, terræque infixo nova prodeat arbor, quis unquam, plantam minime ex semine natam, pronuntiabit? Annon *Polypi* ex ovo generantur, licet ex unaquaque parte, in quas unum alterumve secco, ut *Tremblejus* detexit, integrum oriatur animalculum? Id igitur, quod in Regno animali rarissimum, pervulgare in vegetabili deprehendimus. Caudex radix est supra terram N. 7.; ex caudice rami, caudex ex radice, radix ex semine, igitur & ramus ex semine seu ovo nascitur.

Utrum semina, ut *Malpighius* contendit, omnia in prima rerum creatione a Deo fuerint condita, & primis inclusa plantis, an in iisdem e contra singulis annis formentur? Quæstio inter Recentiores versatur. Si omnia initio semina producta sunt, plantisque inserta, ita ut explicen-

tur duntaxat, & evolvantur, id ea ex
 causa factum esse volunt, quod per nul-
 las motus leges tam singulare & miran-
 dum artificium, quale in cujusvis plantæ
 structura suspicimus, exponi videatur. Ve-
 rum annon ejusdem miri artificii est quod-
 cumque foliolum, quiscunque ramulus,
 quæcunque minima plantæ pars? Igitur si
 prædicta ratio quidquam ponderis habe-
 ret, non tam præcipuas partes, sed omnes
 omnino, venulas nempe, fibras, tracheas,
 utriculos, ramos, folia, flores, fructus in
 femine contineri necesse esset. Numerum
 autem feminum ejusdem speciei in primo
 femine inclusum quis concipiet? Ex uni-
 co *Papaveris* femine prodivisse ad semel
 32000, Trevius observavit. In unica *Zea*
 planta 2000 singulis annis numerantur fe-
 mina; 3000 in *Helenio* Laurembergius de-
 prehendit; in *Heliantho* vero Camerarius
 4000; Dodardus in unica *Ulmo* Mem. de
 l' Acad. de Paris 1700. 200000000. &c.
 Quid si hæc singula annis singulis nova
 semina producerent? Immensum profecto
 numerum ex calculo Cl. Martin Grammai-
 re de sciences Philos. colliges. Supponit is,
 pisum unum primo anno 100 producere
 semina, hæc altero anno 10000, hæc ve-
 ro tertio 1000000, anno quarto 100000000
 prodibunt. Sic ulterius proportionem geo-
 metrica progrediendo intra 5752. annos pi-
 forum numerus ex unico productus obtine-
 tur, constans ex unitate & 11504. zeris.

57

C A P U T V.

*De actu, quo secundum redditur
semen.*

28.



Lantæ equidem omnes
suis gaudent semini-
bus, verum ne steri-
lia sint, sed novas si-
bique similes generent
soboles, antherarum polline N. 17.
fecundentur, necesse est, ut innumeris
compertum est observationibus. Pro-
fecto si pluviae pollen ante tempus
eluant, aut ventorum vi pulvisculi hi
alio transferantur, nunquam nascetur
semen, in germen abiturum; nec ma-
tuum obtinebis fructum, si, antequam
pollen maturescat, antheras decerpse-
ris, aut si florum stamina a vermibus
insectisque, seu quocunque casu con-
sumpta fuerint. Hinc perniciosa est
pluvia, cum Vites & Segetes florent;
perquam e contra utiles zephyri leni-
ter fecundantes pulveres hinc atque il-
linc

hinc dispergentes. In horto Upsalienfi, ut Linnæus refert, *Rhodiola* pistillifera a 1702 usque ad 1750 sterilis permanfit, hoc enim anno primo staminifera adducta fuit. Blairius ex duodecim *Tulipis* ante pollinis dispersionem antheras omnes excepit, expertusque est, nullum omnino productum semen. *Botanik Essays by Patrick Blair Lond.* Antherarum igitur pulveres, ne sterilia maneant femina, neve intempestive decidant fructus, requiruntur.

* Morlandus, Needham, alique haud pauci pollinis globulos veras plantulas germinaque ipsa organis instructa esse contendunt, quæ ex apicibus in subiectum stigma decussa plantarum ovulis adhærent, primumque ex his nutrimentum hauriunt: quemadmodum in Regno animali spermatica Leewenhoeckii animalcula ova feminea subeunt, ut ibidem foveantur. Verum sicuti Leewenhoeckii sententiam minus probabilem in Regno animali visurifumus, ita in pollinis granulo haud plantam compendio contineri probabilius censemus, nullum enim vel minimum plantæ rudimentum in hujusmodi globulo ab exercitatissimo etiam observatore optimorum microscopiorum ope deprehenditur, uti in semine formatum nudo interdum oculo

con-

conspicimus . Quid quod longe facilius plantæ structuram in germine seu corculo feminis , sub aspectum plerumque cadente , quam in minutissimo pollinis globulo contineri concipimus ; naturamque advertimus parcam potius esse in iis multiplicandis partibus , in quibus tanquam in ultimo naturæ opere perfectio plantæ adest , quam in iis , quæ solum ad nutrimentum deserviunt . Ad quid tanta germinum copia millionesies & ultra seminum numerum excedens , ut unum denique alterumve granulum in vas seminale penetret aptumque fiat ad novam sobolem producendam ? Accedit , aliquod interdum feminis rudimentum ante pollinis dispersionem in germine animadverti , post dispersionem vero a nobis observari , corticem sese in calycem evolvere , librum in corollam , lignum in stamina abire , medullam vero proxime ad ipsum semen produci ; ut reipsa in *Graminibus* aliisque monocotyledonibus N. 21*. medullam ex radice in ipsum semen continuari invenimus , pulposamque materiam , cum semen decidit , abrumpi , in eoque puncto , in quo abruptum est , radículas exerere , cum pululat . Cum *Halleo* aliisque dicendum videtur , materiam sulphuream , & oleosam , qua pollen refertum est N. 17. per subtilissima & poris plena feminis integumenta facili negotio sese insinuare , feminisque succo commisceri , ut necessaria in

eodem exoriatur fermentatio, per quam primæ plantæ rudimenta agitentur, diducantur, & ad vitales inchoandas actiones excitentur.

29. Fecunda vero redduntur femina illapsu pollinis in nuda & madida stigmata: horum humore pulvisculi illi rumpuntur, auramque quandam feminalem efflant, quam idem stigmatum humor absorbet, cum eoque in seminis capsam sese insinuat. Experientia imprimis constat, stigmata pura & nitida prius, postquam vero antherarum pollen jam maturum dispersum est, ab eodem infecta & inquinata deprehendi.

* *Viola tricoloris* flos vix explicatus stigma exhibet hians concavi instar globi, & ad latus aperti, album & nitidum; verum paulo post a fecundante quinque antherarum pulvere inspergitur, fuscoque colore foedatur, tuba adhuc clara & pellucida existente. Quid si, antequam semen fecundum reddatur, stigma compresseris? Melleum quendam liquorem exprimes, pollen attrahentem ac retinentem, ut Cl. Linnæus refert *Flor. Lapon. & Plant. Spons.* Stigma *Gratiolæ* priusquam polline in-

inspergatur, hiat, inspersum vero, rictum claudit deflorescit, maturumque producit fructum. Linn. Hort. Cliff. Pollen *Aceris* humore ruptum Jussæus observavit, ex eoque fluidum quoddam prodiisse, aquæ supernatans guttulæ instar olei, spectante quoque Cl. Duhamel. Needham vero, ab eodem polline in humore auram quamdam seminalem effari, detexit.

30. Secundo ipsa naturalis antherarum & stigmatum collocatio manifeste indicat, pulveres illos prædictum in finem esse destinatos: plerumque enim staminum & pistillorum eadem est altitudo, antheræque in plerisque stigma circumdant; sicubi id altius eminet, ad antheras sese flectit, ubi autem pistillum humilior est, antheræ ad stigmata inclinantur. Quod si planta distinctis gaudet floribus, aut pistillo aut staminibus tantum instructis, ut in *Monoecis* Class. XXI. plerumque staminiferi flores supra pistilliferos eminent, ut pollen facili negotio in stigmata decidat, uti *Carex*, *Zea*, *Ambrosia*, *Sagittaria*, *Ricinus* &c.; si vero fecus, tunc flores staminiferi quam plurimas antheras numerant, adeo ut

si *Pinum* aut *Abietem* succufferis, pollen fumi instar sursum volitare conspicies.

* *Geranium* calycibus monophyllis florentibus erectis, foliis subcordatis pistillo staminibus minore gaudet, floribusque, antequam efflorescant, pendulis: verum dum flores expanduntur, eriguntur quoque, ut pollen ventorum ope ad stigma decidat. Idem in *Claytonia* specie, *Limnia* dicta, accidit. *Nigella arvensis cornuta* ut primum florem explicat, quinque erecta pistilla staminibus longiora exhibet; flore autem bene aperto, retorquentur, circumpositas ut antheras attingant, absumpto polline, iterum eriguntur. Eodem fere modo ad antheras pistilla in *Tamarindo*, *Passiflora*, & *Cassia* inclinantur. *Saxifragia* decem instructa est staminibus, duo pistilla ambientibus: dum floret, bina opposita stamina supra pistilla inclinantur, ut directe deorsum pollen in stigmata decidat, quo peracto, sequenti die recedunt & eriguntur, accedunt vero bina alia, & sic porro. *Parnassia* quinque obtinet brevia stamina, flore jam maturo, unius duntaxat filum imprimis longius fit, antheram stigmati velut propinat, pulveresque fecundantes defert, tum alteri cedit locum, secundum tertio &c., donec omnium fila idem munus persolvant.

31. Tertio antheræ & stigmata si-
ve in eodem siue in diversis sint flo-
ribus; eodem omnino tempore vigent:
quin eæ plantæ, quibus diversi sunt
flores, pistilliferi nempe & staminife-
ri, nec hi supra illos ad perpendicu-
lum erecti, ante foliorum exortum
efflorescere desinunt, ne scilicet inter-
venientibus foliis pistilla tegantur, im-
pediaturque, quo minus fecundentur,
ut videre est in *Moro*, *Visco*, *Fago*,
Quercu, *Corylo*, *Salice*, *Populo* &c.

* Longissima *Coryli*, *Alni*, *Betulae* amenta N.
13*. tunc antherarum suarum pollen dimit-
tunt, cum stigmata infra posita mature-
scunt. Nec *Cannabis*, flore staminifero gau-
dens, fecundantes pulvisculos dispergit,
antequam *Cannabis* flore pistillifero stig-
mata maturitatem assequantur. Eodem tem-
pore & in *Zea* antheræ pendulae prode-
unt, ac disrumpuntur, quo fasciculi, sty-
lorumque extremitates ex spicæ integu-
mentis sese explicant.

32. Quarto omnes fere flores, uren-
te sole, expanduntur, vespertino au-
tem tempore, & aere humido com-
plicantur. Plantarum intra aquam cre-
scen-

ſcentium flores, antequam aperiri incipiant, ex eadem emergunt, ut *Nymphaeæ*, *Myriophylli*. Quæ huius ratio? Ne antherarum pollen nocturno humore aut aquis in unum coeat, impediaturque, quo minus in ſtigmata penetrare queat. Stigmate fecundato, mirum ſane! nequaquam flores ſefe contrahunt, ſive pluvia, ſive vespertinum tempus ingruat, earum vero, quæ in aqua viget, iterum intra eandem flores demerguntur. Hinc *Didynamia* Claſs. XIV., & *Diadelphia* Claſs. XVII. nunquam noctu complicantur, cum antheras probe teſtas obtineant.

* Optime olitores norunt, exiguam ceraſorum & pyrorum copiam fore, ſi pluat, dum horum arbores florent, pollen enim ab humore in unum cogitur, conglobatur, piſtilla ſubire nequit: idque majore cum damno in *Ceraſo* quam in *Pyro* accidit, cum omnes *Ceraſi* antheræ ſimul ac ſemel, ſecus in *Pyro* pollen emittunt. *Vallisneria*, obſervante Cl. Michelio, ſub aqua in rivulis ad foſſas creſcens, ſcapum N. 8. gerit longiſſimum, attamen ſpiræ inſtar involutum, unico gaudentem flore: paululum antequam floreat, ſcapus extenditur, calyceem extra aquam proferit, floremque

que protrudit. Iisdem in locis eodemque tempore *Vallisnerioides*, brevissimum gerens scapum, plurimos, quos gignit, flosculos dimittit, qui vesicularum instar enatantes, ut aquæ superficiem attingunt, aperiuntur, pollenque in prioris sibi proxime stigmata jam matura efflant; fecunda *Vallisneria* hac ratione effecta, iterum, scapo ad modum spiræ revoluta, intra aquam occultatur.

33. Quinto ne *Palma* pistillifera acerbos dactylos & nucibus destitutos proferat, necesse est, spadices N. 22. ex *Palma* ~~staminifera~~ divellere, eosque supra pistilliferos spadices collocare, ut pollen eo certius stigmata penetret, si forte per aerem translatum eousque non pertigit. Uti litteris mandarunt Theophrastus, Plinius, Prosper Alpinus, Tournefort, Koempfer &c. Siculi quoque ex *Pistacia* arbore staminifera pollen colligunt, ac in pistilliferos flores spargunt, ne fructus deficient, & immaturi decidant.

* *Hadgi Mustapha Legatus Tripolitanus* mihi declaravit, ait Tournefort, ramulum floris *Palme maris* in spatham *Palme femine* inseri, quo tempore spatha hiare solet, flos

enim explicatus pulverem fundit, sine cujus affectione dactyli acerbi forent, & insuaves, imo & officulis carerent, camelis tantum & jumentis exhibendi. Palma pistillifera in horto regio Berolinensi, ex qua fructus semper immaturi antea deciderant, fertur botrum protulisse maturum centum & amplius dactylorum, postquam flos Palmæ staminiferæ Lipsia ex horto Bofensi allatus, supra flores pistilliferos adhuc residuos, fuisset suspensus.

34. Sexto denique sexcentæ florum observationes in promptu sunt, quibus sententia, N. 28. 29. adducta, comprobatur. Nonnullas tantum brevitate causa easque vulgares ob oculos pono.

* In Plantis spicatis fere omnibus flores primum inferiores incipiunt florere, tum superiores. Quam ob causam? Ut pollen scilicet posteriorum florum damnum resarciat, si forte priorum minime fecunda reddidit semina. Eadem ex causa in Compositis N. 25 *. postquam flosculi, peripheriam constituentes defloruere, interiores altiores effecti primum florent.

Pepones, Anguriæ, Cucumeres, Cucurbitæ &c. diversos gestant flores alios pistilliferos, fructum ferentes, staminiferos alios steriles

les dictos. Minus experti olitores follicia te, sed perperam steriles decerpunt, ne nimium, ut putant, nutrimenti ceteris surripiant. Staminiferos potius supra pistilliferos circa meridiem excuterent, polli- neque eorundem jam maturo aspergerent, aut illos supra hos admoverent, fructus profecto eo certius uberiores colligerent. Plurima circa Cucurbitaceas plantas experimenta Millerus instituit. *The Cardeners Dictionary by Philip Miller Lond. 1737.* observavitque, nullum eas omnino fructum protulisse, ex quibus omnes, immaturo adhuc polline, staminiferos flores decerp- sit.

Momordica Balsamita, ait Linnæus *Dis. de Somno Plant.*, quæ apud nos sero plerum- que autumno floret, clausis jam tum fenestris & ianuis caldarii, flores mares eodem ac feminae cauli insident, sed tamen remoti: pollen itaque ex defectu venti ab antheris ad stigmata non potest deferri, quam ob caus- sam feminae semper abortiunt; hortulani igitur masculum florem decerpunt, eoque stigma floris feminei conspergunt, & flores tali modo fecundati plerumque fructum ferunt, sed non alii.

Si rustica manus Cannabem, flores staminife- ros gerentem evulserit, antequam semini- fera suos pistilliferos aperiat, nullo frue- tur femine, aut perquam modico; si for- te, ut interdum accidit, seminifera unum

alterumve etiam staminiferum protruserit florem, cujus polline nonnulla fecundantur germina.

Lychnis & *Saponaria* *Flor. Svec.* caule gaudent, terræ ad horizontem incumbente, hic tamen, antequam flores sese expandant, erigitur, ut fecundantes antherarum pulveres vento agitati, in stigmata facilius illabancur; hinc est, quod maxima flosculorum pars scapis N. 8. in altum attolatur: hinc *Narcissus*, *Galanthus*, *Viola* &c., cum florent, rectis stant caulibus, postquam vero effloruere, inclinantur. *Oenothera mollis* nocte sursum sua ad horizontem patentia folia tollit, ita ut, flore necdum plene explicato, ad perpendiculum erecta stent, floremque arcte comprimant, tegant, ac tueantur: facta pollinis dispersione, folia situm haud mutant, sed diu noctuque ad horizontem extensa conservantur.

Parisiis in horto D. De la Serre *Pistacia* seu *Terebinthus* pistillifera conspiciebatur, ut Duhamel *Physique des Arbres* narrat, singulis quidem annis floruit, at fructus minime tulit. Quod ægre D. De la Serre ferebat, plantæ enim speciem multiplicare quam maxime optabat. Ejus ut votis satisfaceret, ipse Cl. Duhamel eidem *Pistaciam* staminiferam pluribus gaudentem floribus submitit, cujus polline pistillifera fecundata, plures eodem anno fructus opti-

ptimos edidit; ablata subinde staminifera, nullos sequentibus annis produxit fructus, ex quibus species propagari potuisset.

Si *Tulipæ* rubræ antheras ante pollinis dispersionem excerpseris, ejusque stigma pulveribus antherarum albæ *Tulipæ* insperferis, semen obtinebis, ex quo non tantæ rubræ *Tulipæ*, ut alias contingit, sed albæ etiam, & quam plurimæ duobus distinctæ coloribus albo nempe & rubro enascentur.

Facili negotio *Brassica* a polline alterius speciei *Brassicæ* fecundatur. Hinc, si optima *Brassica* in eadem areola cum viliori & vulgari succrescat, verendum est, ne vilioris pollen ad præstantioris stigma decidat, semenque inde vulgare generetur. Baal hortulanus, Rajus narrat Hist. I. p. 42. Brainfordensis ingentem copiam seminis *Brassicæ* floridæ in horto suo collectam, hortulanis quam plurimis in suburbanis Londini degentibus vendidit, at hi cum summa curâ eadem semina terræ pingui commiserunt, *Brassicas* longifolias vulgares ipsis producere, quare se fraudatos queruntur, & prædicto Baal litem intendunt in foro Westmonasteriensi, qui ex sententia judicum condemnatus est, non solum ut ipsis pecunias restitueret, sed jacturam temporis, & amissum terræ usum fructuum restitueret. Facinus hoc minime olitori, sed quod bonæ *Brassicæ* a vilioribus fecundatæ sint, adscribendum erat.

C A P U T VI.

De Caprifigatione.

35.



Caprifigatio quam maxime sententiam nostram confirmat, eam idcirco pluribus verbis transcribere operæ pretium duxi. Caprifigatio instituitur, cum *Caprifigi* seu ficus sylvestris, qualis in editis locis & vetustis muris crescere solet, fructus, *grossi* dicti, fativis seu domesticis *Ficubus* suspenduntur, ut ficarii culices in grossis nati ad fativarum *Ficum* fructus delati, eos subeant, & ad maturitatem adjuvant. En Tournefortii verba *Act. Par. 1705*, qui Græciam pervagatus diligentissime caprificandi rationem perscrutatus est, litterisque mandavit. *Caprifigatio sive modus colendi Ficus*, de quo Prisci magna cum admiratione scripserunt, minime fabulosus est, ut multi opinantur, is quotannis in plerisque Ae-

pars

gæi maris insulis fit culicum ope. Ficus pars divitiarum, quas regio illa largitur, plurimos quidem fructus ferunt, verum ante perfectionem casuros, nisi ea ratione, quam mox tradam, occurrerent. Coluntur in hisce insulis duæ Ficus species, quarum una Ornos vulgo dicitur, quo nomine sylvestris Ficus intelligitur, sive Latinorum Caprificus. Altera species est Ficus domestica. Sylvestris tres fructuum species producit esui quidem inutiles, sed vel maxime necessariae, quoniam horum opera domesticæ ficus poma ad maturitatem coguntur. Dicuntur Caprifici fructus vernacula cultorum lingua Fornites, Cratires, & Orni. Grossi, fornites dicti, mense Augusto nascuntur, & acerbi Novembrem attingunt: in his vermiculi generantur ex quorundam culicum, qui tantum circa has arbores volitare cernuntur, terebratione. Mensibus Octobri & Novembri hi culices Ficus alteras in eadem arbore nascentes sponte perforant. Hæ Cratires sunt, quæ sub initium Octobris germinant, tunc fornites, egressis culicibus, paulatim decidunt. Cratires contra ad

mensē Majum servantur; & ova, quæ eas terebrando deposuere culices, continent. Mense Majo tertia grossorum species ex eodem Caprifico, quæ duas alias tulit, se ostendere incipit. Hic grossus crassior est, vocaturque ornus. Utpri- mum grandiusculus hic evadit, & fun- dum apertum ostendere incipit, perfora- tur eo in loco a culicibus, qui jam adul- ti e cratiribus egrediuntur ad deponen- da in orno ova. Mensibus Junio & Ju- lio coloni ornos legunt, cum jam jam culices egressuros vident, & domesticis Ficubus adnectunt festucis pertusos per ramos distribuentes modo plures modo pauciores juxta pomorum copiam. Hac temporis opportunitate neglecta, decidunt orni, & domesticæ Ficus fructus ad ma- turitatem non perducuntur, sed paulo post acerbi decidunt. Apud Veteres quo- que Scriptores caprificatio celebratur. Caprificus, ait Aristoteles, in grossis ha- bet psenes, culices ficarios, dictos. Fit primum vermiculus: mox rupta cute evo- lat culex, & mutata sede, immatura Ficuum poma petit, quibus se insinuans, ne decendant, præstat. Quapropter coloni

Ficubus grossos appendere, & juxta easdem Ficus Caprificos plantare assolent. Herodotus quoque de Palmis & de Ficubus posteris tradidit. In Babylonis agris Palmæ magna ex parte fructiferæ proveniunt, ex quibus non solum vinum, mel, cibus conficitur, sed etiam eodem modo, quo Ficus, curantur. Harum utiliarum arborum masculas Græci vocant, quarum fructus Palmæ fructiferæ alligant, ut earum fructus maturet culex subiens, ne ex arbore is defluat; ferunt enim Palmarum mares culices, quemadmodum Caprifici. Theophrastus vero. Fructum autem, antequam maturent, amittere possunt Amygdala, Malus punica, Pyrus, sed omnium maxime Ficus & Palma. Quibus etiam auxilium quaeritur. Unde & caprificatio. Nam ex ficis annexis culices egredientes corrodunt, & pervia reddunt cacumina. Caprificus vocatur, inquit Plinius, e sylvestri genere Ficus nunquam maturescens, sed, quod ipsa non habet, aliis tribuens, quoniam est naturalis causarum transitus, atque e putrescentibus identidem generatur aliquid. Ergo culices parit: hi frau-

dati alimento in matre, putri ejus tabe ad cognatam volant, morsuque ficorum crebro, hoc est, avidiore pastu aperientes ora earum, atque ita penetrantes, intus solem primo secum inducunt, cerealesque auras immittunt foribus apertis. Mox lacteum humorem, hoc est, infantiam pomi absument, quod fit & sponte. Ideoque ficetis Caprificus permittitur ad rationem venti, ut flatus evolantes in Ficus ferat. Inde repertum, ut illatæ quoque aliunde, & inter se colligatæ injicerentur fico &c. Suidas. Caprifici fructum ad domesticos Ficuum fructus suspendunt, & illi, qui vocantur psenes, id est, ficarii culices, ex ipsis migrantes in grossos, efficiunt, ut hi ad justam maturitatem perveniant. Plutarchus denique. Caprifici sylvestris fructus, si alligetur hortensi Ficui, non sinit fructum ejus defluere.

* Persuasum sibi habet Cl. Tournefort, psenes seu ficarios culices vulnerando fructus, eorum quasi venam secare, & hoc pacto efficere, ut nimia lactei succi copia imminuatur. Cl. vero Pontedera ait. Culices necessarii sunt, ut, terebrato pomo, aeri solique viam aperiant, quibus humor subigatur,
di-

digeraturque. Et hac ratione pomum ad maturitatem cogitur, quod tamen bonitate inferius est non caprificato & insuavius. Bauhinus quoque Plinii de caprificatione sententiam sequens: E putrescente Caprifici fructu, ait, culices geniti in urbana fructus evolant, eosque morsu aperientes superfluum humiditatem depascuntur, radiosque una solares intromittunt, adeoque non tantum impediunt, ne decidant, sed & earundem concoctionem promovent, & accelerant.

36. Quadruplices esse Ficuum species ex accuratis plurium observationibus constat, easque flores producere, ut N. 24*. relatum est. Caprificus fert flores stamineos; fativa, seu domestica Ficus flores pistilliferos; tertia Ficuum species a Pontedera *Erinocyses* dicta, reipsa *Androgyna* N. 41. verno tempore stamineos, autumnali pistilliferos producit flores. Hæc, ait Pontedera, semper bifera est, cujus præcocia poma grossi sunt, apicibus staminibusque referta, & sine maturitate decidua; serotina vero stamina apicesque nequaquam producunt, unguibus tantum squamosis, ut in fativis Ficubus, ornata. Hæc suam habent perfectionem, & edulia sunt.

Quar-

Quartam De la Hire Aët. Par. 1712. speciem addit, quæ in uno eodemque receptaculo & quidem undique in concava interna parte flosculos pistilliferos, in ima vero intra squamas stamineos fovet. Cum igitur Ficuum flores in receptaculi cava parte adeo arcte clausi lateant, ut fecunda, sicut in aliis plantis, stigmata commode reddi nequeant, Summus rerum Conditor iis psenem seu insectum ficarium ex specie *Tenthredinis* seu *Ichneumonis* in auxilium dedit. Culices hi in Caprifici grossis sua gignunt ova, suosque pullos excludunt: verum cum pollen maturefcit, farinæ hujus fecundantis copia fere obruuntur, ita ut hac obduti e cavis suis sedibus avolare, novasque quærere cogantur: quod si pistilliferi Ficuum fructus in promptu sint, hos lubenter subeunt, inibique farinam illam, qua aspersi sunt, excutiant; hinc fit, ut fecundati hac ratione Ficus domesticæ fructus & majores, & copiosiores maturi, & gratio-
ris saporis evadant. Id quod Tournefort observavit, in Gallia scilicet Fi-

cum non fecundatam viginti quinque tantum fructuum libras ; ejusdem vero molis , at fecundatam in Archipelago ducentas & octuaginta protulisse .


* *Hæc animalcula , inquit Pontedera , ficarios culices describens , parva sunt , forma veluti exiguae muscæ vinariæ sed grandiusculæ nigri coloris . Caput minus quam muscæ pro corporis magnitudine ferunt ex nigro luteolum , cui summo duo affiguntur cornua nodosa nigra & valde oblonga . Os ut vespa gerunt sine proboscide . Brevi vertice caput cum trunco adnectitur , ut etiam vespæ . Dorsum nigrum est nitidumque , cujus lateribus quatuor alæ affiguntur , quarum duæ majores sunt , ad exortum angustæ , & in latitudinem paulatim fastigiatae , quas animalculum , dum ambulat , aut consistit , erectas tenet : aliæ duæ minores sunt , paulo a majorum exortu longius natæ , quæ lumbis incumbunt . Pectori sex pedes adhærent ex multis nodis constantes , & quam in muscis longiores . Coarctatur deinde thorax , cui altera trunci pars inferior jungitur , angusta qua parte thoraci adnectitur deinde diducitur , & rursus in acuminatam partem , ex qua in femellis uterinus tubus egreditur , contrahitur . Constat venter ex multis annulis , quales in Vespis cernuntur .*

37. Fecundos reipsa per Caprifici farinam reddi Ficuum fructus , inde
etiam

etiam evidenter colligitur, quod semen fecundati minime sterile deprehendatur, e contra semen non fecundati sterile permaneat. Comperi, inquit Cl. Browallius in Exam. Epicris. Siegesbeck, narrante Cl. Linnæo, ficus in Hollandia quotannis proluci e seminibus vel fructu lacerato terræ commendato, fructu tamen illo ex Italia allato. Si enim semina in Gallia, Germania, Anglia, vel Suecia, ubi nullus reperitur Caprificus, producta serantur, vix provenit arbor; ex adverso si ea, quæ in Italia Insulisque Græcis, ubi adest Caprificus, orta sunt, humo tegantur, facillime surgunt folia, primis suis diebus *Malvæ* simillima. Idem experimentum Upsaliæ in horto Academico 1744. repetitum, & e ficis orientalibus plantas enatas, Cl. Hegardt refert.

- * Opinio igitur Tournefortii, Pontederæ, Bauhini, quam N. 35*. adduximus, sustineri nequit. Annon alia forte ratione, stante horum sententia. Græci rustici culicum defectum supplerent? Annon lubentius grossos quoquo modo perforando labori per duos menses caprificationi ægre impenso parcerent? Nec dubium obmo-
veat

veat ullum, domesticam Ficum, quin fecundetur, maturos edere fructus; hi enim minime re ipsa fructus N. 19. dicendi sunt, cum fecundo semine careant, nec pericarpia N. 19. nominandi, sed receptacula potius N. 22., ad abdomini indulgendum accommodata. Idem in *Humulo*, *Fragaria*, *Moro*, *Blito* &c. observamus, quorum receptacula aut calyces vulgo fructus dicuntur, maturis licet feminibus priventur.



C A P U T VII.

De plantarum sexu.

38.



Um vegetabilia omnia ex femine N. 27. nascantur semen vero ejusdem ut plurimum generis, sicut quotidiana docet experientia, plantas producat, femina vegetabilium ova dicenda sunt, ad eundem finem ac animalium ova destinata, ut conformem parentibus sobolem progenerent. Semina ut animalium ova membrana exteriori, N. 20. seu testa, interiori vitellum involvente, vitello, & puncto vitæ seu hilo constant; albumine quidem carent, quo haud opus habent, nam madida tellus vices supplet, uti aqua piscium ova fovet albuminis loco, quo privantur.

* Recentiores Botanici quam plurimas in Europa novas plantas detexere, Veteribus omnino ignotas, in eodem licet natæ fuerint

sint solo, nec aliunde allatæ; has characteribus ejusmodi instructas observarunt, quos in duabus vel genere vel specie diversis, in eodem tamen solo crescentibus plantis animadverterunt, ita ut perplexi sint rediti, ad quod genus, ad quam speciem referendæ essent. Verum facile quisque videt, semen interdum fecundari a diversi generis vel speciei polline, quemadmodum Cl. Haartman *Amen. Acad.* exemplum adfert tum aliarum plurium, tum *Veronica spuria floribus abortientibus* natæ ex *Veronica maritima*, fecundato prius semine ab antherarum pulveribus *Verbena officinalis*; & videre est sæpius *Brassicam* cum *Rapa* aut *Napo* convenire; id quod etiam Cl. Marchand *Aët. Par.* 1715. in *Mercuriali foliis laciniatis* observavit. Non aliter ac in animalibus, rarissime licet, contingit, ut extra suam speciem sese misceant, uti *Mulus* ex diversa specie *Asino* & *Equa* generatus, *Passer canarius* ex *Cardueli* matre natus manifeste evincunt.

39. Ova vegetabilium seu semina nequaquam germinant, nisi fecundentur N. 28. 29., negotium vero, quo semina fecundantur, in omnibus omnino plantis peragitur, cum omnes ex semine prodeant N. 27., quod negotium vera vegetabilium generatio di-

cenda est: quare omnia suis genitalibus instruantur organis, necesse est; hæc autem iis in partibus invenienda sunt, in quibus generationis actus absolvitur, in floribus scilicet, maturum enim fructum semper flores antecedunt N. 24., ut generatio partum.

* Ex nullo ovo pullum excludi, nisi fecundetur, quotidiana docet experientia, ova quidem Gallina parit, at nisi prius a matre fecunda sint facta, ex iis haud pullus in lucem emittetur. Nonnulla quoque vegetabilia semina ferunt, quin fecundentur, at nunquam sibi similem plantam producant. Annon in Regno quoque animali generatio antecedit partum? Vulgo quidem persuasum erat, pisces quosdam in ova, postquam e matrice prodivere, sperma emittere; verum a Recentioribus detectum est, uno alterove prius die a maribus edi sperma, quod a feminis avide devoratum, ovula in utero adhuc existentia, fecunda reddit. Concursus igitur duplicis sexus haud semper necessarius est; hinc minime singulare, si in plantis quoque diversa ratione ac in plerisque animalibus fecunda evadant semina.

40. Cum ad plantarum incrementum necessarium sit, ut semina fecundentur,
cas


eas utique floris partes, quibus nunquam planta destituitur, genitalia esse, quis in dubium vocabit? Antheris & stigmatibus flores haud carere demonstravimus N. 23. Stigmata ergo & antheræ genitalia sunt; & quidem utriusque sexus, virilis antheræ, pollen ut genuinam plantarum genituram dispergentia; stigmata vero feminei, quæ fecundantes pulveres recipiunt, maturumque edunt partum seu fructum. Idcirco florem antheris tantum instructum, *masculum* dicimus; stigmatibus vero tantum gaudentem, *femineum* vocamus: quod si & antheris & stigmatibus simul distinguatur, *hermaphroditum* nuncupamus.

41. Et quidem plantæ aliæ floribus tantum masculis gaudent, quas idcirco *mares* appellamus; aliæ femineos solum flores produciunt, hinc *feminæ* inter vegetabilia sunt; aliæ hermaphroditos duntaxat edunt flores, *hermaphroditæ* propterea dictæ; aliæ ex uno eodemque caule & masculos & femineos distinctos flores protrudunt, quas *andro-*

gynas nuncupamus; aliæ floribus tum hermaphroditis tum masculis ut *Vailantia* & *Veratrum*, aut hermaphroditis & femineis ut *Parietaria* & *Atriplex* seorsim instruuntur, aut hermaphroditis duplicis generis, ita ut alii steriles sint ex parte feminea, alii vero ex parte maris, ut *Musa* obtinet: hæ generatim *polygamæ* audiunt.

- * *Humulus* seu *Lupulus* mas alter, alter femina. Calycem hæc tantum explicatum & protensum, si nullus adsit mas, protrudit, quem Lupuli fructum vulgo vocant. Hoc deceptus Tournefort *Isag.* 69. plantarum sexum negavit. Quotannis in horto Parisiensi *Lupulum* feminam sine mare suos proferre fructus observabat. At Calyces hos haud esse re ipsa fructus seu pericarpia, semina ferentia, minime animadvertit. Quemadmodum in *Moro*, *Blito* &c. bacceas, calyces duntaxat succo refertos, nequaquam vero pericarpia, invenimus. In *Atriplice* hoc singulare, quod hermaphroditorum semina a femineorum florum feminibus tum quoad externam speciem tum quoad magnitudinem discrepent, eandem tamen plantam proferant; non secus ac compositorum florum e flosculis disci & peripheriæ semina, ut in *Compositis radiatis* Tournefortii. In Regno vegetabili ple-
- raf-

rasque plantas hermaphroditas a nobis observari, animalia vero paucissima, qualia potissimum inter vermes deprehendimus, mirum haud sit, hæc enim facili negotio se invicem adeunt; plantæ vero terræ affixæ loco egredi nequeunt, nisi eatenus, quatenus per ventum præprimis fecundantes pulveres alio transferuntur, quod pluribus obnoxium est vicissitudinibus. Hinc Sapientissimus Conditor *Cochleas* quoque, cum tardissimo sint pede, plerasque androgynas formavit, ne scilicet harum familiæ tractu temporis penitus delerentur.



C A P U T VIII.

De variis plantarum systematibus.

42.



Egni vegetabilis scientia arctis olim limitibus comprehendebatur, recentiori hoc ævo auctior locupletiorque evasit. Plantarum species Cl. Bauhini tempore circa 1623. ad sex millia tantum numerabantur, quarum potiore partem Meridionalis Europa suppeditabat. At postquam Recentiorum Botanicorum industria, Anglorum nempe, Batavorum, Gallorum, Germanorum, & Italogorum ad exteras etiam terras sese extendisset, viginti & ultra specierum millia grati conspiciamus, quarum plurimas America nobis subministravit, ne quidem nomine Veteribus notas. Soli Plukenetio 900. circiter Americanas debemus: quid Sloaneo, Suriano, Marcgravio, Fevilleo, Houstono, Gronovio &c.

&c. &c. diversas novi illius Orbis partes peragrantibus? Quin ad eas quoque plantas examinandas ventum est, quarum cognitio vel minus utilis vel laboriosa nimium videbatur. Cl. Micheli 900. *Fungorum* varietates detexit; *Muscos* 600. Dillenius Oxoniensis Professor; Rai Anglus supra 400. *Filicum* species; *Gramina* 400. Scheuchzer Professor Tigurinus in lucem protraxit, haud exiguam alii minutissimarum plantarum copiam invenere.

43. Scriptores quoque rerum vegetabilium non tam Veteres quam præprimis Recentiores plurimos numeramus, quorum alii specierum numerum auxerunt, aut vegetabilia iconibus expresserunt, aut rariora duntaxat collegerunt, aut singularia, certoque cui-dam loco affixa pertractarunt; alii juxta stabiles, naturæ leges Regnum omne vegetabile in Classes & certa Genera partiti sunt.

* Inter Græcos Authores Hippocrates, Aristoteles, Theophrastus, Galenus, Dioscorides &c., inter Latinos vero veteres

Columella, Plinius &c. eminere. Verum posterioribus temporibus cum insignis plantarum usus & præstantia tam in medicina & oeconomia, quam in commercio & operibus manufactis perspecta magis fuisset, ad studium Botanices colendum quam plurimi exarserunt; hinc tot insignes academicos hortos miramur, Patavinum, Pisenum, Bononiensem, Monspeliensem, Parisinum, Upsaliensem, Viennensem &c.; hinc tot egregii Viri dissitas regiones herbas colligendi causa adierunt, Hermanus Insulam Ceilan, Rumphius Amboinum, Rheede & Pontinus Malabariam, Kæmpferus Japoniam, Alpinus & Hasselquist Aegyptum, Feuilleus Peruviam, Hernandes Mexico, Marcgravius Brasiliam, Plumierus Insulam S. Dominici, Tournefort Græciam, Osbeckius Sinas &c. &c.

44. Cum amplissime igitur res herbaria pateat, a clara planaue methodo dependet, ut plenam Regni hujus cognitionem nobis comparemus. Nisi in ordines, ait Cæsalpinus, redigantur plantæ, & velut castrorum acies distribuuntur in suas classes, omnia fluctuari necesse est. Systema ergo plantarum conditurus, vegetabilia cognitione distincta complectatur, oportet; non modo ea probe inter se discernere, ve-

rum etiam certis characteribus insignire noscat, quorum ope alii etiam ad eandem cognitionem pervenire queant, & quidem facili negotio, primo intuitu, sine iconibus, absque magistro. Ad id recta plantarum *dispositio* & *denominatio* inserviet. Recta dispositio in recta vegetabilium divisione & conjunctione consistit, similia similibus conjungere, & dissimilia a dissimilibus separare opus est. Natura ipsa diversis plantæ partibus, vel etiam iisdem, inter se tamen discrepantibus, quasdam impressit notas, quibus plantam a planta distinguere fas est. Partes hæ ad condendum systema aliæ *primariæ*, a flore & fructu petitiæ; aliæ *secundariæ*, ab habitu, radice, caule, foliis &c. desumptæ. Natura primariis præprimis certas & constantes ut plurimum largita est notas, quibus inter se plantas commode discernimus, naturæ enim solius opus est subsequens floris in fructum commutatio.

* Veteres in summa quædam genera *calidarum*, *frigidarum*, *siccicarum*, *humidarum* plantas partiti sunt; alii secundum loca, in qui-

quibus nascuntur ; alii juxta tempora & menses , quibus oriuntur , easdem distribuerunt. Verum observationes hæ ad virium medicarum cognitionem potius , ad usus œconomicos & alia hujusmodi , de quibus primario hic nobis agendum non est , utiles esse videntur.

45. Vegetabilia fructificationis N. 12. partibus alia omnibus , nonnullis tantum alia N. 23. gaudent : attamen nullum hæcenus inventum est , omnibus omnino destitutum . Partes hæ *numero* , *figura* , *proportione* , *situ* inter se differunt , notæque characteristicas constantes exhibent , ita tamen ut alia in aliis plantis pars fructificationis magis quidem , nulla autem maxime constans deprehendatur . Figura floris certior est quam fructus . Proportio partium diversissima , & minime constans , ut plurimis patet exemplis . Numerus facilius quam figura aberrat . Situs denique partium magis stabilis invenitur . His characteribus convenientia & plantarum differentia eruitur ; his igitur notis systematica vegetabilium partitio recte instituitur .

• Triplex in fructificationis partibus structura advertitur, *naturalissima*, *differens* & *singularis*, juxta *numerum*, *figuram*, *proportionem*, & *situm* describenda. *Naturalissima* ea dicitur, qualis in plerisque plantis occurrit, v.g. calycem crassiores brevioresque corolla, pistillum in medio floris intra stamina esse positum, antheras filis insidere & stigmata stylis &c. Hinc *naturalissimus numerus* est, calycem in tot segmenta, quot corolla numerat, dividi, quibus filamenta respondent, singula singulis instructa antheris; pistilli divisionem cum pericarpium loculis, aut seminum receptaculis convenire, ut in *Lino*, *Lysimachia*. *Figura naturalissima* est, calyce minus patente contineri corollam sensim dilatatam, intra quam stamina & pistilla erecta, & leniter attenuata habentur; hisce præter calycem decidentibus, pericarpium intumescere, & extendi seminibus refertum. *Naturalissima proportio* est, calycem corolla minorem esse cum staminibus & pistillis æque longis in floribus quidem erectis; in nutantibus vero pistillum staminibus longius esse, ut in *Fritillaria*, *Campanula*; in decumbentibus stamina pistillaque ad latus inferius declinata, ut in *Cassia*, *Diadelphia* omni; in ascendentibus denique stamina pistillaque sub latere superiore recondita deprehendi, ut in *Didynamia gymnospermia*. *Situs naturalissimus* est, a perianthio involvi receptaculum, cui corolla alternatim adnascitur,

tur, huic vero interius fila respondent, antheras sustinentia; in centro receptaculi esse germen, cuius apici stylus insidet, stigma in fastigio gerens; hisce decidentibus, germen in pericarpium abire, calyce sustentatum, femina includens, adnexa fructus receptaculo N. 22.; receptaculum denique floris frequentius subnasci, rarius circumnasci vel supernasci.

Differens fructificationis structura ab iis partibus, quæ in diversis sæpe differunt plantis, desumitur. Qua ratione partes hæ numero, figura, proportionem, situ distinguuntur, N. 13. & seq. exposuimus. Hæc fundamentum est generici characteris.

Singularis fructificationis structura ea est, quæ in paucissimis generibus observatur, v. g. in *Aro* stamina esse intra pistilla, in *Adoxa* germen intra calycem & corollam &c. Omnis singularis structura est differens, non vero vice versa.

46. Cum specierum notitia primarius sit studii botanici finis, ad specierum cognitionem curam omnem convertere necesse est: hæ namque realia sunt entia a Deo condita, seu, ut Linnæus ait, sunt diversæ formæ, quas Summus Conditor ab initio produxit, quæ for-

mæ secundum generationis inditas leges producunt plures sibi similes, quam quæ fuere. Ergo species tot sunt, quot diversæ formæ seu structuræ plantarum, rejectis istis, quas locus vel casus parum differentes exhibuit, hodienum occurrunt. Cognitione specierum, inquit Phil. Bot. p. 202., inititur omnis solida eruditio Physica, Oeconomica, Medica; imo omnis vera cognitio humana. Quo plures igitur Botanices studiosus species noverit, eo majores in re herbaria progressus se fecisse existimet. Quare notis characteristicis opus est, quibus speciem a specie dignoscere valeamus: notæ hæ a partibus secundariis, constantibus quidem, quantum fieri potest, desumantur, a radice videlicet, foliis, fulcris, inflorescentia, seu modo, quo flores pedunculo plantæ annectuntur, &c.

- * Partes hæ secundariæ nequaquam ita constantes sunt, ut nullas ab ipsa soli natura vicissitudines patiantur, tales igitur pro characteribus sumendæ sunt, quales plerumque deprehenduntur, licet interdum varient. Plures Cl. Linnæus species in Edit. secunda per notas a foliis petitas distinguit, quarum specierum Cl. Biwald,
- Ad-

Addit. ad Select. ex Amoenit. Acad. Dissert. diversa omnino folia animadvertit; videlicet in *Stellaria Holostea*, folia semper integerrima circa Græcium vidit, quæ juxta Linnæum est *foliis lanceolatis serrulatis*; in *Tussilagine alpina*, *foliis cordato orbiculatis crenatis* juxta Linnæum, folia jam integra, jam late crenata, crenis in spinam mollem desinentibus, detexit; in *Pediculari verticillata*, juxta Linn. *foliis quaternis*, jam quaterna jam terna haud raro observavit &c. &c.

47. Notæ, a partibus plantarum variantibus petitæ, distinctas species nequaquam constituunt, sed speciei *Varietates*: has plantæ ejusdem speciei, seu ex ejusdem speciei semine ortæ, at quocunque casu mutatæ, constituunt. Quis enim canes albos, nigros, maculis aspersos diversæ esse speciei pronuntiabit? Nota igitur, a *magnitudine* plantæ determinata, a *natali solo*, a *florendi tempore*, a *colore*, ab *odore*, a *sapore*, a *vi & usu*, a *plenitudine*, ab *hirsutie & crispatione*, ut ajunt &c. minime species discernit, experientia enim constat, hæc a cultura, climate, solo, tempore, casu &c. dependere.

* Ad

* Ad Botanicos plantarum varietates haud spectant: ne tamen per has multiplicentur species, aut confundantur, curam gerant, oportet. Varietatum usus in vita communi, oeconomia, arte medica, culina &c. pernecessariam earum cognitionem reddit. Ob publicum igitur commodum evidentiores varietates per notas suas juxta species adnotentur, præprimis naturales varietates a solo sexu desumptæ, ut *Cannabis mas*, *Cannabis femina*.

48. *Confusis generibus, confundi omnia necesse est*, ait Cæsalpinus. *Nullæ enim species, nisi antea constituta fuerint genera, certo distinguuntur*. Ignorato enim proprio genere, nulla descriptio, quamvis accurate tradita, certam demonstrat plantam, sed plerumque fallit. Genus est plurium distinctarum plantarum in notis characteristicis, primitus a Deo impressis, convenientia. Hinc omnia genera naturalia sint, necesse est, totque erunt genera, quot diversæ plantarum species certis & constantibus notis conveniunt.

* Character generis triplex est factitius, essentialis, & naturalis. *Factitius* character, unica nota constans, hujusmodi est, vi cujus

jus genus a genere ejusdem ordinis distinguitur, quales *Rajus*, *Tournefort*, *Rivinus* &c. ad genera ejusdem ordinis discernenda proposuere. *Character essentialis* unica nota generi competente propriissima, & singulari absolvitur; hinc per essentialem characterem facillime genera distinguerentur, & quidem maxime affinia. At an in omnibus id obtineri unquam potest? Hic opus, hic labor. Sunt quædam, in quibus singularem aliquam fructificationis notam advertimus, denticulos videlicet staminum in *Brunella*, *Euphrasia* &c; stamen mutilatum in *Curcuma* &c. poros nectariferos in petalorum unguibus N. 14. *Ranunculi* &c. &c. *Naturalis* character genericas omnes notas, fructificationis tempore plerumque occurrentes, adeoque etiam factitium characterem & essentialem complectitur. Hic proinde character methodis omnibus explicandis, ex fructificatione tamen desumptis, inservit, viamque novis systematibus sternit: nec immutaretur systema, si nova genera detegerentur; tantummodo superfluas omittendo notas corrigeretur, si novæ species deprehenderentur. Methodus e contra soli essentiali characteri innixa, novis detectis generibus, annon fallit?

49. *Classis* est plurium generum convenientia in nota quadam ex fructificationis partibus desumpta, qua ab aliis

aliis generibus distinguuntur, idque juxta naturæ & artis principia. *Ordines* sunt classes subalternæ ad sublevandam tironum memoriam confusionemque evitandam. Per hos genera inter se affinia propius collocantur; hinc facilius est pauca distinguere genera quam multa. Naturales quasdam dari *Classes*, pater ex *Graminibus*, *Umbellatis*, *Siliquosis*, *Leguminosis*, *Compositis* &c. At opus est artificiales quoque in auxilium vocare, cum omnia necdum detecta sint naturalia genera, Naturæ igitur opus semper est *Species* & *Genus*; culturæ sæpe *Varietates*; *Classis* vero & *Ordo* tum naturæ tum artis.

* *Classium* & *Ordinum* divisio a Linnæo secundum numerum vel situm staminum aut pistillorum potissimum instituitur. Ad naturam quidem floris N. 23. stamina & pistilla pertinent, minime vero eorundem numerus cum teste experientia a soli natura sæpe dependeat, fateatur enim Cl. Biwald *Addit.* &c. Tulipas in diverso solo crescentes 6. 7. 8. staminibus instructas non semel conspexisse; in *Vaccinio myrtilo* stamina jam 8. jam 10; in *Lythro salicaria* 10 — 12, in *Spergula pentandra* 5 — 8 deprehendisse;

Chysoplenium vero in classe decandrorum positum, nullum adhuc decandrum seu decem staminum vidisse, millena licet inspexerit. Numerum igitur staminum ac pistillorum a potiore plantarum parte ejusdem speciei Linnæus desumpsit, quas & ipse inspexit plurimas, & ab aliis fide dignis examinatas novit. Quidam ab externa plantarum facie notas petunt, verum nihil his fallacius, in his enim mirum quantum natura ludit. Quid colore, magnitudine &c. magis inconstans, & variabile?

50. Alterum Botanices fundamentum N. 44. est recta denominatio. An rectam plantarum cognitionem habere dicendus est, qui eas nominare minime novit? Plantæ omnes generico & specifico nomine notentur, opus est. Nomen quidem genericum, si præcipuum characterem, vel plantæ habitum, aut similitudinem indicantem, exprimit, optimum est. Quæcunque igitur vegetabilia genere conveniunt, eodem generico gaudeant nomine, ita ut, si quis novum genus invenerit, novum quoque nomen eidem imponere teneatur.

* Multa generica deprehenduntur nomina, ad nomen Virorum de re herbaria optime meritorum immortalitati consecrandum imposita. Optime quidem; verum ne quid nimis

51. Specificum nomen primarias notas, quibus species a specie sub eodem genere differt, denotet; hinc nomen ipsum specificum primo intuitu plantam manifestabit. Cum igitur secundariæ N. 44. plantæ partes differentias specierum exhibeant, ex his specifica petenda sunt nomina, minime vero ex notis casu oblatis, loco scilicet, tempore, usu &c.

52. Nomina Classium & Ordinum notam aliquam characteristicam Generis enuncient, necesse est. Ex primariis igitur, quantum fieri potest, fructificationis partibus desumantur, systematica enim vocabula ejusmodi sint, oportet, quæ ad plantæ naturam seu essentiam significandam apta sunt: quare a viribus, radice, habitu &c. desumpta, haud probanda sunt.

* Cum in Tournefortiano systemate pleræque

Classēs artificiosæ fuerint, harum denominatio ab Inventoris arbitrio dependebat.

53. Primus omnium circa 1541. Conradus Gesnerus Helvetus censuit, vegetabilia juxta characteres, ex fructificatione depromptos, in sua genera distribuenda esse, systematicam etiam plantarum historiam digessisset, nisi facto fuisset præventus. Primus re ipsa vegetabilium systema in lucem 1582. edidit Andreas Cæsalpinus Med. Prof. Pisanus, dein Clementis VIII. Pontif. Max. Medicus. Methodum is a cornu N. 20. & receptaculi N. 22. situ ducit, monocotyledonum N. 21*. & dicotyledonum varietatem adfert, septa loculorum in filiquis seu ad horizontem posita, seu opposita notat, fructus multiloculares N. 19. & multicapsulares distinguit &c. Sexdecim plantarum Classes, sexdecim complexus libris, Francisco Medicæo Magno Heruriæ Duci dicavit.

54. Cæsalpini systema in oblivionem fere venisset, nisi mox id Robertus Morison Scotus Professor Oxoniensis, dein

dein a Duce Aurelianensi Gustavo Regio Blesensi horto præfectus, suscitasset. Hic divisionem 18. Classium a solo fructu ejusque receptaculo petiit. Hos circa 1690. Paulus Hermannus Hallensis Botanices Lugduni Batav. Professor secutus est: primum plantas in gymnospermas N. 21*. & angiospermas dividit, tum illas a feminis, has a loculamentorum numero ulterius in 25. Classes dispescit. Eadem fuit methodus Joannis Ray Academici Lond., nisi quod præterea characteristicas notas ex floribus, foliis &c. desumpserit. Rivinus Lipsiensis Professor 1690. tum a numero & petalorum æqualitate, tum a nudo fructu vel pericarpio sicco aut carnoso systema suum deducit, & 18. constituit Classes.

55. Josephus Pitton Tournefort 1694 tribus voluminibus *Institutiones Rei Herbariæ* Parisiis edidit. Plantas omnes in 22. Classes distribuit, quarum septendecim herbas & suffrutices N. 4*; reliquæ quinquæ arbores fruticesque comprehendunt. Classes a corolla; Classium

Ordines a situ receptaculi floris supra aut infra germen, a pistillo, aut calyce in fructum abeunte; Genera a flore, fructu, aut seminibus determinavit; Varietates a speciebus haud satis distinxit, nec Generum puritati ubique prospexit.

* I. Classis herbas & suffrutices, floribus monopetalis N. 14. in campanæ figuram complicatis ornatos, continet; hinc flores hos novo nomine *campaniformes* Tournefortius vocat, ut *Convolvulus*, *Malva*. Hæc Classis minime naturalis est, pleraque enim genera præter corollam in cæteris fructificationis partibus a se invicem maxime differunt; quin quorundam corolla infundibuli formam campanæ loco exhibet. II. Classis eas complectitur, quarum flos monopetalus infundibuli speciem refert; hinc *infundibuliformis* dicitur, ut *Nicotiana*, *Jasminum*, *Primula veris*. Hæc item Classis artificiosa est, excepta enim corolla, reliquæ fructificationis partes haud conveniunt. Plures quoque species corolla gaudent, quæ eodem jure campaniformis dicenda esset. III. Classis florem monopetalum gerit, at diversæ figuræ, jam auritus vel cucullatus, ut ajunt, est, jam tubulatus in linguam desinens, jam limbo utrinque patente, jam tubulatus persona-

sonatus; idcirco a Tournefortio flores hi *anomali* nuncupantur, ut *Digitalis*, *Euphrasia*. In hac Classe vegetabilia nec corolla nec aliis fructificationis partibus affinia sunt; quin ob plures characteristicas notas quædam ad quartam Classem spectarent: minime igitur Classis hæc naturæ tribuenda est. IV. Classis item monopetalum florem refert, cuius fastigium in duas partes oris instar divisum est; hinc flores *labiati* appellantur, ut *Salvia*, *Mentha*. Hæc Classis propter characteristicas quasdam fructificationis notas omnibus generibus, sub hac comprehensis, communes naturalis dicenda est. V. Classis flore polypetalo gaudet & quidem tetrapetalo. Cum petala quatuor decussatim crescant, flos *cruciformis* dicitur, ut *Nasturtium*, *Brassica*. Hæc quoque fere naturalis est. VI. Classis flores pluribus quam quatuor petalis adornantur, hos, similitudine a rosa sumpta, Tournefort *rosaceos* nuncupavit, ut *Geranium*, *Ranunculus*. Classis hæc mere artificiosa est, notæ enim characteristicæ ex pluribus fructificationis partibus desiderantur. Alii Authores plantas has ad plurimas Classes varias disposuere. VII. Classis ea numerat vegetabilia, quorum flores & polypetali & rosacei in corimbum N. 8 **, aut umbellam N. 25 *. ordinati sunt, vocanturque *umbellati*, ut *Cicuta*, *Angelica*. Ob plures characteristicas communes notas Classis hæc naturalis dicenda est.

est. VIII. Classis flores sunt polypetali ro-
facei, quorum petala oblongo calyce tubi
instar comprehenduntur: flores hi a caryo-
phyllo *caryophyllæi* audiunt, ut *Caryophil-*
tus, *Linum*. Calyx horum tubulosus est,
petala vero longis unguibus, calyce te-
ctis, donata: utrumque in omnibus Classis
hujus generibus haud reperitur, ut plu-
res *Lychnidis* &c. species docent, idcirco
naturalis minime est, sed ex Authoris
arbitrio orta. IX. Classis *liliaceos* flores
obtinet, sic dictos; quod nonnulla gene-
ra, secus licet plurima, *Lilii* speciem, ad
hanc classem spectantis, referant. Cum
Lilium sit hexapetalum, *Lilium* vero *Con-*
vallium, *Hyacinthus* &c. monopetalus, co-
rolla utique inter se differunt: hæc ni-
hilominus Classis, cum notis ex fructifica-
tione desumptis non destituatur, natura-
lis est, ad quod tamen systematis Author
non attendit. X. Classis herbas suffrutices-
que flore polypetalo papilionaceo N. 14.
comprehendit, ut *Faseolus*, *Cicer*. Classis
hæc ob communes notas, ex fructificatio-
ne desumptas, naturalis est. Ad XI.
Classem herbæ & suffrutices flore simpli-
ci polypetalo, figuræ tamen dissimilis,
spectant, hinc flores polypetali anomali vo-
cantur, ut *Balsamina*, *Viola*. Hæc Classis
minime naturalis est, partibus enim fru-
ctificationis diversissimis, corolla dispari,
nonnisi flore polypetalo gaudet. Tres se-
quentes Classes herbæ & suffrutices flore
com-

composito constituunt; & quidem XII. eæ, quæ flore sunt *flosculoso*, seu tali, qui ex plurimis flosculis dense positus, & eodem calyce comprehensus, constat, ut *Scabiosa*: sunt autem flosculi ad mentem Tournefortii corollulæ in floribus compositis fistulosæ tenues, quarum suprema pars multifariam ampliatur, sæpe stellæ inftar divisa. XIII. Classem flore *semiflosculoso* gaudentes componunt, seu flore ex plurimis semiflosculosis dense in orbem positus, eodemque calyce comprehensus, composito, ut *Scorzonera*, seu *Serpentaria*: est vero juxta Tournefort semiflosculus petalum inferna parte fistulosum, media & superna planum, ac veluti in ungulam productum. XIV. Classem herbæ & suffrutices flore *radiato* efficiunt, ut *Senecio* seu *Jacobæa*: flos radiatus Tournefortii opinione est is, cujus discum flosculi, peripheriam semiflosculi occupant. XV. Classis herbas & suffrutices flore *apetalo* seu *stamineo* habet, ut *Hordeum*, *Siligo*. XVI. eas, quæ flore *sensibili*, non tamen *sensibili semine* carent, ut *Filix*. XVII. Denique Classis herbas suffruticesque, flore *fructuque sensibili* carentes, complectitur, ut *Fungi*, *Muscus*. Sequentes Classes arbores & frutices N. 4 *. comprehendunt, & quidem XVIII. eas, quæ flore sunt *apetalo*, ut *Buxus*, *Empetrum*. XIX. eas, quæ flore sunt *apetalo amentaceo*, seu ex foliolis quibusdam composito & axi affixo amenti si-

ve lori instar, ut *Nux*, *Corylus* &c. XX. eas, quæ flore sunt monopetalo, ut *Ulmus*, *Laurus*. XXI. eas, quæ flore rolaceo præditæ sunt, ut *Cerasus*, *Tilia*. XXII. denique Classis arbores & frutices flore papilionaceo continet, ut *Genista*, *Colutea*, *Coronilla*.

56. Veteres in quibusdam tantum plantis, iisque perpauca sexum distinguere, notas tamen, quibus alter ab altero sexu dignosceretur, minime perspexerunt, ita ut maribus feminas, feminas maribus substituerint, uti ex Theophrasti, Plinii, Dioscoridis, Galeni, aliorumque scriptis aperte colligimus. Bauhinus, Morifonus, Tournefortius aliique quam plurimi de plantarum sexu sententiam alto despexerunt supercilio. Millington Thomas Eques Anglus Savilianus Professor primus in hanc veritatem eruendam 1676 incubuisse videtur, viamque Grewio aperuisse, qui in *Plantarum Anatome* sexus diversitatem, modumque, quo vegetabilia fecundantur, egregie 1685 scrutatus est. Omnium vero primus Vaillantius in oratione de *Structura florum* 1717. plantarum sexum distincte

explicuit, multisque observationibus confirmavit cujus sententiam 1720 Cl. Blair in *Botanick Essays* commentariis etiam illustravit, eamque insignis usus Botanicis futuram demonstravit.

57. Celeberrimus denique Linnæus 1735 plantarum sexum ea certitudine firmavit, ut eidem novum systema superstruere minime dubitaverit. Plantas igitur examinandas diverse ante oculos proponit; imprimis quatenus flore gaudent conspicuo, & quidem hermaphrodito; deinde quatenus una eademque planta & masculis & femineis instructa est floribus; tum quatenus in diversis plantis ejusdem tamen speciei jam masculi jam feminei flores vigent; tum quatenus in plantis videre est hermaphroditos flores una cum masculis aut femineis, aut etiam cum utrisque sociatos; denique hujusmodi, quarum flores vix ac ne vix quidem nudis oculis conspiciuntur.

58. En Classes Classiumque characteres I. *Monandria*, a voce græca *monos*

nos unicus & *anir* vir, plantas, cujus flores hermaphroditi unico instructi sunt stamine, complectitur. II. *Diandria*. Stamina duo in flore hermaphrodito. III. *Triandria* Stamina tria in fl. herm. IV. *Tetrandria* Stamina quatuor ejusdem nempe longitudinis in flor. herm. V. *Pentandria* Stamina quinque in fl. herm. VI. *Hexandria* Stamina sex ejusdem longitudinis in fl. herm. VII. *Heptandria* Stamina septem in fl. herm. VIII. *Octandria* Stamina octo in fl. herm. IX. *Enneandria* Stamina novem in fl. herm. X. *Decandria* Stamina decem in fl. herm. XI. *Dodecandria* Stamina duodecim, aut etiam undecim usque ad viginti, in fl. herm. XII. *Icosandria* Stamina plerumque viginti, sæpe plura, raro pauciora, calyci tamen non vero receptaculo insidentia, in fl. herm. XIII. *Polyandria*, a voce græca *polys* multus & *anir* vir. Stamina a 20 ad 1000 in fl. herm. receptaculo adnata.

* Hæ tredecim Classes per diversum pistillorum numerum in plures Ordines distribuuntur, desumpto nomine a græcis numeris *monos*, *dis* &c. & *gyni* femina; hinc

Monogynia, *Digynia*, *Trigynia* &c. *Polygynia*.

Classicus Icosandriæ character, quo a Polyandria differt, minime est staminum numerus, cum non omnia genera viginti, sed pluribus etiam gaudeant; verum per hoc distinguitur, quod in Icosandria stamina omnia lateri calycis vel corollæ, in Polyandria vero receptaculo inserta sint.

59. XIV. *Didynamia*, a voce græca *dis* bis, & *dynamis* potentia. Stamina quatuor in fl. herm. corollæ tubo inserta, versus ejusdem dorsum inclinata, parallela, corollæ longitudinem vix superantia, quorum duo intermedia & proxima breviora. Calyx monophyllus N. 13., erectus, tubi instar, quinquefidus N. 13. Corolla monopetala N. 14. cujus basis tubuli instar nectarii N. 14. vices subit, limbus vero plerumque in duo labia divisus. Stigma ut plurimum bifidum.

* Classis hæc & *gymnospermas* N. 21*, & *angiospermas* plantas continet, hinc in hos duos Ordines dividitur. Flores hujus Classis a Tournefortio *labiati* & *personati* appellantur, maximam partem erecti, pa-
rum

rum a caule ad acutum angulum inclinantur, ut corolla facilius antheras tegat, ne pollen pluviae eluant.

60. XV. *Tetradynamia* Stamina sex erecta, quorum duo opposita ejusdem sunt ac calyx longitudinis, quatuor reliqua paulo longiora, attamen corolla breviora. *Calyx* tetraphyllus est, oblongus, foliolis ovato oblongis, concavis. Cum hic calyx nectarium agat, ejusdem basi gibbus sæpe & varie adnascitur. *Corolla*, cruciformis a Tournefortio dicta, quatuor æqualibus petalis constat. *Stigma* obtusum.

* Hæc Classis in duos Ordines distribuitur, in plantas *siliculosas*, id est præditas brevi siliqua N. 19*. subrotunda, stylo instructa ejusdem sæpe ac silicula longitudinis; & in *siliquosas*, id est siliqua longiore gaudentes, vix notabili stylo adornata. Ab omnibus hæc Classis inter naturales assumitur.

61. XVI. *Monadelphica*, a voce græca *monos* unicus, & *adelphos* frater. Stamina in fl. herm. velut fratres ex
una

una basi ut matre provenientia, seu quorum fila superne quidem distincta, inferne autem in unum corpus coaluere. *Perianthium* in his semper persistit, in plurimis duplicatum est. *Corolla* ex quinque petalis *obcordatis*, ut ajunt, exsurgit. *Stigmata* patentia, tenuia.

* Classis hæc naturalissima ob diversum staminum numerum in suos Ordines dividitur, in plantas nempe *pentandrias*, *decan-drias*, *enneandrias*, *dodecandrias*, & *polyandrias*. Genera vero a Linnæo ratione varii calycis distinguuntur. Tournefortius plerisque ex his monopetalam corollam addixit, quia tamen quinque petala basi distincta gaudent N. 14., licet filis in unum corpus coalitis adhæreant, pentapetala rectius dicenda est.

62. XVII. *Diadelphia*. Stamina in fl. herm. ex duplici base tanquam ex duplici matre oriuntur, seu quorum fila corpora duo constituunt, ita ut stamina duobus velut filamentis crassioribus, inæqualibus constare videantur, quorum unum inferius pistillum involvit, alterum superius pistillo incumbit: *inferius* quidem filamentum germen tegens,

gens, membranaceum cylindri instar est, & juxta longitudinem sursum dehiscit, inde in novem ut plurimum partes *subulatas*, ut ajunt, seu quæ inferius ejusdem sunt latitudinis, at sensim apicem versus attenuantur, longitudinem & flexuram carinæ N. 14*. petalorum imitantes, desinit; filamentum *superius subulatosetosum*, simplex & secundum gradus brevius existit, basi sua dehiscit, & melli utrinque exitum parat. *Perianthium* monophyllum, cujus basis gibba, inferne pedunculo annexa, superne obtusa, mellifera. *Corolla* papillionis instar; hinc juxta Tournefort flores hi *papilionacei* N. 14*. *Stigma* nonnihil pilosum. *Pericarpium* legumen N. 19*. oblongum est.

* Numerus staminum Ordines constituit; hinc *Hexandria*, *Octandria*, *Decandria*. Classis hæc naturalissima est, & structura inter omnes singularis florum, qui ad angulum acutum a perpendiculari pendent.

63. XVIII. *Polyadelphia* Stamina ex pluribus basibus veluti pluribus matribus quam duabus oriuntur, seu quorum
rum

rum fila in tria, quatuor, aut plura corpora coaluere.

* *Pentandria, Icosandria, Polyandria* a staminum numero Ordines efficiunt.

64. XIX. *Syngenesia*, a voce græca *syn* simul, & *genesis* generatio. Stamina in fl. herm., quorum antheræ, raro autem fila, in cylindrum coaluere. Compositos flores hæc Classis continet, de quibus N. 25*. mentionem fecimus.

* Ordines in hac classe magis a ceteris differunt, & quidem distributio fit. 1. In *Polygamiam æqualem*, quæ flosculos N. 25. hermaphroditos omnes ita complectitur, ut vel tubulosi N. 25*. tam in disco quam in peripheria sint; vel ligulati N. 25*. & in disco & in ambitu; vel tubulosi in disco, ligulati in peripheria. 2. In *Polygamiam spuriam* & quidem in *superfluam*, cum scilicet flosculi hermaphroditi discum occupantes, & flosculi feminei marginem constituentes femina ferunt. Constat autem hic Ordo vel flosculis in disco & in peripheria tubulosis; vel tubulosis in disco, ligulatis in ambitu; vel tubulosis in disco, in peripheria vero nudis N. 25*. 3. In

Polygamiam spuriam frustraneam, cum flosculi disci hermaphroditi semen producant, quo carent peripheriam efficientes, utpote neutri N. 25. 4. In *Polygamiam spuriam necessariam*, cum flosculi disci hermaphroditi tubulosi ob defectum stigmatidis pistillorum fecundari, & femina perficere nequeunt; feminei vero nudi in peripheria positi perfecta edunt femina. 5. In *Polygamiam segregatam*, cum flosculi plures, communi calyce comprehensi, propriis etiam perianthiis instruantur. 6. In *Monogamiam* denique. Ordo hic minime flosculos sed flores hermaphroditos simplices complectitur, quorum antheræ compositorum more in unum coalescunt. Necessarius quidem ob assumpta systematica principia erat hic Ordo, impedit tamen, quominus Classis Syngenesiæ universa naturalis sit.

65. XX. *Gynandria*, a voce græca *gyni* femina, & *anir* vir, quia pistilla cum staminibus monstrose connascuntur. *Gynandria* a reliquis situ staminum in ipso stylo, vel in receptaculo in formam styli elongato, pistillumque cum staminibus ferente, dignoscitur. Singulares sunt hujus Classis flores, & monstrosam præ se ferunt faciem, quod

ab insolito partium fructificationis situ
oritur.

* Ob diversum staminum numerum diversi
exsurgunt Ordines, *Diandria* videlicet,
Triandria, *Tetrandria*, *Pentandria*, *Hexan-*
dria, *Octandria*, *Decandria*, *Polyandria*. Pri-
mus Ordo naturalis est, cujus genera so-
lo nectario differunt. Singularis omnino
est fructificationis structura, *germen* enim
semper inferum & contortum est; *petala*
quinque, quorum duo interiora sæpius ga-
leam N. 14 *. efformant, labium inferius
nectarium constituit, pistilli & petali sex-
ti locum occupans; *fila* semper duo bre-
vissima; fructus capsula est unilocularis
N. 19. trivalvis.

66. XXI. *Monoecia*, a voce græca
monos unicus, & *oikia* domus, quod
flores masculi & feminei in eadem plan-
ta, quasi in eadem domo sint; hinc
hujusmodi plantæ etiam *androgynæ* vo-
cantur. Si communi calyce flosculi se-
xu diversi comprehenduntur, tunc in
hac Classe non includuntur, ne confu-
sio oriatur. XXII. *Dioecia* flores ma-
sculi & feminei in diverso individuo
seu planta ejusdem speciei existunt.
Mares itaque in hac Classe e femini-

bus feminarum nascuntur; hæ, absente mare, speciem suam propagare nequeunt, ut ex præcedentibus patet. Sunt quædam species mares & feminae, ut *Morus*, *Urtica*, *Carex* &c. in hac Classe minime contentæ, quod non omnes species ejusdem generis flores mares & feminas in diversis plantis habeant, sic flores feminei *Mori* jam in eadem planta cum masculis, jam in diversa conspiciuntur. XXIII. *Polygamia*, a voce græca *polys* multus, & *gamos* nuptiæ, quod flores hermaphroditi vel cum masculis vel cum femineis, vel cum utrisque, aut in eadem aut in diversa planta deprehendantur. Necessè itaque est, ut flos hermaphroditus semper adsit; alter autem, qui polygamiam constituit, aut masculus aut femineus, aut etiam uterque fit.

* Ordines Monoeciæ & Dioeciæ sequentes sunt. *Monandria*, *Diandria*, *Triandria*, *Tetrandria*, *Pentandria*, *Hexandria*, *Heptandria*, *Polyandria*, *Monadelphica*, *Syngenesia*, *Gynandria* &c. *Polygamix* vero *Monoecia*, *Dioecia*, *Trioecia*. Termini ex præcedentibus facili negotio intelliguntur.

67. XXIV. *Cryptogamia*, a voce græca *cryptos* occultus, & *gamos* nuptiæ, quod flores intra fructum, aut parvitate sua, aut quocunque alio modo occultentur.

* Ordines hujus Classis sunt . 1. *Filices*, plantæ firmæ, & plerumque siccae, nam aquaticæ etiam nonnullæ existunt, *Dorsiferae*, *Epiphyllöspermæ*, & *Capillares* vulgo dictæ, quarum fructificatio vel in foliorum dorso est, vel in spicis aut scapis distinctis, vel ad radices circa foliorum exortum; hinc 1. in *frondosas*, 2. in *spicatas* scapo hærentes, 3. in *radicales* dividuntur. 2. *Musci*, plantæ perennes, foliis, a caule distinctis, gaudent, quibus viror perpetuus est, calore quidem & siccitate amittitur, at aqua denuo reparatur. Juxta Dillenii principia in eos distribuuntur, qui calyptra N. 13*. instructi sunt, aut eadem destituuntur, qui flore masculino & femineo vel in eodem vel in diverso individuo ornantur. 3. *Algæ* N. 4. perennes calorem haud ferunt, aqua intumescunt, substantia fruuntur pulverulenta, lanuginosa, florum instar, foliacea, gelascente, flore gaudent apetalo, nudo, non manifesto masculino & femineo seorsim in eadem aut diversa planta, plurima producunt semina haud manifesta, sæpius ag-

gregata . 4. Fungi N. 4. juxta Dillenii principia divisi floribus ornantur apetalis nudo oculo minime manifestis, stamineis, nudis, a femineis seorsim in eadem planta positis.

68. Novæ post Linnæanum systema Cl. Crantzii Instit. Med. & Materiae Medic. Vindob. Prof. *Institutiones Rei Herbariæ juxta nutum naturæ digestæ ex habitu* A. 1766. in lucem prodire. Vegetabilia is in quindecim partitur Classes, priores tredecim ex habitu, posteriores duas artificiosas ex staminum numero disponit. Quid per habitum intelligat, ipsum audire juvat, p. XV. hæc habet. *Est enim externa in creatis pene omnibus facies sive habitus, illa absoluta vis, illa superior potentia, quæ quantocyus in similitudinis vel dissimilitudinis assensum rebellem etiam rationem rapiat, & inter hæcce agnationis stabiliat gradus, aut summæ ponat metum discrepantiæ, est ipse habitus, qui etiam in humana specie judicia nostra expugnet &c.* Idcirco methodus hæc facillima & vel maxime naturalis in *Libello Primarum Institutionum Botanica-*

rum Clarissimi Viri Crantzii pronuncietur. Cum enim omnis creata res suam formam habeat, omnium rerum formæ similitudinis aut dissimilitudinis absolutam ab adorando Creatore his ingeneratam necessitatem, hac a nobis hauriantur, haustæ percipiantur, perceptæ suam aut similitudinem aut dissimilitudinem animæ brevi patefaciant, & patefaciant puero rustico adeo bene ac botanico, propositionem probandam plusquam demonstratam reor, scilicet methodum ex habitu desumptam nobis facillimam esse, & jam a teneris annis haustam vel maxime naturalem, eam nempe nostram primam fuisse cognitionem, eam nobiscum adolevisse, & longo usu firmatam magis esse originalem nostram methodum.

- * I. Classis est *Cryptantharum*, seu earum, in quibus fructificationis partes nudo oculo satis distingui nequeunt, quales sunt Filices, Musci, Algæ, Fungi. Naturæ nutum secutus, ut ipse ait, Cl. Author nullas conspicua fructificatione gaudentes plantas magis præcedentibus affines deprehendit, quam incompletas, vulgo dictas, seu corolla, vel staminibus aut pistillo carentes, has igitur II. Classi asseruit. Classis hæc

hæc pluribus subiecta est difficultatibus, ut Cl. Crantzius ipse candide fatetur, quas, ut negotium fert, tollere adlaborat. III. *Compositarum* Classis est, quæ uno communi receptaculo plures continet flosculos. IV. *Classem Gramina* constituunt. V. *Palmae*, absolutum harum habitum spatha spadixque efficiunt, licet reliquæ partes diversissimæ. VI. *Liliaceæ* plantæ, seu habitu *Liliis* similes. VII. *Ringentes* seu corolla monopetala personata & labiata N. 14*. Tournefortio dicta & gaudentes. VIII. *Papilionaceæ*. IX. *Cruciformes*. X. *Umbelliferae*. XI. *Columniferae*, quæ stamina, in columnam tota longitudine floriferam, patentem, educta, gerunt. XII. *Calycifloræ*, seu stamina calyci inserta & floris receptaculum per totum sese diffundens calycem, gerentes. XIII. *Classis Fructiflorarum* est, quæ nempe calycem vel florem superum, fructum vero inferum possident, seu juxta Tournefortium quarum calyx aut pistillum abit in fructum. Plantæ denique, quæ manifestum præcedentium habitum haud præ se ferunt, vel pauciora quam viginti stamina obtinent, vel plura; si pauciora, *Pauci-staminearum* XIV. Classe, si plura, *XV. Classe Multi-staminearum* includuntur.

C A P U T IX.

Classes, Ordines, & Genera
Plantarum.

CLASSIS I. MONANDRIA. Fig. 1.

I. MONOGYNIA.

1. **C**anna Linn., Can-
nacorus Tournef.
2. Amomum Linn.
3. Costus Linn.
4. Alpinia Linn., Al-
pina Plum.
5. Maranta Plum.
6. Curcuma Linn.
7. Kæmpferia Linn.
8. Thalia Linn., Cor-
tusa Plum.
9. Boerhavia Vaill., An-
tanisophillum Vaill.
10. Salicornia Tournef.
11. Hippuris Linn., Li-

mnopeuce Vaill. Act.
Par. 1719., Pina-
stella Dill.

II. DIGYNIA.

12. Corispermum Just.
Act. Par. 1712.
13. Callitriche Linn.,
Stellaria Dill.
14. Blitum Linn., Che-
nopodium Boeth.
Morocarpus Rupp.
15. Cinna Linn., Ca-
nadensis species gra-
minis.

CLASSIS II. DIANDRIA. Fig. 2.

I. MONOGYNIA.

16. **N**ymphaea Linn.
17. Jasminum Tournef.

18. Ligustrum Tournef.
19. Phillyrea Tournef.
20. Olea Tournef.
21. Chionanthus Royen.
22. Syringa Linn., Li-
lac

- lac Tournef.
 23. Eranthemum Linn.
 24. Circaea Tournef.
 25. Veronica Tournef.
 26. Pæderota Linn.,
 Bonarota Mich.
 27. Justicia Houst. A. A.,
 Adhatoda Tournef.
 28. Dianthera Gronov.
 29. Gratiola Linn.
 30. Pinguicula Tournef.
 31. Utricularia Linn.,
 Lentibularia Vaill.
 Aët. Par. 1719.
 32. Verbena Tourn.,
 Sherardia Vaill.,
 Blairia Houst. Kæm-
 pferia Houst.
 33. Lycopus Tournef.
 34. Amethystea Linn.,
 Amethystina Amman.
 35. Cunila Linn., He-
 dyosmos Royen.
 36. Ziziphora Lian.,
 Acinos Moris.
 37. Monarda Linn., Cli-
 nopodium Moris.
 38. Rosmarinus Tournef.
 39. Salvia Tournef.,
 Horminum Tourn.,
 Sclarea Tournef.
 40. Collinsonia Linn.
 41. Morina Tourn., Dio-
 totheca Vaill. Aët. Par.
 1722.
 42. Schwenkia Royen.

II. DIGYNIA.

43. Anthoxanthum Linn.
 Graminis species
 Scheuchz.

III. TRIGYNIA.

44. Piper Linn., Sau-
 rurus Plum.

CLASSIS III. TRIANDRIA. Fig. 3.

I. MONOGYNIA.

45. **V**aleriana Tourn.
 Vaill., Vale-
 rianella Tourn., Vaill.
 46. Olax Linn.
 47. Tamarindus Tourn.,
 Jacq.
 48. Rumpfia Linn.
 49. Cneorum Linn.,
 Chamælea Tournef.
 50. Canocladia Brown,
 Jacq.
 51. Melothria Linn.,
 Bryoniae Spec. Plum.
 52.

II. DIGYNIA.

52. *Ortegia* Loefling.
 53. *Loeflingia* Linn.
 54. *Polycnemum* Linn.
 55. *Hippocratea* Jacq.,
Coa Plum.
 56. *Crocus* Tournef.
 57. *Ixia* Linn.
 58. *Gladiolus* Tournef.
 59. *Antholyza* Linn.
 60. *Iris* Tourn. *Xiphion*
T., *Sisyrinchium* T.,
Hermodactylus T.
 61. *Moræa* Mill.
 62. *Wachendorfia* Bur-
mann.
 63. *Commelina* Plum.,
Zanonia Plum.
 64. *Callisia* Loefl., *Ha-*
palanthus Jacq.
 65. *Xyris* Gronov.
 66. *Schoenus* Linn.,
Cyperella Mich.,
Pseudocyperus Mich.,
Melanoschoenus
Mich.
 67. *Cyperus* Mich. Tourn.
 68. *Scirpus* Mich. Tourn.
Scirpocyperus Mich.
 69. *Eriophorum* Linn.,
Linagrostis Mich.,
Tourn.
 70. *Nardus* Linn.
 71. *Lygeum* Loefl.
 72. *Bobartia* Linn.
 73. *Cornucopiae* Linn.,
Cornucopioides Scheu-
chz.
 74. *Saccharum* Linn.
 75. *Phalaris* Linn.
 76. *Paspalum* Linn.
 77. *Panicum* Linn.,
Gramina aliqua pa-
nicea Scheuchz.
 78. *Phleum* Linn.
 79. *Alopecurus* Linn.,
Gramina aliqua alo-
pecuroidea Scheuchz.
 80. *Milium* Tournef.
 81. *Agrostis* Linn.
 82. *Aira* Linn.
 83. *Melica* Linn.
 84. *Poa* Linn., *Grami-*
nis paniculati spec.
Scheuchz.
 85. *Briza* Linn., *Gra-*
mina aliqua tremu-
la Scheuchz.
 86. *Uniola* Linn.
 87. *Dactylis* Roy.
 88. *Cynosurus* Linn.,
Gramen cristatum
Scheuchz.
 89. *Festuca* Dill.
 90. *Bromus* Mont.,
Ac-

Aegilops Dill., *Festuca graminea* Scheuchz.

91. *Stipa* Linn.

92. *Avena* Tourn. *Gramina avenacea* Scheuchz.

93. *Lagurus* Linn. *Gramina aliquot tomentosa* Scheuchz.

94. *Arundo* Scheuchz.

95. *Aristida* Linn.

96. *Lolium* Linn., *Gramina aliquot loliacea* Scheuchz.

97. *Elymus* Linn.

98. *Secale* Linn., *Gramen secalinum* Scheuchz.

99. *Hordeum* Tournef.

Gramen hordeaceum Scheuchz.

100. *Triticum* Tournef.,

Gramen triticeum Scheuchz.

III. TRIGYNIA.

101. *Eriocaulon* Gronov.

102. *Montia* Mich. ;

Cameraria Dill. ; *Alsinoides* Vaill.

103. *Proserpinaca* Linn. *Trixis* Mitch.

104. *Triplaris* Leofl.

105. *Holosteum* Linn.

106. *Polycarpon* Loeffl.

107. *Mollugo* Linn.

108. *Minuartia* Loeffl.

109. *Queria* Leofl.

110. *Lechea* Kalm.

CLASSIS IV. TETRANDIA. Fig. 4.

I. MONOGYNIA,

111. **L** *Eucadendron* Linn., *Lepidocarpodendron* Boerb., *Hypophyllocarpodendron* Boerb.

112. *Protea* Linn., *Conocarpodendron* Boerb.

113. *Globularia* Tourn.

Alypum Niss. Aët. Par. 1712.

114. *Cephalanthus* Linn. *Platanocephalus* Vaill. Aët. Par. 1722.

115. *Dipsacus* Tournef., Vaill.

116. *Scabiosa* Tourn., Vaill. : *Asterocephalus* V., *Succisa* V., Pte-

- Pteleoccephalus* V.
 117. *Knautia* Linn.,
Lychniscabiosa Boerb.
 118. *Allionia* Loefl.
 119. *Hedyotis* Linn.
 120. *Spermacoce* Dill.
 121. *Sherardia* Dill.
 122. *Asperula* Linn.
 123. *Diodia* Gronov.
 124. *Knoxia* Linn.
 125. *Houstonia* Gronov.
 126. *Galium* Linn.,
Gallium Tourn., *A-*
parine T.
 127. *Crucianella* Linn.,
Rubeola Tourn.
 128. *Rubia* Tourn.
 129. *Fuchsia* Plum.
 130. *Siphonanthus* Linn.;
Siphonanthemum
Amm. Act. Petrop. 1756.
 131. *Catesbæa* Gronov.
 132. *Ixora* Linn.
 133. *Pavetta* Linn.
 134. *Petelia* Brown.
 135. *Mitchella* Linn.,
Chamædaphne Mitch.
 136. *Callicarpa* Linn.,
Sphondylococcus
Mitch.
 137. *Aquartia* Jacq.
 138. *Polypremum* Linn.
 139. *Penæa* Linn.
 140. *Blæria* Linn.
 141. *Buddleja* Houst.
Amoen. Acad.
 142. *Exacum* Linn.
 143. *Plantago* Tourn.,
Coronopus T., *Psyl-*
lium T.
 144. *Scoparia* Linn.
 145. *Rhacoma* Linn.,
Crostopetalum
Brown.
 146. *Centunculus* Dill.,
Anagallidastrum
Mich.
 147. *Sanguisorba* Linn.
 148. *Cissus* Linn.
 149. *Epimedium* Tourn.
 150. *Cornus* Tourn.,
Virga sanguinea Dill.
 151. *Fagara* Brown.
 152. *Tomex* Linn.
 153. *Ptelea* Linn.
 154. *Ludwigia* Linn.
 155. *Oldenlandia* Plum.
 156. *Ammannia* Houst.
A. A.
 157. *Isnardia* Linn.,
Dantia Petit.
 158. *Trapa* Linn., *Tri-*
buloides Tourn.
 159. *Dorstenia* Plum.
 160. *Elæagnus* Tour-
nesf.

161. *Brabejum* Linn.
 162. *Krameria* Loefl.
 163. *Rivinia* Linn., *Rivina* Plum., *Solanoides* Tourn. *Piercea* Mill.

164. *Salvadora* Garcin. *Ast. Angl. & Am. Acad.*
 165. *Camphorosma* Sauvag., *Camphorata* Tourn.

166. *Alchemilla* Linn., *Alchimilla* Tourn.

II. DIGYNIA.

167. *Aphanes* Linn., *Percepier* Dill.
 168. *Crucita* Loefl.
 169. *Bufonia* Sauvag., *Alsinoides* Razi.

170. *Hamamelis* Linn., *Trilopus* Mitch.

171. *Cuscuta* Tournef.

172. *Hypecoum* Tournef.

III. TETRAGYNIA.

173. *Ilex* Linn., *Aquifolium* Tourn., *Dodonaea* Plum.

174. *Coldenia* Linn.

175. *Potamogeton* Tournef.

176. *Ruppia* Linn. *Buccaferrea* Mich.

177. *Sagina* Linn. *Alsinella* Dill.

178. *Tillaea* Mich.

179. *Myginda* Jacq.

CLASSIS V. PENTANDRIA. Fig. 5.

I. MONOGYNIA.

180. **H** *Eliotropium* Tournef.

181. *Myosotis* Dill.

182. *Lithospermum* Tourn.

183. *Anchusa* Linn., *Buglossum* Tournef.

184. *Cynoglossum* Tour., *Omphalodes* Tourn.

185. *Pulmonaria* Tour., *Cerinthoides* Boerb.

186. *Symphytum* Tournef.

187. *Cerithe* Tournef.

188. *Onosma* Linn.

189. *Borago* Tourn., *Bo-*

Boraginoides Boerb.,
 Cynoglossoides Is-
 nard. *Art. Par.* 1718.
 190. Asperugo Tourn.
 191. Lycopsis Linn.;
 Echioides Dill.
 192. Echium Tournef.
 193. Tournefortia Linn.;
 Pittonia Plum.
 194. Nolana Linn.
 195. Diapensia Linn.
 196. Aretia Hall.
 197. Androsace Tourn.
 198. Primula Linn.;
 Primula veris Tourn.;
 Auricula urfi Tourn.
 199. Cortusa Boerb.
 200. Soldanella Tourn.
 201. Dodecatheon Linn.
 202. Cyclamen Tourn.
 203. Menyanthes Tourn.
 Nymphoides Tourn.
 204. Hottonia Boerb.;
 Stratiotes Vaill.
 205. Hydrophyllum
 Tourn.
 206. Lythymachia Tourn.
 207. Anagallis Tourn.
 208. Theophrasta Linn.;
 Eresia Plum.
 209. Patagonula Linn.;
 Patagonica Dill.
 210. Spigelia Linn.;

Arapabaca Plum.
 211. Ophiorrhiza Linn.;
 Mitreola Linn. *Edit.*
prior.; Mitra Houst.
 212. Randia Houst.
 213. Azalea Linn.
 214. Plumbago Tourn.
 215. Phlox Linn.; Ly-
 chnidea Dill.
 216. Convolvulus
 Tourn.
 217. Ipomoea Linn.;
 Quamoclit Tourn.;
 Volubilis Dill.
 218. Polemonium Tourn.
 219. Campanula Tourn.
 220. Roella Linn.
 221. Phyteuma Linn.;
 Rapunculus Tourn.
 222. Trachelium Tourn.
 223. Samolus Tourn.
 224. Nauclea Linn.
 225. Rondeletia Plum.
 226. Macrocnemum
 Brown.
 227. Bellonia Plum.
 228. Pontlandia Brown.;
 Jacq.
 229. Cinchona Linn.;
 Quinquina Condam.
Art. Paris. 1738.
 230. Psychotria Linn.;
 Psychotrophum Bro.

231. *Coffea* Linn., *Coffe* Juss. *Aët. Par.* 1713.
 232. *Chiococca* Brown., *Jacq.*
 233. *Hamellia* Jacq.
 234. *Lonicera* Linn., *Caprifolium* Tourn., *Periclymenum* T., *Camæcerasus* T., *Xylosteum* T. *Symphoricarpos* Dill.
 235. *Triosteum* Linn., *Triosteospermum* Dill.
 236. *Morinda* Vaill., *Rojoc* Plum., *Phillyrealstrum* Vaill.
 237. *Conocarpus* Jacq., *Rudbeckia* Houst. *Am. Ac.*
 238. *Kuhnia* Linn.
 239. *Erithalis* Brown.
 240. *Menaïs* Loefl.
 241. *Genipa* Tourn.
 242. *Mussaenda* Burm.
 243. *Mirabilis* Linn., *Jalapa* Tourn.
 244. *Coris* Tourn.
 245. *Ellisia* Linn.
 246. *Verbascum* Tourn., *Blattaria* Tourn.
 247. *Datura* Linn., *Stramonium* Tourn.
 248. *Hyoscyamus* Tourn.
 249. *Nicotiana* Tourn.
 250. *Atropa* Linn., *Bel-ladona* Tourn., *Mandragora* T.
 251. *Physalis* Linn., *Alkekengi* Tourn.
 252. *Solanum* Tourn., *Melongena* T., *Lycopersicon* T.
 253. *Capficum* Tourn.
 254. *Strychnos* Linn.
 255. *Jacquinia* Jacq.
 256. *Chironia* Linn.
 257. *Cordia* Plum., *Sebestena* Dill.
 258. *Ehretia* Brown.
 259. *Varronia* Brown.
 260. *Laugeria* Jacq.
 261. *Bruntellia* Plum.
 262. *Cestrum* Linn.
 263. *Lycium* Linn., *Jas-minoides* Niss. *Aët. Par.* 1711.
 264. *Chrysophyllum* Linn., *Cainito* Plum.
 265. *Sideroxylum* Dill.
 266. *Rhamnus* Tourn., *Frangula* T., *Cervi-spina* Dill., *Paliurus* T., *Alaternus* T., *Ziziphus* T.
 267. *Phylica* Linn.

268. *Ceanothus* Linn.
 269. *Byttneria* Loeft.
 270. *Myrsine* Linn.
 271. *Celastrus* Linn.,
Evonymoides Isnard.
A. Par. 1716.
 272. *Evonymus* Tourn.
 273. *Diosma* Linn.
 274. *Hartogia* Linn.
 275. *Brunia* Linn.
 276. *Itea* Linn., *Dico-*
nangia Mitch.
 277. *Galax* Linn., *Vi-*
ticella Mitch.
 278. *Cedrela* Linn.,
Cedro Loeft.
 279. *Mangifera* Linn.
 280. *Cupania* Plum.
 281. *Histella* Jacq.
 282. *Ribes* Linn., *Ri-*
besium Dill., *Grossu-*
laria Tourn.
 283. *Gronovia* Mart.
 284. *Hedera* Tourn.
 285. *Vitis* Tourn.
 286. *Lagoecia* Linn.,
Cuminoides Tourn.
 287. *Sauvagesia* Jacq.
 288. *Claytonia* Gronov.
 289. *Achyranthes* Linn.,
Achyracantha Dill.
 290. *Celosia* Linn.,
Stachyarpagophora

Vaill.

291. *Illecebrum* Rupp.,
Corrigiola Dill., *Pa-*
ronychia Tourn.
 292. *Glaux* Tourn.
 293. *Thesium* Linn.
 294. *Rauvolfia* Plum.
 295. *Cerbera* Linn., *A-*
hovaj Tourn.
 296. *Vinca* Linn., *Per-*
vinca Tourn.
 297. *Gardenia* Ellis,
As. Ang.
 298. *Nerium* Tourn.
 299. *Plumeria* Tourn.
 300. *Echites* Jacq.
 301. *Cameraria* Plum.
 302. *Tabernæmontana*
Plum.
 303. *Ceropegia* Linn.
 304. *Roridula* Burm.

II. DICYNIA.

305. *Periploca* Tourn.
 306. *Cynanchum* Linn.
 307. *Apocynum* Tourn.
 308. *Asclepias* Tourn.,
Apocynum Tourn.
 309. *Stapelia* Linn.
 310. *Herniaria* Tourn.
 311. *Chenopodium*
Tourn.

- | | |
|---|---|
| 312. Beta Tourn. | 335. Daucus Tourn. |
| 313. Salsola Linn., Kali Tourn. | 336. Ammi Tourn. |
| 314. Anabasis Linn. | 337. Bunium Linn., Bulbocastanum Tourn. |
| 315. Cressa Linn., Anthyllis Magn. | 338. Conium Linn., Cicuta Tourn. |
| 316. Gomphrena Linn., Amaranthoides Tourn., Caraxeron Vail. | 339. Selinum Linn., Thysselinum Tourn. |
| 317. Bofea Linn. | 340. Athamanta Linn., Meum Tourn., Oreoselinum Tourn. |
| 318. Ulmus Tourn. | 341. Peucedanum Tourn. |
| 319. Nama Linn. | 342. Crithmum Tourn. |
| 320. Hydrolea Loefl. | 343. Hasselquistia Linn. |
| 321. Schrebera Linn. | 344. Cachrys Tourn. |
| 322. Heuchera Linn. | 345. Ferula Tourn. |
| 323. Swertia Linn. | 346. Laserpitium Tourn. |
| 324. Gentiana Tourn., Centaurium minus Tourn. | 347. Heracleum Linn., Sphondylium Tourn. |
| 325. Phyllis Linn., Bupleuroides Boerb. | 348. Ligusticum Tourn., Cicutaria Tourn. |
| 326. Eryngium Tourn. | 349. Angelica Linn. |
| 327. Hydrocotyle Tourn. | 350. Sium Tourn., Sisarum Tourn. |
| 328. Sanicula Tourn. | 351. Sison Linn. |
| 329. Astrantia Tourn. | 352. Bubon Linn. |
| 330. Bupleurum Tourn. | 353. Cuminum Tourn. |
| 331. Echinophora Tourn. | 354. Oenanthe Tourn. |
| 332. Tordylium Tourn. | 355. Phellandrium Tourn. |
| 333. Caulalis Tourn. | 356. Cicuta Linn. |
| 334. Artemisia Linn. | 357. Aethusa Linn. |
| | 358. |

358. Coriandrum
Tourn.
359. Scandix Tourn.
360. Chærophylum
Linn., Chærophylli
spec. Tourn.
361. Imperatoria Linn.
362. Sefeli Boerb.
363. Thapsia Tourn.
364. Pastinaca Tourn.
365. Smyrnum Tourn.
366. Anethum Tourn.,
Foeniculum Tourn.
367. Carum Linn.,
Carvi Tourn.
368. Pimpinella Linn.,
Tragoselinum Tourn.
369. Apium Tourn.
370. Aegopodium Linn.

III. TRIGYNIA.

371. Rhus Tourn., To-
xicodendron Tourn.,
Cotinus T.
372. Viburnum Tourn.,
Tinus T., Opulus T.
373. Cassine Linn.,
Maurocenia Linn.
Edit. prior.
374. Sambucus Tourn.
375. Spathelia Linn.,
Spathe Brown.

376. Staphylea Linn.,
Staphylodendron
Tourn.
377. Tamarix Linn.,
Tamariscus Tourn.
378. Turnera Plum.
379. Telephium Tourn.
380. Corrigiola Linn.,
Polygonifolia Dill.
381. Pharnaceum Linn.
382. Alsine Linn.
383. Drypis Mich.
384. Basella Linn.
385. Sarothra Linn.

IV. TETRAGYNIA.

386. Parnassia Tourn.
387. Evolvulus Linn.

V. PENTAGYNIA.

388. Aralia Tourn.
389. Barreria Linn.
390. Statice Tourn.,
Limonium Tourn.
391. Linum Tourn.,
Radiola Dill., Cha-
mælinum Vaill., Li-
nocarpon Mich.
392. Aldrovanda Mont.
Astr. Bon.
393. Drosera Linn.,
I 2 Ros

- Ros folis Tourn.
 394. Crassula Dill.
 395. Sibbaldia Linn.

- VI. POLYGYNIA.
 396. Myosurus Linn.,
 Myosuros Dill.

CLASSIS VI. EXANDRIA. Fig. 6.

I. MONOGYNIA.

397. **B** Romelia Plum.,
 Pinguin Dill.,
 Ananas Tourn., Ka-
 ratas Plum.
 398. Tillandsia Linn.,
 Caraguata Plum., Re-
 nealmia Plum.
 399. Burmannia Linn.
 400. Tradescantia Linn.,
 Ephemeron Tourn.
 401. Pontederia Linn.,
 Michelia Houst.
 402. Hæmanthus Tourn.,
 Dracunculoides
 Boerb.
 403. Galanthus Linn.
 404. Leucojum Linn.,
 Narcisso - Leucojum
 Tourn.
 405. Narcissus Tourn.
 406. Pancratium Dill.
 407. Crinum Linn.
 408. Amaryllis Linn.,
 Lilio - Narcissus
 Tourn.

409. Bulbocodium Linn.
 410. Aphyllanthes
 Tourn.
 411. Allium Tourn.,
 Cepa T., Porrum T.
 Scorodoprasum Mich.
 412. Lilium Tourn.,
 Lirium Roy.
 413. Fritilaria Tourn.,
 Petilium Linn. Edis.
 prior., Corona impe-
 rialis Tourn.
 414. Uvularia Linn.
 415. Gloriosa Linn.,
 Methonica Tourn.
 416. Erythronium Linn.,
 Dens canis Tourn.
 417. Tulipa Tourn.
 418. Albuca Linn.
 419. Hypoxis Linn.
 420. Ornithogalum
 Tourn., Stellaris Dill.
 421. Scilla Linn., Li-
 lio-Hyacinthus Tour.,
 Hyacinthus stellaris
 Raj.
 422. Cyanella Royen.
 423.

423. Asphodelus Tourn.
 424. Anthericum Linn.,
 Phalangium Tourn.,
 Bulbine Linn. Edit.
 prior.
 425. Leontice Linn.,
 Leontopetalon Tourn.
 426. Asparagus Tourn.
 427. Convallaria Linn.,
 Lilium convallium
 Tourn., Polygonat-
 um T., Unifolium
 Dill.
 428. Polianthes Linn.
 429. Hyacinthus Tourn.,
 Muscari T.
 430. Alettris Linn.
 431. Yucca Dill., Cor-
 dyline Roy.
 432. Aloe Tourn.
 433. Agave Linn.
 434. Alstroemeria Linn.
 435. Hemerocallis
 Linn., Lilio-Aspho-
 delus Tourn.
 436. Acorus Linn., Ca-
 lamus aromaticus Pe-
 tit.
 437. Orontium Linn.,
 Aronia Mich.
 438. Calamus Linn.
 439. Juncus Tourn.
 440. Achras Loefst.,

Sapota Plum.

441. Richardia Houst.
 A. A.
 442. Bursera Jacq.
 443. Prinos Linn.
 444. Berberis Tourn.
 445. Loranthus Vaill.
 446. Hillia Jacq.
 447. Frankenia Linn.,
 Fraca Mich.
 448. Peplis Linn., Por-
 tula Dill., Glaucoides
 Mich.

II. DIGYNIA.

449. Valezia Linn.
 450. Oryza Tourn.
 451. Atraphaxis Linn.

III. TRIGYNIA.

452. Flagellaria Linn.
 453. Rumex Linn., La-
 pathum & Acetosa
 Tourn.
 454. Scheuchzeria
 Linn.
 455. Triglochin Linn.,
 Juncago Tourn.
 456. Melanthium Clayt.
 457. Medeola Linn.
 458. Trillium Linn.
 459. Colchicum Tourn.
 460. Helopias Linn.

IV. TETRAGYNIA,

461. *Petiveria Plum.*

V. POLYGYNIA,

462. *Alisma Linn.*,
Damasonium Tourn.

CLASSIS VII. HEPTANDRIA . Fig. 7.

I. MONOGYNIA,

463. **T** *rientalis Linn.*
464. *Aesculus Linn.*,
Hippocastanum
Tourn., *Pavia Boerb.*

II. DIGYNIA.

465. *Limeum Linn.*

III. TRIGYNIA.

466. *Saururus Linn.*

IV. HEPTAGYNIA.

467. *Septas Linn.*

CLASSIS VIII. OCTANDRIA . Fig. 8.

I. MONOGYNIA.

468. **T** *Ropæolum*
Linn., *Carda-*
mindum Tourn.
469. *Osbeckia Linn.*
470. *Rhexia Gronov.*
471. *Oenothera Linn.*,
Onagra Tourn.
472. *Gaura Linn.*
473. *Epilobium Linn.*,
Chamænexion Tourn.
474. *Melicocca Brown.*
Jacq.
475. *Amyris Brown.*
Jacq.
476. *Grislea Linn.*477. *Combretum Loeft.*
478. *Allophylus Linn.*
479. *Ximenia Plum. Jacq.*
480. *Mimusops Linn.*
481. *Jambolifera Linn.*
482. *Sandalum Linn.*
483. *Memecylon Linn.*
484. *Lawsonia Linn.*,
Henna Ludw.
485. *Vaccinium Linn.*,
Vitis idæa Tourn.,
Oxycoccus T.
486. *Erica Tourn.*
487. *Daphne Linn.*,
Thymelæa Tourn.
488. *Dirca Linn.*
489. *Gnidia Linn.*, *Stru-*
thia

thia Roy.

490. *Stellera* Gmelin ,
Chamæjasme Amm.

491. *Passerina* Linn.

492. *Lachnæa* Roy.

493. *Bæckeia* Linn.

II. DIGYNIA.

494. *Galenia* Linn. ,
Sherardia Pont.

495. *Weinmannia* Linn. ,
Windmannia Brown.

496. *Moehringia* Linn.

III. TRIGYNIA.

497. *Polygonum* Tourn. ,
Bistorta T. , *Perfi-*
caria T. , *Fagopy-*

rum T.

498. *Coccoloba* Brown.

499. *Paullinia* Jacq. ,
Seriana Plum. , *Curu-*
ru Plum.

500. *Cardiospermum*
 Linn. , *Corindum*
 Tourn. , *Vesicaria*
 Rivin.

501. *Sapindus* Tourn.

IV. TETRAGYNIA.

502. *Paris* Linn. , *Her-*
ba paris Tourn.

503. *Adoxa* Linn. , *Mo-*
schatellina Tourn.

504. *Elatine* Linn. , *Po-*
tamopithys Buxb. ,
Alfinastrum Vaill.

CLASSIS IX. ENNEANDRIA. Fig. 9.

I. MONOGYNIA.

505. **L** *Aurus* Tourn. ,
Cinnamomum
Herm. , *Camphora*
Gronov. *Persea* Plum. ,
Borbonia Plum. , *Ben-*
zoe Boerb. , *Sassafras*
Off.

506. *Tinus* Linn. , *Vol-*
kameria Brown.

507. *Cassya* Osbeck.
 Jacq.

II. TRIGYNIA.

508. *Rheum* Linn. , *Rha-*
barbarum Tourn.

III. HEXAGYNIA.

509. *Butomus* Tourn.

CLASSIS X. DECANDRIA. Fig. 10.

I. MONOGYNIA.

- | | |
|---|--|
| 510. S ophora Linn. | 528. Adenanthera Roy. |
| 511. A nagyris Tournef. | 529. Melia Linn., A ^z
zedarach Tournef. |
| 512. Cercis Linn., Sili-
quastrum Tournef. | 530. Trichilia Brown. |
| 513. Bauhinia Plum. | 531. Quassia Linn. |
| 514. Hymenæa Linn.,
Courbaril Plum. | 532. Zygophyllum Linn.,
Fabago Tournef. |
| 515. Parkinsonia Plum.
Jacq. | 533. Eagonia Tournef. |
| 516. Cassia Tournef., Sen-
na Tournef. | 534. Tribulus Tournef. |
| 517. Poinciana Tournef. | 535. Thryallis Linn. |
| 518. Cæsalpina Plum. | 536. Limonia Linn. |
| 519. Guilandina Linn.,
Bonduc Plum. | 537. Heisteria Jacq. |
| 520. Guajacum Plum. | 538. Monotropa Linn.,
Orobanchoides
Tournef., Hypopitys
Dill. |
| 521. Cynometra Linn.,
Cynomorium Garc. | 539. Trianthema Sauv.,
Portulacastrum Juss. |
| 522. Anacardium Linn.,
Acajou Tournef. | 540. Jussiaea Linn. |
| 523. Swietenia Jacq. | 541. Quisqualis Linn. |
| 524. Dictamnus Linn.,
Fraxinella Tournef. | 542. Dais Royen. |
| 525. Ruta Tournef., Pscu-
dorhiza Mich. | 543. Bucida Linn., Bu-
ceras Brown. |
| 526. Toluifera Roy. | 544. Copaifera Linn.,
Copaiva Jacq. |
| 527. Hæmatoxylum
Linn. | 545. Samyda Loeft., Ca-
searia Jacq. |
| | 546. Melastoma Burm.,
Acinodendron Linn.,
Edit. prior. |

547. *Kalmia* Linn.
 548. *Ledum* Linn.
 549. *Rhodora* Dubamel.
 550. *Rhododendrum*
 Linn., *Chamærhodo-*
dendros Tournef.
 551. *Andromeda* Linn.,
Ledum Mich., *Cha-*
mædaphne Buxb., *E-*
ricæ species Tournef.
 552. *Epigæa* Linn., *Me-*
mecylum Mitch.
 553. *Gaultheria* Kalm.
 554. *Arbutus* Tournef.,
Uva ursi Tournef.
 555. *Clethra* Gronov.
 556. *Pyrola* Tournef.

II. DIGYNIA.

557. *Royena* Linn.
 558. *Cunonia* Linn.,
Oosterdykia Burm.
 559. *Hydrangea* Gronov.
 560. *Chrysosplenium*
 Tournef.
 561. *Saxifraga* Tournef.,
Geum Tournef.
 562. *Tiarella* Linn.
 563. *Mitella* Tournef.
 564. *Scleranthus* Linn.,
Knawel Dill.
 565. *Gypsophila* Linn.

566. *Saponaria* Linn.
 567. *Dianthus* Linn.,
Caryophyllus Tournef.,
Tunica Dill.

III. TRIGYNIA.

568. *Cucubalus* Tournef.
 569. *Silene* Linn., *Vi-*
scago Dill.
 570. *Stellaria* Linn.,
Alfane Tournef.
 571. *Arenaria* Linn.
 572. *Cherleria* Hall.
 573. *Cardella* Tournef.
 574. *Malpighia* Plum.
 575. *Banisteria* Houst.
 576. *Triopteris* Linn.,
Hiræa Jacq.
 577. *Erythroxylon*
 Brown. Jacq.

IV. PENTAGYNIA.

578. *Averrhoa* Linn.
 579. *Spondias* Jacq.,
Monbin Plum.
 580. *Cotyledon* Dill.
 Tournef.
 581. *Sedum* Tournef., *A-*
racampferos Tournef.
 582. *Penthorum* Gronov.

583. *Suriana Plum.*584. *Oxalis Linn.* ,*Oxys Tourn.* , *Oxyoides Garc.*585. *Agrostema Linn.*586. *Lychnis Tourn.*587. *Cerastium Linn.* ,*Myosotis Tourn.*588. *Spergula Dill.*589. *Griecum Linn.*

V. DECAGYNIA.

590. *Neurada B. Juss.*591. *Phytolacca Tourn.*

CLASSIS XI. DODECANDRIA. Fig. II.

I. MONOGYNIA.

592. **A***Sarum Tourn.*593. *Gethyllis Linn.*594. *Bocconia Plum.*595. *Rhizophora Linn.* ,*Mangles Plum.*596. *Blakea Brown.*597. *Garcinia Linn.* ,*Mangostans Garc.*598. *Styrax Tourn.*599. *Halesia Ellis.*600. *Decumaria Fabr.**Willich.*601. *Winterania Linn.* ,*Canella Brown.*602. *Crateva Linn.* ,*Tapia Plum.*603. *Triumfetta Plum.*604. *Peganum Linn.* ,*Harmala Tourn.*605. *Nitraria Aët. Petrop.*606. *Portulaca Tourn.* ,*Anacampseros T. Tele-**lephiastrum Dill.*607. *Lythrum Linn.* ,*Salicaria Tourn.*608. *Ginora Jacq.*

II. DIGYNIA.

609. *Heliocarpus Linn.* ,*Montia Houst.*610. *Agrimonia Tourn.* ,*Agrimonoïdes T.*

III. TRIGYNIA.

611. *Reseda Tourn.* ,*Luteola Tourn.* , *Se-**samoides T.*612. *Euphorbia Linn.* ,*Euphorbium Tourn.* ,*Tithymalus T. Tithy-**maloides T.*

IV.

IV. PENTAGYNIA.

613. *Glinus* Loefl.
614. *Illicium* Kæmpf.

V. POLYGYNIA.

615. *Sempervivum*
Linn., *Sedi species*
Tourn.

CLASSIS XII. ICOSANDRIA. Fig. 12.

I. MONOGYNIA.

616. **C**actus Linn.,
Melocactus
Tourn., *Cereus* Juss.,
Opuntia Tourn., *Tu-*
na Dill., *Pereskia*
Plum.

617. *Philadelphus*
Linn., *Syringa* Tourn.

618. *Psidium* Linn.,
Guajava Tournef.

619. *Eugenia* Mich.

620. *Myrtus* Tournef.

621. *Punica* Tournef.

622. *Amygdalus* Tourn.,
Persea Tournef.

623. *Prunus* Tournef.,
Armeniaca T., *Cera-*
sus T., *Laurocerasus*
T., *Padus* Linn. Edit.
prior.

624. *Chrysobalanus*
Linn., *Icaco* Plum.
Jacq.

II. DIGYNIA.

625. *Cratægus* Tourn.

III. TRIGYNIA.

626. *Sorbus* Tourn.

527. *Sesuvium* Linn.,
Halimum Loefl.

IV. PENTAGYNIA.

628. *Mespilus* Tourn.

629. *Pyrus* Tourn., *Ma-*
lus T., *Cydonia* T.

630. *Tetragonia* Linn.

631. *Mesembryanthe-*
mum Dill., *Ficoidea*
Tourn.

632. *Aizoon* Linn., *Fi-*
coidea Niss. Dill.

633. *Spiræa* Tourn., *Fi-*
lipendula Tourn.,
Ulmaria T., *Barba-*
capræ T., *Aruncus*
Linn.

Linn. Edit. prior.

V. POLYGYNIA.

634. Rosa Tournef.
 635. Rubus Tourn.
 636. Fragaria Tourn.
 637. Potentilla Linn.,
 Quinquefolium
 Tourn., Pentaphyl-

loides Tourn.

638. Tormentilla Tourn.
 639. Geum Linn., Ca-
 ryophyllata Tourn.
 640. Dryas Linn.
 641. Comarum Linn.
 642. Calycanthus Linn.,
 Beureria Ehret., But-
 neria Du hamel, Ba-
 steria Miller.

CLASSIS XIII. POLYANDRIA. Fig. 13.

I. MONOGYNIA.

643. **M**arcgravia
 Plum.
 644. Rheedia Linn.,
 Varrheedia Plum.
 645. Morisonia Plum.
 646. Capparis Tourn.,
 Breynia Plum.
 647. Actæa Linn., Chri-
 stophoriana Tourn.
 648. Sanguinaria Dill.
 649. Podophyllum Linn.,
 Anapodophyllum
 Tourn.
 650. Chelidonium
 Tourn., Glaucium
 Tourn.
 651. Papaver Tourn.
 652. Argemone Tourn.
 653. Cambogia Linn.

654. Muntingia Plum.
 655. Sarracenia Tourn.
 656. Nymphaea Tourn.,
 Nelumbo Tourn.
 657. Bixa Linn.
 658. Sloanea Linn.,
 Sloana Plum.
 659. Mammea Linn.,
 Mammei Plum.
 660. Ochna Linn., Ja-
 botapita Plum.
 661. Calophyllum Jacq.
 Calaba Plum.
 662. Grias Linn.
 663. Tilia Tourn.
 664. Lætia Loeß.
 665. Microcos Burm.
 666. Elæocarpus Burm.
 667. Lecythis Loeß.,
 Jacq.
 668.

668. *Mesua* Linn.

669. *Vateria* Linn.

670. *Lagerstroemia*
Linn.

671. *Thea* Kämpf.

672. *Caryophyllus* Linn.

Caryophyllus aroma-
ticus Tourn. *Caryo-*
phyllodendron Vaill.

673. *Mentzelia* Plum.
Jacq.

674. *Plinia* Plum.

675. *Delima* Linn.

676. *Cistus* Tourn. ,
Helianthemum T.

677. *Prockia* Brown.

678. *Corchorus* Tourn.

679. *Seguiera* Loefl.

680. *Symplocos* Jacq.

II. DIGYNIA.

681. *Pæonia* Tourn.

682. *Curatella* Loefl.

683. *Calligonum* Linn.,
Polygonoides Tourn.

III. TRIGYNIA.

684. *Delphinium* Tourn.

685. *Aconitum* Tourn.

IV. TETRAGYNIA.

686. *Tetracera* Linn.

V. PANTAGYNIA.

687. *Aquilegia* Tourn.

688. *Nigella* Tourn.

689. *Reaumuria* Haf-
selq.

VI. HEXAGYNIA.

690. *Stratiotes* Linn.,
Aloides Boerb.

VII. POLYGYNIA.

691. *Dillenia* Linn.

692. *Liriodendron* Linn.
Tulipifera Catesb.

693. *Magnolia* Plum.

694. *Michelia* Linn.

695. *Uvaria* Linn.

696. *Annona* Linn. ,
Guanabanus Plum.

697. *Anemone* Tourn. ,
Anemonoides Dill. ,
Anemone Ranuncu-
lus Dill. , *Hepati-*
ca Dill. , *Pulsatilla*
Tourn.

698. *Atragene* Linn.

699. *Clematis* Dill. ,
Clematitis Tourn. ,
Viticella Dill.

700. *Thalictrum* Tourn.,
701.

- | | |
|--|---|
| 701. Adonis Dill. | 704. Isopyrum Linn. |
| 702. Ranunculus Tourn.
Ficaria Dill., Ra-
nunculoides Vaill. | 705. Helleborus Tourn. |
| 703. Trollius Linn. | 706. Caltha Linn., Po-
pulago Tourn. |
| | 707. Hydrastis Ellis. |

CLASSIS XIV. DIDYNAMIA. Fig. 14.

I. GYMNOSPERMIA.

- | | |
|---|---|
| 708. A Juga Linn. Bu-
gula Tourn. | 722. Stachys Tourn. &
Galeopsis Tourn. |
| 709. Teucrium Tourn.,
Polium T., Chamæ-
drys T., Chamæpi-
tys T. | 723. Balota Linn., Bal-
lote Tourn. |
| 710. Satureja Tourn. | 724. Marrubium Tourn.,
Pseudodictamnus T. |
| 711. Thymbra Linn. | 725. Leonurus Linn.,
Cardiaca Tourn. |
| 712. Hyssopus Tourn. | 726. Phlomis Tourn. |
| 713. Nepeta Linn.,
Catania Tourn. | 727. Molluccella Linn.,
Mollucca Tourn. |
| 714. Lavandula Tourn.
Stoechas Tourn. | 728. Clinopodium
Tourn. |
| 715. Sideritis Tourn. | 729. Origanum Tourn. |
| 716. Mentha Tourn. | 730. Thymus Tourn.,
Acinos Dill. |
| 717. Glecoma Linn. | 731. Melissa Tourn.,
Calamintha Tourn. |
| 718. Orvala Linn.,
Papia Mich. | 732. Dracocephalum
Tourn., Moldavica
Tourn. |
| 719. Lamium Tourn. | 733. Horminum Linn. |
| 720. Galeopsis Linn.,
Tetrahit Dill., Gale-
abdolon Dill. | 734. Melittis Linn. |
| 721. Betonica Tourn. | 735. Ocimum Tourn. |
| | 736. Trichostema Grono. |

737. *Scutellaria* Linn.,
Cassida Tourn.
 738. *Prunella* Tourn.
 739. *Cleonia* Linn.
 740. *Prasium* Linn.
 741. *Phryma* Linn.,
Leptostachia Mitch.
 742. *Perilla* Linn.

II. ANGIOSPERMIA.

743. *Bartsia* Linn.
 744. *Rhinanthus* Linn.,
Pedicularis species
 Tourn., *Elephas* T.
 745. *Euphrasia* Tourn.,
Odontites Dill.
 746. *Melampyrum*
 Tourn.
 747. *Lathræa* Linn.,
Clandestina Tourn.
 748. *Schwalbea*
 Gronov.
 749. *Tozzia* Mich.
 750. *Pedicularis* Tourn.
 751. *Gerardia* Plum.
 752. *Chelone* Dill., *Ano-*
nymos Gronov.
 753. *Gesneria* Linn.,
Gesnera Plum.
 754. *Antirrhinum*
 Tourn., *Linaria* T.,
Afarina T., *Elatine*
 Dill.
755. *Cymbaria* Amm.
 756. *Craniolaria* Linn.
 757. *Martynia* Mart.
 758. *Torenia* Linn.
 759. *Besleria* Plum. Jacq.
 760. *Scrophularia*
 Tourn.
 761. *Celsia* Linn.
 762. *Digitalis* Tourn.
 763. *Bignonia* Tourn.
 764. *Citharexylon* B.
 Juss.
 765. *Halleria* Linn.
 766. *Crescentia* Linn.,
Cujete Plum.
 767. *Gmelina* Linn.,
Michelia Amm.
 768. *Petrea* Houst. Jacq.
 769. *Lantana* Linn.,
Camara Plum., *My-*
robatindum Vaill.
 770. *Cornutia* Plum.,
Agnanthus Vaill.
 771. *Loeselia* Linn.,
Royenia Houst.
 772. *Capraria* Linn.
 773. *Selago* Linn.
 774. *Hebenstretia* Linn.
 775. *Erinus* Linn., *A-*
geratum Tourn.
 776. *Buchnera* Hort.
 Cliff.
 777. *Browallia* Hort.
 Cliff.

Cliff.

778. *Linnæa Gronov.*779. *Sibthorpia Linn.*780. *Limosella Linn.,*
*Plantaginella Dill.*781. *Stemodia Linn.,*
*Stemodiaca Brown.*782. *Obolaria Linn.*783. *Orobanche Tourn.*
*Aphyllon Mich.*784. *Dodartia Tourn.*785. *Lippia Houst.*786. *Sesamum Linn.*787. *Mimulus Linn.,*
Cynorrhynchium
*Mitch.*788. *Ruellia Plum.*789. *Barleria Plum.*790. *Duranta Linn.,*
Castorea Plum., El-
*lisa Brown.*791. *Ovieda Linn.,*
*Valdia Plum.*792. *Volkameria Linn.,*
*Duglassia Houst.*793. *Clerodendron*
*Burm.*794. *Vitex Tourn.*795. *Bontia Plum. Avi-*
*cennia Jacq.*796. *Columnnea Plum.*
*Achimenes Brown.*797. *Acanthus Tourn.*798. *Pedaliium Royez.*799. *Melanchus Tourn.*

CLASSIS XV. TETRADYNAMIA. Fig. 15.

I. SILICULOSA.

800. **M**Yagrum
*Tourn.*801. *Vella Linn.*802. *Anastatica Linn.*803. *Subularia Linn.*804. *Draba Dill.*805. *Lepidium Tourn.,*
*Nasturtium T.*806. *Thlaspi Tourn.,*
*Bursa pastoris T.*807. *Cochlearia Tourn.*808. *Iberis Dill.*809. *Alyssum Tourn.,*
Alyssoides T., Ve-
*ficaria T.*810. *Peltaria Jacq.*811. *Clypeola Linn.;*
*Jonthlaspi Tourn.*812. *Biscutella Linn.,*
*Thlaspidium Tourn.*813. *Lunaria Tourn.*

II. SI-

M. SILIQUOSA.

814. Ricotia Linn.
 815. Dentaria Tourn.
 816. Cardamine Tourn.
 817. Sisymbrium Tourn.,
 Radicula Dill.
 818. Erysimum Tourn.
 819. Cheiranthus Linn.,
 Leucojum Tourn.
 820. Heliophila Burm.
 821. Hesperis Tourn.
 822. Arabis Linn.
 823. Turritis Tourn.

824. Brassica Tourn.,
 Rapa Tourn.
 825. Sinapis Linn.,
 Sinapi Tourn.
 826. Raphanus Tourn.,
 Raphanistrum Tourn.
 827. Bunias Linn., Eru-
 cago Tourn.
 828. Isatis Tourn.
 829. Crambe Tourn.,
 Rapistrum T.
 830. Cleome Linn.,
 Sinapistrum Tourn.

CLASSIS XVI. MONADELPHIA. Fig. 16.

I. PENTANDRIA.

Harmefias Leoff.

831. **W** Alteria Linn.,
 Monosper-
 malthæa Isnard.
 832. Hermannia Tourn.
 833. Melochia Dill.

II. DECANDIA.

834. Connarus Linn.
 835. Hugonia Linn.
 836. Geranium Tourn.

III. ENDECANDRIA.

837. Brownæa Jacq.,

IV. DODECANDRIA.

838. Pentapetes Linn.,
 Pterospermadendron
 Amm.

V. POLYANDRIA.

839. Bombax Linn.,
 Xylon Linn. Edit.
 prior., Ceiba Plum.
 840. Adansonia Adans.
 841. Sida Linn., Mal-
 vinda Dill., Abutilon
 Dill.

K

842.

842. *Napæa* Clayt.
 843. *Althæa* Linn.
 844. *Alcea* Linn., *Malva* Tourn.
 845. *Malva* Tourn., *Alcea* T., *Abutilon* Dill.
 846. *Lavatera* Tourn.
 847. *Malope* Linn., *Malacoides* Tourn.
 848. *Urena* Dill.
 849. *Gossypium* Linn., *Xylon* Tourn.
 850. *Hibiscus* Linn., *Malvaviscus* Dill., *Ketmia* Tourn.
 851. *Stewartia* Laws., *Malachodendron* Mitch.
 852. *Camellia* Linn.

CLASSIS XVII. DIADELPHIA. Fig. 17.

I. HEXANDRIA.

853. **F**umaria Tourn.,
 Capnoides T.,
 Cyticapnos Boerb.,
 Corydalis Dill., *Bicucullata* Juss.
 854. *Monniera* Loefl.

II. OCTANDRIA.

855. *Polygala* Tourn.,
 Chamæbuxus T., *Polygaloides* Dill., *Pennæa* Plum., *Heisteria* Linn. Edit. prior.
 856. *Securidaca* Jacq.

III. DECANDRIA.

857. *Nissolia* Jacq.

858. *Pterocarpus* Loefl.
 859. *Erythrina* Linn.,
 Coraliodendrum
 Tourn., *Coral* Dill.
 860. *Piscidia* Linn.,
 Piscipula Loefl., *Ichthyometra* Brown.
 861. *Borbonia* Linn.
 862. *Spartium* Linn.,
 Genista Tourn.
 863. *Genista* Linn.,
 Spartium Tourn. *Genistella* T.
 864. *Aspalathus* Linn.,
 Achyronia Royen.
 865. *Amorpha* Linn.
 866. *Crotalaria* Dill.
 867. *Ononis* Linn., *Anonon* Tourn.
 868. *Anthyllis* Linn.,
 Vul-

- Vulneraria Tourn. ,
 Erinacea T.
 869. Lupinus Tourn.
 870. Phaseolus Tourn.
 871. Dolichos Linn.
 872. Glycine Linn. ,
 Apios Boerb.
 873. Clitoria Linn. ,
 Ternatea Tourn. ,
 Clitorius Dill.
 874. Pisum Tourn. , Ochrus Tourn.
 875. Orobus Tourn.
 876. Lathyrus Tourn. ,
 Clymenum T. , Aphaca T.
 877. Vicia Tourn. , Fabba T.
 878. Ervum Tourn.
 879. Cicer Tourn. ,
 Lens T.
 880. Arachis Linn. ,
 Arachidna Plum. , Arachidnoides Niss Act.
 Par. 1723.
 881. Cytisus Tourn.
 882. Geoffræa Jacq.
 883. Robinia Linn. ,
 Pseudoacacia Tourn.
 884. Colutea Tourn.
 885. Ulex Linn. , Genista spartium Tourn.
 886. Glycyrrhiza Tour.
 887. Coronilla Tourn. ,
 Emerus T. , Securidaca T.
 888. Ornithopus Linn. ,
 Ornithopodium Tourn.
 889. Hippocrepis Linn. ,
 Ferrum equinum Tourn.
 890. Scorpiurus Linn. ,
 Scorpioides Tourn.
 891. Hedyсарum Tourn. ,
 Onobrychis T. , Alhagi T.
 892. Aeschynomene Linn.
 893. Indigofera Linn. ,
 Indigo Isnard.
 894. Galega Tourn. ,
 Indigo Isnard. Cracca Syst. nat.
 895. Phaca Linn. , Astragaloides Tourn.
 896. Astragalus Tourn. ,
 Tragacantha Tourn.
 897. Biserrula Linn. ,
 Pelecinus Tourn.
 898. Psoralia Roy. ,
 Dalea Linn. Edit. prior.
 899. Ebenus Linn.
 900. Trifolium Tourn. ,
 Trifolium Mich. ,
 K 2 Me-

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| Melilotus Tourn. , | Foenum græcum |
| Lupinaster Buxb. | Tourn. |
| 901. Lotus Tourn. | 903. Medicago Tourn. , |
| 902. Trigonella Linn. , | Medica T. |

CLASSIS XVIII. POLYADELPHIA. Fig. 18.

I. PENTANDRIA.

904. **T**Heobroma
Linn. , Gua-
zuma Plum. , Cacao
Tourn.

II. ICOSANDRIA.

905. Citrus Linn. , Au-
rantium Tourn. , Ci-

treum T. , Limon T.

III. POLYANDRIA.

906. Hypericum Tourn. ,
Androsæmum T. , A-
scyrum T.
907. Ascyrum Linn. ,
Hypericoides Plum.

CLASSIS XIX. SYNGENESIA. Fig. 19.

I. POLYGAMIA
ÆQUALIS.

908. **G**Erropogon
Linn.
909. Tragopogon Vaill.
Tragopogonoides
Vaill.
910. Scorzonera Tourn. ,
Scorzoneroides Vaill.
911. Picris Linn. , Hel-
minthotheca Vaill.
912. Sonchus Tourn. ,
Crepis Vaill.

913. Lactuca Tourn.
914. Chondrilla Tourn.
915. Prenanthes Vaill.
916. Leontodon Linn. ,
Dens leonis Tourn. ,
Taraxaconoides
Vaill.
917. Hieracium Tourn. ,
Pilosella Vaill.
918. Crepis Linn. , Hie-
racioides Vaill.
919. Andryala Linn. ,
Eriphorus Vaill.
920.

920. *Hyoseris* Linn.,
Taraxoconastrum
Vaill., *Leontodon-*
toides Mich., *Hedyp-*
nois Tourn., *Rhaga-*
dioloides *Vaill.*
921. *Seriola* Linn., *A-*
chyrophorus *Vaill.*
922. *Hypochoeris* *Vaill.*
923. *Lapsana* Linn.,
Lampsana *Vaill.*, *Rha-*
gadiolus *Vaill.* *Za-*
cintha *Vaill.*
924. *Catananche* *Vaill.*,
Catanance Tourn.
925. *Cichorium* Tourn.
926. *Scolymus* Tourn.
927. *Arctium* Linn.,
Lappa Tourn.
928. *Serratula* Dill.
929. *Carduus* *Vaill.*,
Polyacantha V., *Si-*
lybum V., *Eriocce-*
phalus V., *Cirsium*
Tourn.
930. *Cnicus* Linn., *A-*
carna *Vaill.*
931. *Onopordum* *Vaill.*,
Cardui species Tourn.
932. *Cynara* *Vaill.*,
Cinara Tourn.
933. *Carlina* Tourn.
934. *Atractylis* Linn.,

- Crocodilodes* *Vaill.*
935. *Carthamus* Tourn.,
Atractylis *Vaill.*
936. *Bidens* Tourn.,
Ceratocephalus *Vaill.*
937. *Cacalia* *Vaill.*,
Kleinia Linn. Edit.
prior., *Cacalianthe-*
mum Dill., *Porophyl-*
lum *Vaill.*
938. *Ethulia* Linn.,
Sparganophorus
Vaill.
939. *Eupatorium* Tour.
940. *Ageratum* Linn.,
Carelia Pont.
941. *Pteronia* Linn.,
Pterophorus *Vaill.*
942. *Schæhelina* Linn.
943. *Chrysocoma* Linn.,
Chrysocome Dill., *Co-*
ma aurea Boerb.
944. *Tarchonanthus*
Linn.
945. *Calea* Linn.
946. *Santolina* Tourn.
947. *Athanasia* Linn.,
Baccharis *Vaill.*

II. POLYGAMIA SUPERFLUA.

948. *Tanacetum* Tourn.,
 Bal-

- Balsamita *Vaill.*
 949. *Artemisia* *Tourn.*,
Abrotanum, *T. Ab-*
sinthium *T.*
 950. *Gnaphalium* *Linn.*,
Elichrysum *Tourn.*,
Helichrysum *Vaill.*
 951. *Xeranthemum*
Tourn., *Xeranthemo-*
moides *Dill.*
 952. *Carpesium* *Linn.*,
Conyzoides *Tourn.*
 953. *Baccharis* *Linn.*
 954. *Conyza* *Linn.*
 955. *Erigeron* *Linn.*,
Conizoides *Dill.*, *Co-*
nizella *Dill.*
 956. *Tussilago* *Tourn.*,
Petasites *T.*
 957. *Senecio* *Tourn.*,
Jacobæa *T.*
 958. *Aster* *Tourn.*
 959. *Solidago* *Vaill.*,
Virga aurea *Tourn.*,
Doria *Dill.*
 960. *Inula* *Linn.*, *Enu-*
la *Cesalp.*, *Helenium*
Vaill.
 961. *Cineraria* *Linn.*
 962. *Arnica* *Linn.*
 963. *Doronicum* *Tourn.*,
Bellidiastrum *Mich.*
 964. *Perdicium* *Linn.*,
Trixis *Brown.*
 965. *Helenium* *Linn.*,
Heleniastrum *Vaill.*
 966. *Bellis* *Tourn.*,
Bellis *Leucanthe-*
mum *Mich.*
 967. *Pectis* *Linn.*
 968. *Tagetes* *Tourn.*
 969. *Leysera* *Linn.*, *A-*
lteropterus *Vaill.*
 970. *Chrysanthemum*
Tourn., *Leucanthe-*
mum *T. Bellidioides*
Vaill.
 971. *Matricaria* *Tourn.*
 972. *Cotula* *Vaill.*, *A-*
nanthocyclus *Vaill.*,
Lancisia *Pont.*
 973. *Anacyclus* *Linn.*,
Santolinoides *Vaill.*
Cotula *Tourn.*
 974. *Anthemis* *Linn.*,
Chamæmelum *Tourn.*,
Anthemis *Mich.* *Bu-*
phthalmum *Tourn.*
 975. *Achillea* *Vaill.*,
Millefolium *Tourn.*,
Ptarmica *Tourn.*
 976. *Tridax* *Linn.*
 977. *Sigesbeckia* *Linn.*
 978. *Zinnia* *Linn.*
 979. *Verbesina* *Linn.*,
Eupatoriophalacron
Dill. 980.

980. *Tetragonotheca*
Dill.

981. *Buphtthalmum*
Linn., *Asteriscus*
Tourn., *Asteroides* T.

982. *Amellus* *Linn.*

III. POLYGAMIA FRUSTRANEA.

983. *Helianthus* *Linn.*,
Corona solis *Vaill.*

984. *Rudbeckia* *Linn.*,
Obeliscotheca *Vaill.*

985. *Coreopsis* *Linn.*,
Ceratocephaloides
Vaill.

986. *Gorteria* *Linn.*

987. *Osmites* *Linn.*,
Bellidiastrum *Vaill.*

988. *Centaurea* *Linn.*,
Centaureum majus
Tour., *Jacea* T., *Cya-*
nus T., *Calcitrapa*
Vaill., *Calcitrapoides*
V., *Rhaponticum*
Vaill., *Rhaponticoi-*
des V., *Jacea* V.,
Amberboi V., *Cya-*
nus V., *Crocodilium*
V.

IV. POLYGAMIA NECESSARIA.

989. *Milleria* *Mart.*

990. *Silphium* *Linn.*,
Asteriscus *Dill.*

991. *Polymnia* *Linn.*

992. *Chrysogonum*
Linn.

993. *Melampodium*
Linn.

994. *Calendula* *Linn.*,
Caltha *Tourn.*, *Di-*
morphotheca *Vaill.*
Cardispermum *Trant.*
A. Par. 1724.

995. *Arctotis* *Linn.*,
Arctotheca *Vaill.*, *A-*
nemonospermus *Comm.*
Hort. Amstelod.

996. *Osteospermum*
Linn., *Monilifera*
Vaill., *Chrysanth-*
moides *Tourn.*

997. *Othonna* *Linn.*,
Jacobæastrum *Vaill.*

998. *Eriocephalus* *Dill.*

999. *Filago* *Vaill.*, *Gna-*
phalium *Vaill.*

1000. *Micropus* *Linn.*,
Gnaphalodes *Tourn.*

V. POLYGAMIA
SEGREGATA.1001. Elephantopus
*Vaill.*1002. Sphæranthus
*Vaill.*1003. Echinops *Linn.*,
Echinopus *Tourn.*1004. Gundelia *Tourn.*,
Hacub *Vaill.*1005. Stoebe *Linn.*

VI. MONOGAMIA.

1006. Strumpfia *Jacq.*1007. Seriphium *Linn.*,
Helichrysoides *Vaill.*1008. Corymbium *Linn.*1009. Jasione *Linn.*1010. Lobelia *Plum.*,
Dortmanna *Rudb.*,
Laurentia *Mich.* Ra-puntium *Tourn.*1011. Viola *Tourn.*,
Calceolaria *Loefl.*1012. Impatiens *Riv.*,
Balsamina *Tourn.*

CLASSIS XX. GYNANDRIA. Fig. 20.

I. DIANDRIA.

Herm., *Vanilla Plum.*1013. **O**rchis *Tourn.*,
Limodorum
*Tourn.*1014. Satyrium *Linn.*1015. Ophrys *Tourn.*1016. Serapias *Linn.*,
Helleborine *Tourn.*1017. Limodorum *Gronov.*1018. Arethusa *Gronov.*,
Orchidion *Mitch.*1019. Cypripedium
Linn., Calceolus
Tourn.

1020. Epidendrum

II. TRIANDRIA.

1021. Sisyrinchium
Linn., Bermudiana
*Tourn.*1022. Ferraria *Burm.*

III. TETRANDRIA.

1023. Nepenthes *Linn.*,
Utricularia *Pluk.*, Ban-
dura Zeylanica *Burm.*

IV. PENTANDRIA.

1024. Ayenia *Linn.*

1025.

1025. *Passiflora* Linn.,
Granadilla Tourn.,
Murucuja T.

Isoetes Plum.

VIII. POLYANDRIA.

V. HEXANDRIA.

1026. *Aristolochia*
 Tourn.

1027. *Pistia* Linn., *Kod-*
dapail Plum. Jacq.

VI. OCTANDRIA.

1028. *Cytinus* Linn.,
Hypocistis Tourn.

VII. DECANDRIA.

1029. *Kleinhovia* Linn.

1030. *Helicteres* Linn.,

1031. *Grewia* Linn.

1032. *Xylopi*a Linn.,
Xylopricon Brown.

1033. *Arum* Tourn.,
Arisarum T., *Dra-*
cunculus T., *Coloca-*
sia Boerb.

1034. *Dracontium* Linn.

1035. *Calla* Linn., *Pro-*
venzalia Petit., *An-*
guina Trev.

1036. *Pothos* Linn.

1037. *Zostera* Linn.,
Alga Raj., *Ruppia*
Ast. Angl.

1038. *Ambrosinia* Bass.

CLASSIS XXI. MONOECIA. Fig. 21.

I. MONANDRIA.

1039. *G*ynomorium
 Mich.

1040. *Zannichellia*
 Mich., *Algoides* Vaill.
Aponogeton Pont.
Graminifolia Dill.

1041. *Ceratocarpus*
 Buxb.

1042. *Elaterium* Jacq.

II. DIANDRIA.

1043. *Anguria* Jacq.

1044. *Lemna* Linn.,
Lenticula Mich., *Hy-*
drophace Buxb.

III. TRIANDRIA.

1045. *Omphalea* Linn.,
 Om-

Omphalandra Brown.

1046. Typha Tourn.

1047. Sparganium
Tourn.

1048. Zea Linn., Mays
Tourn.

1049. Coix Linn., La-
cryma Job Tourn.

1050. Tripsacum Linn.

1051. Olyra Linn.

1052. Carex Linn., Cy-
peroides Tourn., Scir-
poides Mont., Carex
Dill.

1053. Axyris Linn.,
Ceratoïdes Tourn.

1054. Tragia Plum.

1055. Hernandia Plum.

1056. Phyllanthus Linn.

IV. TETRANDRIA.

1057. Centella Linn.

1058. Betula Tourn.,
Alnus Tourn.

1059. Buxus Tourn.

1060. Urtica Tourn.

1061. Morus Tourn.

V. PENTANDRIA.

1062. Xanthium Tourn.

1063. Ambrosia Tourn.

1064. Parthenium Linn.

Partheniastrum Niss.
Aët. Par. 1711. Hy-
sterophorus Vaill.

1065. Iva Linn., Tar-
chonanthus Vaill.

1066. Amaranthus Linn.
Amaranthi species
Tourn.

1067. Solandra Linn.

VI. HEXANDRIA.

1068. Zizania Gronov.,
Elymus Mitch.

1069. Pharus Linn.

VII. HEPTANDRIA.

1070. Guettarda Linn.,
Halesia Brown.

VIII. POLYANDRIA.

1071. Ceratophyllum
Linn., Hydrocerato-
phyllon Vaill., Di-
chotophyllum Dill.

1072. Myriophyllum
Vaill., Pentaptero-
phyllum Dill.

1073. Sagittaria Linn.,
Sagitta Dill.

1074.

1074. *Theligonum* Linn.
Cynocrambe Tourn.

1075. *Poterium* Linn.,
Pimpinella Tourn.

1076. *Quercus* Tourn.,
Ilex T., *Suber* T.

1077. *Juglans* Linn.,
Nux Tourn.

1078. *Fagus* Tourn.,
Castanea Tourn.

1079 *Carpinus* Tourn.,
Ostrya Mich.

1080. *Corylus* Tourn.

1081. *Platanus* Tourn.

1082. *Liquidambar*
Cayt.

IX. MONADELPHIA.

1083. *Pinus* Tourn.,
Abies T., *Larix* T.

1084. *Thuja* Tourn.

1085. *Cupressus* Tourn.

1086. *Plukenetia* Plum.

1087. *Dalechampia*
Plum.

1088. *Acalypha* Roy.,
Ricinocarpus Boerb.

1089. *Croton* Linn.,
Ricinoides Tourn.

1090. *Iatropha* Linn.,

Manihot Tourn., *Jul-*
sievia Houst.

1091. *Ricinus* Tourn.

1092. *Sterculia* Linn.

1093. *Hura* Linn.

1094. *Hippomane* Loefl.
Mancinella Plum.

X. SYNGENESIA.

1095 *Tricosanthes* Linn.
Anguina Mich.

1096 *Momordica* Tourn.
Luffa T., *Elaterium*
Boerb.

1097. *Cucurbita* Tourn.
Pepo T., *Melopepo*
T.

1098. *Cucumis* Tourn.
Melo T., *Colocynthis*
T., *Anguria* T.

1099. *Bryonia* Tourn.

1100. *Sicyos* Linn.,
Sicyoides Tourn.,
Bryonioides Dill.

XI. GYNANDRIA.

1101. *Andrachne* Linn.,
Thelephioides Tourn.

CLASSIS XXII. DIOECIA . Fig. 22.

I. MONANDRIA.

1102. **N**Ajas Linn.,
Fluvialis
Vaill.

II. DIANDRIA.

1103. Vallisneria Mich.,
Vallisneroides Mich.
1104. Salix Tourn.
1105. Cecropia Loefl.,
Coilotopalus Brown.

III. TRIANDRIA.

1106. Empetrum Tourn.
1107. Osyris Linn., Cas-
sia Tourn.
1108. Excoecaria
Rumph.

IV. TETRANDRIA.

1109. Trophis Brown.
1110. Batis Brown. Jacq.
1111. Viscum Tourn.
1112. Hippophae Linn.,
Rhamnoides Tourn.
1113. Myrica Linn.,
Gale Tourn.

V. PENTANDRIA.

1114. Pistacia Linn.,
Terebinthus Tourn.
1115. Zanthoxylum
Colden., Fagara
Duham.
1116. Antidesma Burm.
1117. Altronium Jacq.
1118. Spinacia Tourn.
1119. Iresine Brown.
1120. Acnida Linn.,
Acnide Mitch.
1121. Cannabis Tourn.
1122. Humulus Linn.,
Lupulus Tourn.
1123. Zanonina Linn.
1124. Fevillea Linn.,
Nhandiroba Plum.

VI. HEXANDRIA.

1125. Tamus Linn.,
Tamnus Tourn.
1126. Smilax Tourn.
1127. Rajania Linn.,
Jan Raja Plum.
1128. Dioscorea Plum.

VII. OCTANDRIA.

1129. Populus Tourn.
1130.

1130. *Rhodiola* Linn.

Tourn.

VIII. ENNEANDRIA.

1131. *Mercurialis*
Tourn.

1132. *Hydrocharis* Linn.
Stratiotes Dill., *Mor-*
sus Ranæ *Tourn.*, *Micro-*
leuconympha
Boerb.

IX. DECANDRIA.

1133. *Carica* Linn.,
Rapaya *Tourn.*

1134. *Kiggelaria* Linn.

1135. *Coriaria* Niss.
Art. Par. 1711.

1136. *Schinus* Linn.,
Molle *Tourn.*

X. DODECANDRIA.

1137. *Menispermum*

1138. *Datisca* Linn.,
Cannabina *Tourn.*

XI. POLYANDRIA.

1139. *Cliffortia* Linn.

XII. MONADELPHIA.

1140. *Juniperus* *Tourn.*,
Sabina *Boerb.*, *Ce-*
drus *Tourn.*

1141. *Taxus* *Tourn.*

1142. *Ephedra* *Tourn.*

1143. *Adelia* Linn.,
Bernardia *Brown.*

1144. *Cissampelos* Linn.,
Caapeba *Plum.*

XIII. SYNGENESIA.

1145. *Ruscus* *Tourn.*

1146. *Clusia* *Boerb.*

CLASSIS XXIII. POLYGAMIA. Fig. 23.

I. MONOECIA.

1147. **M**usa Linn.,
Bihai *Plum.*

1148. *Ophioxylon* Linn.

1149. *Celtis* *Tourn.*

1150. *Veratrum* *Tourn.*

1151. *Andropogon* *Roy.*

1152. *Holcus* Linn.,
Sorgum *Mich.*

1153. *Apluda* Linn.

1154. *Ischaemum* Linn.

1155. *Cenchrus* Linn.,
Panicastrella *Mich.*

1156.

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1156. <i>Aegilops</i> Linn. | 1168. <i>Pisonia</i> Plum., |
| 1157. <i>Valantia</i> Tourn., | <i>Pentagonotheca</i> Vaill. |
| <i>Cruciata</i> T. | 1169. <i>Nyssa</i> Gronov. |
| 1158. <i>Parietaria</i> Tourn. | 1170. <i>Anthospermum</i> |
| 1159. <i>Atriplex</i> Tourn. | Linn., <i>Tournefortia</i> |
| 1160. <i>Clusia</i> Plum., Jacq. | Pont. |
| 1161. <i>Acer</i> Tourn. | 1171. <i>Artopus</i> Linn. |
| 1162. <i>Begonia</i> Tourn. | 1172. <i>Panax</i> Linn., |
| 1163. <i>Govania</i> Jacq. | <i>Araliastrum</i> Vaill., |
| 1164. <i>Mimosa</i> Tourn., | <i>Aureliana</i> Lafit., |
| <i>Acacia</i> T., <i>Inga</i> Plum. | <i>Ninfi</i> Breyn., <i>Pana-</i> |
| | <i>cea</i> Mitch. |

II. DIOECIA.

1165. *Gleditsia* Clayt,
Melilobus Mitch.
1166. *Fraxinus* Tourn.,
Ornus Mich.
1167. *Diospyros* Linn.,
Guajacana Tourn.

III. TRIOECIA.

1173. *Ceratonia* Linn.,
Siliqua Tourn.
1174. *Ficus* Tourn.,
Caprificus Pont.

CLASSIS XXIV. CRYPTOGRAMIA.

I. FILICES.

1175. **E**quisetum
Tourn.
1176. *Onoclea* Linn.
1177. *Angiopteris*
Mitch.
1178. *Ophioglossum*
Tourn.
1179. *Acrosticum* Linn.

Ruta muraria Tourn.

1180. *Pteris* Linn.
1181. *Blechnum* Linn.
1182. *Hemionitis* Linn.
1183. *Lonchitis* Linn.
1184. *Asplenium* Linn.
Lingua cervina
Tourn., *Trichomanes*
T.
1185. *Polypodium*
Tourn.,

- Tourn., Lonchitis T.
 1186. Adiantum Tourn.
 1187. Trichomanes Linn.
 1188. Marsilea Linn.,
 Savinia Mich.
 1189. Pilularia Vaill.
 1190. Isoetes Linn.

II. MUSCI.

1191. Lycopodium
 Linn., Selagionoides
 Dill., Lycopodioides
 Dill., Selago Dill.
 1192. Porella Dill.
 1193. Sphnagnum Dill.
 1194. Buxbaumia Linn.
 1195. Phascum Linn.
 1196. Fontinalis Dill.
 1197. Splachnum Linn.
 1198. Polytrichum Dill.
 1199. Mnium Dill.
 1200. Bryum Dill.
 1201. Hypnum Dill.

III. ALGÆ.

1202. Jungermannia
 Mich., Muscoides
 Mich., Lichenastrum
 Dill.
 1203. Targionia Mich.
 1204. Marchantia

- March. Hepatica Mich.
 ch., Lunularia Mich.
 Lichen Dill.
 1205. Blasia Mich.
 1206. Riccia Mich.
 1207. Anthoceros Mich.
 1208. Lichen Tourn.,
 Mich., Lichenoides
 Dill., Coralloides Dill.
 Ufnea Dill.
 1209. Chara Vaill.,
 Hippuris Dill.
 1210. Tremella Dill.
 1211. Fucus Reaum.
 1212. Ulva Dill.
 1213. Conferva Dill.
 1214. Byssus Dill., As-
 pergillus Mich., Bo-
 trytis Mich.

IV. FUNGI.

1215. Agaricus Dill.,
 Amanita Dill.
 1216. Boletus Dill.,
 Suillus Mich., Poly-
 porus Mich.
 1217. Hydnum Linn.,
 Erinaceus Dill.
 1218. Phallus Mich.,
 Boletus Mich., Phal-
 loboletus Mich.
 1219. Clathrus Mich.

1220. *Elvela* Linn.,
Fungoidaster Mich.,
Fungoides Mich.
1221. *Peziza* Dill.,
Cyathoides Mich.
1222. *Clavaria* Vaill.,
Coralloides Tourn.,
Corallofungus Vaill.,
Fungoides Dill.
1223. *Lycoperdon*
Tourn., *Bovista* Dill.,
Lycoperdoides Mi-
ch., *Lycoperdastrum*
Mich., *Geaster* Mi-
ch., *Carpobolus* Mich.
1224. *Mucor* Mich.,
Mucilago Mich., *Ly-*
cogala Mich.

A P P E N D I X.

I. PALMÆ.

1225. *Chamærops* Linn.,
Chamæriphes Pont.
Polygamia Dioecia.
1226. *Borassus* Linn.,
Ampana Hort. Malab.,
Carimpana Hort. Ma-
lab. Dioecia Hexan-
dria.
1227. *Corypha* Linn.,
Coddapanna Hort.
Malab.
1228. *Cycas* Linn.
1229. *Cocos* Linn.,
Tenga Hort. Malab.
Monoia Hexandria.
1230. *Phoenix* Kämpf.,
Elate Linn., *Katovin-*
del Hort. Malab. Dioe-
cia Triandria.

1231. *Areca* Linn. Mo-
noecia Enneandria.

1232. *Elate* Linn.
1233. *Zamia* Trew.
1234. *Caryota* Linn.,
Schundapana Hort.
Malab. Monoecia Po-
lyandria.

II. MISCELLANEA.

1235. *Brossæa* Plum.
1236. *Bucephalon* Plum.
1237. *Matthiola* Plum.
1238. *Trevia* Linn.
Notas characteristi-
cas Generum apud
Linnæum invenies.
Genera Plantarum.
Species & characte-
rísticas Specierum
notas apud eundem.
Species Plantarum.

SECTIO II.

DE PLANTARUM VIRIBUS.

CAPUT I.

*De modo vires Plantarum
explorandi.*

69.



Urandum est Botanices studiosis, ne in mera herbarum contemplatione fistant, sed omni studio omnique contentione in earundem vires & usum inquirent, quidve commodi humano generi, quid detrimenti præstare valeant, optime pernoscant. Qui namque herbas per terrarum orbem dispersas, ait Alpinus, conquirunt, & secundum characteres quosdam in classes distribuunt neglectis interiore characterē & viribus in relatione ad corpus humanum, similes videntur homini, qui conquisitis pluribus libris, Theologicos a Juridicis
L utros-

utrosque a Medicis, omnes a Philosophicis distingueret, & singulas classes in alias vel per sectas vel materiae affinitates ex titulis divideret, ignoraret tamen, quid in libris contineretur, qui boni, qui mali, qui eruditi, qui triobolares essent. Et ut hic ne hilum doctior evaderet, ita nec illis nuda illa historica divisio multum proderit ad constitutionem, essentielles virtutes, & usus herbarum cognoscendos. Vires igitur plantarum examinaturus duo præ oculis habeat, experientiam videlicet & rationem. Experientia præcedat, necesse est, ratio sequatur. Forte a primis Parentibus quædam plantarum scientia, quam a Deo acceperunt, posteris tradita est. Experientia profecto quam maxime primi homines, aut forte inter se armis congressi, aut a feris serpentibusque vulnere aliquo affecti, didicere, quibus herbis sanguinis fluxiones sistendi ac vulnera sanandi virtus insit: hinc primos ortus scientia de plantarum viribus traxisse videtur; non enim alios morbos præter vulnera tunc temporis noverant, cum potu & cibo per-

quam

quam simplici uterentur, atque idcirco apud vetustissimum authorem Homerum memoriæ traditum est, omne Medicinæ decus in vulneribus curandis apud Antiquos fuisse.

- * Nonnulli medicas herbarum virtutes ab animalibus ostensas volunt, ut *Chelidoni* vires ab hirundinibus, *Anethi Foeniculi* a serpentibus, a capreis *Dictamni* &c. unde Poeta.

Hic Venus indigno gnati concussa dolore,
Dictamnium genitrix Cretæa carpit ab Ida,
Puberibus caulem foliis, & flore comantem
Purpureo: non illa feris incognita capris
Gramina, cum tergo volucres hædere sagittæ.

Multa quidem ex his, quæ narrantur, inter fabulas adscribenda, attamen non omnia omnino neganda, quotidiana enim experientia constat, feras ipsas dum morbo aliquo afficiuntur, natura duce, in herbis levamen sibi quærere. Ex Americanorum quidem *Missionariorum* litteris didicimus, apud eosdem more receptum fuisse, simiis ignotarum herbarum fasciculos projicere, ut ab his bestiis edocerentur quæ salubres forent, quæ e contra veneno scaterent: quas enim indignabundæ rejiciebant, venenatæ semper deprehendebantur.

70. Postquam vero homines aliis quoque morbis tum ob immutatum vitæ genus, tum ob ciborum varietates &c. tentarentur, ita ut solidæ humani corporis partes nimium rigidæ aut languidæ, vel fluidæ partes magis, quam par est, spissæ, aut raræ & tenues nimium evaserint, ad alias herbas tentando confugisse videntur, ex quibus, odore, sapore, colore, aut quocunque casu allekti, forte succum expresserunt, vel contusas probe radices adhibuerunt. Quicunque porro hac via utilia a noxiis fecernere, & multos herbarum usus edicere noverrat, is Medicinæ peritus ab omnibus fuerat habitus.

- * Haud alia ratione barbari plurimarum herbarum efficaciam detexere, quibus idcirco plurimum debemus, iis enim acceptam referimus *Smilacem*, *Sarsaparillam* & *Chinam*, *Euphorbiam* *Ipecacuanhæ*, *Rumicem* *Rhabbarum*, *Cissampellum* *Pareiram*, *Burseram* *Simarubam* *Guajacum*, *Opium*, *Assam* *feotidam*, *Alloen* *Lobeliam*, *Ceanothum*, *Dorsteniam* *Contrajervam*, *Arecam* *Catechu*, *Kempferiam* *Zedoariam* &c. &c.

71. Vegetabilia, quæ in humanum corpus vim suam exerunt, ita agunt, ut vel in partes solidas & fluidas, ex quibus corpus nostrum coalescit, abeant, & *alimenti* nomine veniunt; vel præsentem corporis nostri statum immutant, & *toxicum* dicitur, *medicamentum* quidem, si ita immutet, ut ejusdem functiones minime destruantur, *venenum* autem, si functiones lædat, motusque salutares impediat, aut destruat. Horum limites valde affines videntur, sæpe tantum gradu, & quantitate, seu, ut ajunt, *dosi* differunt, ita ut salubre alimentum evadere medicamentum, & medicamentum atrocissimi naturam veneni induere queat; scilicet optimum medicamentum majore copia sumptum in venenum sæpius vertitur, & fortissimum vicissim venenum justâ quantitate adhibitum præstantissimum evadit medicamentum.

72. Annon experientiæ ductu diversas plantæ partes diversis præditas dotibus sæpe deprehendimus? Aliis profecto radix, aliis folia, flores & semi-

na aliis interdum serviunt usibus. Flos sæpissime amoenum, aut minus gratum spargit odorem, reliquæ licet plantæ partes eodem expertes sint. Aliæ quoque fructus partes aliis gaudent qualitatibus: *Citri* semina amara novimus, corticem aromaticum, pulpam acidam.

* Naturam compendio in vegetabilibus sæpe usam fuisse advertimus, variis scilicet plantæ partibus varias facultates indidit ad plures eadem via fines obtinendos: non secus ac artis medicæ periti plura diversæ indolis simplicia in unum redigunt, ut uno eodemque medicamento plures obtineant scopos, quibus infirmus eo certius & citius sublevetur: hinc *sudorifera*, ut ajunt, & *laxantia* miscent ad alvum ciendum, & noxios humores per sudorem expellendos.

73. Ipsa herbarum aut succi quantitas, & ut ajunt, *dosis* an non diversos edit effectus? An non cum aliis corporibus mixtio, & specialis parandi modus alios usus denotant? Varia quantitas vini varie operatur, alcohol ejusdem sesquiuncia sumpta humorum coagulum efficit, cum aquæ
for-

fontanæ libra si admisceatur, alvum solvit. Ex frumento jam panem, jam glutinosum pulmentum, jam pulveres, ut vocant, cyprios, jam cerivisiam, acetum, alcohol &c. parari quis ignorat? Quorum singula annon diversis prædita qualitatibus? Annon ad diversissimos effectus aptissima?

74. Tractu igitur temporis ratio quoque in auxilium vocanda erat, ad temporis enim, loci, individui adjuncta & vicissitudines animadvertendum est, in morborum causas inquirendum, medicamenti efficacia, morbi gradus examinandus, infirmorum vires perpendendæ & in examen vocandæ, maxime postquam innotuit vegetabilium robur in intimas sese corporis partes insinuare. Atque idcirco practicæ quædam regulæ experientiæ & rationis ope editæ sunt, contraria contrariis sæpius curari pronunciatum, quin contrariis morbis interdum morbos ipsos depelli cognitum est.

* Plantas in intimas corporis animalis partes vim suam exerere extra dubium est.

Vaccarum lac, quæ Boletis vescuntur, facit
 stiduum stomacho movet, caprarum, quæ
 Tithymalo pascuntur, alvum laxat, peco-
 rum vero lac, quæ Scordio, Ceba, Porro
 nutriuntur; alliaceum saporem præ se fert.
 Accidit interdum, narrat Rājus Hist. Plant.,
 ut capræ & oves in Creta fame vexatæ A-
 nagyridis folia depascant, licet odoris sint
 ingratissimi, & postea ex horum lacte caseus
 conficiatur, quo si forte ignarus aliquis ve-
 scatur, aut lac bibat, statim excitantur tum
 vehementissimi vomitus tum fluxus ventris; &
 cum sæpissime accidat, multi in discrimen
 vitæ veniunt, quam ob causam frutex omni-
 bus sit exosus. Sapidiores pecudum carnes
 evadunt, si Rosmarino, Salvia aliisque hu-
 jusmodi aromaticis herbis fruantur. Ru-
 biae radix a suis aut gallinis absumpta,
 ossa ipsa earundem rubro tingit colore,
 ut primus Belchier Philosoph. Transact. in
 gallinis observavit. Opuntiae fructus vacca-
 rum lac cæruleo, nutricum rubro, infan-
 tum urinam item rubro colore inficit &c.

75. Falsa equidem, & nulli omnino
 nixa fundamento est quorundam Ve-
 terum de viribus plantarum theoria,
 tum ab astris petita, quod singula si-
 dera singulis corporis partibus ac her-
 bis singulis præesse putarent, eas pro-
 inde plantas levamen afferre v. g. ca-
 piti

plati tradebant, quæ commune cum capite fidus ut tutelare numen agnoscere; tum a similitudine inter plantæ partem & læsum corporis membrum desumpta: sic ob externam figuram *Anacardium orientale* cordi robur afferre perperam existimabant.

76. Aliis verosimile videbatur, & circa lapsi seculi finem, teste Tournefort, Gèoffroy &c. ipsa Regia Scientiarum Parisiensis Academia suspicabatur, ex chemica plantarum analysi posse quidpiam certi deduci, eo permoti argumento, quod plantas aliquot, iisdem præditas viribus, deprehenderint, ex quibus chemica principia, phlogiston nempe, Sal, phlegma, terra & numero & quantitate & forma paria extracta fuissent. At irritò conatu. Fere bis mille analyses plantarum Cl. Chomel Academicus Parisinus in *Hist. plant.* fatetur, per ignem fecere Chymici Reg. Scient. Academ. Parisinæ, sed his omnibus præstiterè nihil, nisi ut liquidum foret, ex omnibus communiter extrahi posse, aceti liquidi quantitatem, olei essentialis seu

foetidi majorem vel minorem, salis fixi volatilis & concreti, phlegmatis insipidi & terræ copiam, & sæpe hæc omnia eadem quantitate & proportionem in plantis diversissimi effectus; inutilis ideoque & irritus labor; profuit tamen ad præjudicium deponendum de vi analyseos.

77. Nec Tournefortii tentamina quidquam certi evincunt. Plantarum is succos, ut Pontedera refert, in certas papyros recepit, quæ sive his succis vivido ac rubeo colore tingerentur, sive etiam languide, aut etiam nulla macula infectæ evaderent, signum tamen afferrent, quibus principiis partibusque constarent plantæ, aut quibus privarentur. Ipsa Tournefortii experimenta circa plantas in Parisiensi agro nascentes instituta ejusdem conatus inanes & mancos esse ostendunt. Rumex enim acetosa pratensis, Prunella seu Brunella major, Lepidium, Fumaria, Ononis seu Anonis spinosa, Sisymbrium aquaticum, Lupulus mas & femina &c. in profligando scorbutu præstantes sunt: cur ergo per priorum quatuor succos rubeo &

vivido colore cærulea papyrus inficitur, debili vero & languido per *Ononis* & *Sisymbrii* succum? Cur *Lupulus* nihil omnino in chartam agit? Item *Bryoniæ* & *Asari* radicum succus, tum corticis *Rhamni* seu *Frangulæ* vividum colorem imprimit, *Sambuci* vero *Edu-li*, & *Lini pratensis* expressus humor remissum & languentem, nullum denique *Violæ nigræ* sive *purpureæ*, & *Mercurialis maris* succus colorem præbet; attamen constat, omnibus his eandem esse alvum ciendi vim. Innumera sunt in curandis vulneribus efficaces plantæ, inter quas *Polygonum hydropiper* seu *Persicaria urens*, *Achillea* seu *Millefolium rubro flore*, *Sedum* seu *Anacampseros purpurea* saturo colore papyrum inficiunt; *Spiræa* vero seu *Ulmaria*, *Symphytum* seu *Consolida major*, *Hieracium* seu *Pilosella major* repens pallidulo; nullo denique colore *Betonica purpurea*, *Tenacetum millefolium*, *Melissa* seu *Calamintha humilior*, *Antirrhinum* seu *Linaria*, *Lysimachia nummularia*. Si ergo in tam paucis tot discrimina, quid de reliquis dicendum?

CAPUT II.

*De plantarum in genere & viribus
convenientia.*

78.



Ostquam systematici Botanici; experientia magistra, animadvertissent, iisdem viribus plantas pollere, quæ genere conveniunt, operose in generum affinitates inquisiverunt, ut juxta principia quædam; si fieri potest, plantarum vires determinarentur. Profecto sicuti genera naturæ folius opus sunt N. 48. ita generum naturales quidam ordines sint, oportet, quorum individua uti genere, ita viribus propius inter se accedant. At naturales ordines determinare hic labor; hic opus. Annon ex ea vegetabilium parte naturales ordines desumendi, quæ ad eorundem naturam & essentiam spectat? Quæ autem pars plantarum naturam constituit? Annon ea forte, quæ con-

stans est, & qua nulla omnino planta destituitur? Fructificatio igitur ea est, quæ constans, & in omni omnino plantarum specie N. 24. 27. deprehenditur.

* Quidam ex radice naturales vegetabilium ordines irritò conatu eruere adlaborarunt, radix enim in omnibus plantis nequaquam invenitur, in *Visco* namque, *Ulva*, & *Fuco* desideratur. Caudex quoque aut pedunculus nullum exhibet fundamentum, cum in *Lichenibus* quibusdam, in *Carduo*, in *Carlina acauli* caudex haud reperiatur, nec in *Phyllantho* pedunculus. Aliis folia placuere; at in *Cuscuta*, *Cacto* & nonnullis *Euphorbiæ* speciebus nulla sunt, in diversis vero *Geranii* speciebus diversissima, jam *Aconiti*, jam *Malvæ*, jam *Althææ*, aut *Betonicæ*, *Archimillæ*, *Cicutæ* &c. foliis simillima.

79. Quæ igitur vegetabilia fructificatione conveniunt, ea ejusdem esse naturalis ordinis censenda sunt, ita quidem ut non tam flores aut fructus vel femina, sed omnes omnino fructificationis partes harmonice, ut ita dicam coincidant. Adeo autem naturalium generum limites prope ad se in-

vicem accedunt, dum ea in unum naturalem ordinem colligimus, ut summi etiam Botanici in determinandis naturalium ordinum characteribus maxime defudaverint, ut ex *Umbellatis*, *Syngenistis*, *Stellatis* & *Asperifoliis* Raii patet.

80. Determinatis naturalibus ordinibus, cum experientia didicerimus, plantas genere convenientes etiam virtute convenire, & quæ naturali ordine continentur, etiam viribus propius accedere: annon certi quidpiam pronunciare possumus? Annon, inspectis plantæ cujuscpiam fructificationis partibus, certum præ oculis characterem habemus, quo dignoscimus, quas doctes planta hujusmodi a Sapientissimo Conditore nacta sit, quibus viribus prædita? Maxime si unius alteriusve ejusdem naturalis ordinis efficaciam perspectam habuerimus, si ejus saporem, odorem, colorem, natalem locum exploraverimus. Quod si e. g. *Horminum* ex alpibus allatum nobis ostenderetur, & naturalem ejusdem ordinem ex fru-

Etificatione dignovissemus, annon certi essemus, plantam hanc minime venenatam esse? Equidem in errorem non inducerer, si eadem virtute illam gaudere, ac ceteræ fruuntur *Verticillatæ*, arbitrarer.

- * Ingenti hæc methodus sese commendat utilitate: exemplo nobis sit inter tot *Polygala vulgaris*. *Radix Senegæ*, *The Rattle-Snakeroot* Anglis dicta, diu Incolarum Virginiae contra *Viperæ caudisonæ* morsus, pleuritidem seu violentum lateris dolorem, peripneumoniam hoc est pulmonum inflammationem aliasque phlogisticas febres arcanum fuerat. Circa 1736. tandem ab Americanis quibusdam Cl. Tennint Scoto Medico id candidè patefactum est, cognitumque hac ratione *Senegam* esse *Polygalæ* speciem. Hinc optimo cum successu contra eosdem morbos a Cl. Duhamel Parisiensi Acad. *vulgaris Polygala* adhibita fuit, debiliore licet virtute præditam esse deprehendisset. *Mémoires de l'Acad. des Sciences* A. 1739. *Verbesina Acmella* egregias contra vesicæ calculum vires exerit; at rarissima cum sit, & magno pretio comparanda, Cl. Linnæus eidem proximam in Ord. Nat. XLIX. *Sigesbeckiam* substituentem declaravit, quod optimo cum eventu Cl. Hasselquist executus est.

C A P U T I I I.

*De Naturalibus Plantarum
Ordinibus.*

I. Palmæ.

Vide appendicem post Classē XXIV.

II. Piperitæ.

Zostera . Ambrosinia . Arum . Calla . Dra-
contium . Pothos . Orontium . Acorus . Piper .
Saururus .

III. Calamariæ.

Sparganium . Typha . Eriophorum . Scirpus .
Carex . Cyperus . Schoenus .

IV. Gramina.

Bobartia . Lygeum . Coix . Zea . Tripsacum .
Apluda . Aegilops . Ischænum . Triticum . Se-
cale . Hordeum . Elymus . Lolium . Nardus .
Anthoxanthum . Dactylis . Cenchrus . Cynosurus .
Cinna . Andropogon . Saccharum . Arundo . La-
gurus . Stipa . Aristida . Avena . Bromus . Fe-
stuca . Poa . Briza . Uniola . Holcus . Melica .
Aira . Zizania . Pharus . Olyra . Oryza . Pasp-
alum . Phalaris . Panicum . Milium . Agrostis .
Phleum . Alopecurus . Cornucopiæ .

V. Tripetaloidæ.

Calamus . Flagellaria . Aphyllanthes . Jun-
cus . Triglochin . Scheuchzeria . Butomus . A-
lisma . Sagittaria .

VI. En-

VI. Ensatæ.

Ferraria. Sisyrinchium. Crocus. Ixia. Wachendorfia. Antholyza. Gladiolus. Moræa. Iris. Xyris. Eriocaulon. Callisia. Commelina. Tradescantia. Pontederia.

VII. Orchideæ.

Orchis. Satyrium. Serapias. Ophrys. Arcthusa. Cypripedium. Limodorum. Epidendrum.

VIII. Scitamineæ.

Musa. Thalia. Maranta. Costus. Alpinia. Amomum. Curcuma. Kæmpferia. Canna.

IX. Spathaceæ.

Allium. Hæmanthus. Amaryllis. Pancratium. Narcissus. Galanthus. Leucojum. Crinum. Bulbocodium. Colchicum. Gethyllis.

X. Coronariæ.

Polianthes. Asphodelus. Albuca. Cyanella. Ornithogalum. Scilla. Hyacinthus. Alethris. Aloe. Yucca. Agave. Bromelia. Tillandsia. Burmannia. Hypoxis. Hemerocallis. Anthericum. Veratrum. Melanthium. Helonias. Fritillaria. Lilium. Tulipa.

XI. Sarmentaceæ.

Gloriosa. Erythronium. Alstroemeria. Uvularia. Convallaria. Ruscus. Asparagus. Medeola. Trillium. Paris. Smilax. Dioscorea. Tamus. Rajania. Menispermum. Centella. Cissampelos. Aristolochia. Asarum. Cytinus.

XII. Holeraceæ.

Blitum. Spinacia. Atriplex. Chenopodium. Beta. Salsola. Anabasis. Salicornia. Bassella.

Rivinia. Calligonum. Petiveria. Ceratocarpus.
 Corispermum. Callitriche. Axyris. Illecebrum.
 Herniaria. Polychnemum. Camphorosma. Bego-
 nia. Rumex. Rheum. Attraphaxis. Polygonum.
 Coccoloba. Nyssa. Mimulus. Rhizophora.
 Bucida. Anacardium. Laurus. Tinus. Winte-
 rania. Heisteria.

XIII. Succulentæ.

Caëtus. Mesembryanthemum. Aizoon. Te-
 tragonia. Galenia. Tamarix. Reaumuria. Neu-
 rada. Sempervivum. Septas. Penthornum. Se-
 dum. Rhodiola. Tillæa. Crassula. Cotyledon.
 Suriana. Nama. Trianthema. Sesuvium. Por-
 tulaca. Claytonia. Adoxa. Chrysosplenium.
 Saxifraga. Mitella. Tiarella. Hydrangea.

XIV. Gruinales.

Linum. Aldrovanda. Drosera. Oxalis. Ge-
 ranium. Guajacum. Quassia. Zygophyllum. Tri-
 bulus. Fagonia. Averrhoa.

XV. Inundatæ.

Zanichellia. Ruppia. Potamogeton. Mario-
 phyllum. Ceratophyllum. Proserpinaca. Ela-
 tine. Hippuris.

XVI. Calycifloræ.

Osyris. Trophis. Hippophae. Elæagnus.

XVII. Calycantheinæ.

Epilobium. Oenothera. Gaura. Jussiaea. Lud-
 wigia. Isnardia. Ammannia. Grisea. Ment-
 zelia. Glaux. Peplis. Frankenia. Lythrum.
 Melastoma. Osbeckia. Rhexia.

XVIII.

XVIII. Bicornes.

Kalmia. Ledum. Azalea. Rhodora. Rhododendrum. Andromeda. Epigæa. Gaultheria. Pyrola. Erica. Blæria. Clethra. Arbutus. Vaccinium. Royena. Diospyros. Myrsine. Halesia. Styrax. Citrus. Garcinia.

XIX. Hesperideæ.

Eugenia. Psidium. Myrtus. Caryophyllus. Philadelphus.

XX. Rotaceæ.

Trientalis. Centunculus. Anagallis. Lysimachia. Phlox. Exacum. Gentiana. Swertia. Chironia. Sarothra. Ascyrum. Hypericum. Cistus.

XXI. Præciæ vel Præcoces.

Primula. Androsace. Diapensia. Aretia. Dodecatheon. Cortusa. Soldanella. Cyclamen. Limosella. Menyanthes. Hottonia. Samolus.

XXII. Caryophylleæ.

Dianthus. Saponaria. Gypsophila. Velezia. Drypis. Silene. Cucubalus. Lychnis. Agrostema. Spergula. Cerastium. Arenaria. Stellaria. Alsine. Holosteum. Cherleria. Sagina. Moehringia. Bufonia. Pharnaceum. Glinus. Molugo. Polycarpon. Minuartia. Queria. Ortega. Loeflingia. Scleranthus. Polypremum.

XXIII. Trichilataæ.

Melia. Trichilia. Malpighia. Banisteria. Triopteris. Acer. Aesculus. Staphylea. Sappindus. Paullinia. Cardiospermum. Tropæolum.

XXIV. Corydales.

Melianthus . Monnieria . Epimedium . Hy-
 pecum . Fumaria . Leontice . Impatiens . Utri-
 cularia . Pinguicula .

XXV. Putamineæ.

Cleome . Crateva . Morifonia . Capparis . Cre-
 scentia . Marcgravia .

XXVI. Multifiliquæ.

Pæonia . Aquilegia . Aconitum . Delphinium .
 Dictamnus . Ruta . Peganum . Nigella . Gari-
 della . Isopyrum . Trollius . Helleborus . Cal-
 tha . Ranunculus . Myosurus . Adonis . Anemo-
 ne . Altragene . Clematis . Thalictrum . Actæa .

XXVII. Rhoeadeæ.

Bocconia . Argemone . Chelidonium . Papa-
 ver . Sanguinaria . Podophyllum .

XXVIII. Luridæ.

Browallia . Celsia . Verbascum . Digitalis .
 Sesamum . Pedalium . Nicotiana . Atropa .
 Hyoscyamus . Datura . Physalis . Capsicum . So-
 lanum . Ellisia . Strychnos . Lycium . Cestrum .
 Catesbæa .

XXIX. Campanaceæ.

Evolvulus . Convolvulus . Ipomoea . Pole-
 monium . Campanula . Roella . Phyteuma . Tra-
 chelium . Jassione . Lobelia . Viola .

XXX. Contortæ.

Genipa . Gardenia . Cerbera . Rauvolfia . Ma-
 crocnemum . Vinca . Nerium . Echites . Plume-
 ria . Tabernæmontana . Cameraria . Periploca .
 Apocynum . Cynanchum . Ceropegia . Ascle-
 pias et S. pelia .

XXXI. Ve-

XXXI. Vepreculæ.

Dais. Quisqualis. Dirca. Daphne. Gnidia.
Lachnæa. Passerina. Stelleria. Thesium.

XXXII. Papilionaceæ.

Medicago. Trigonella. Trifolium. Lotus.
Anthyllis. Crotalaria. Ononis. Clitoria. Do-
lichnos. Phaseolus. Glycine. Pisum. Lathy-
rus. Orobus. Vicia. Ervum. Cicer. Coronil-
la. Ornithopus. Hippocrepis. Scorpiurus. Bi-
serrula. Astragalus. Phaca. Glycyrrhiza. He-
disarum. Indigofera. Galega. Aeschynomene.
Arachis. Lupinus. Ebenus. Pforalca. Colutea.
Citifus. Ulex. Spartium. Genista. Borbonia.
Aspalathus. Robinia. Sophora. Piscidia. Ana-
gyris. Erythrina. Amorpha. Pterocarpus. Nif-
folia. Geoffræa.

XXXIII. Lomentaceæ.

Polygala. Cercis. Bauhinia. Hymenæa. Ce-
ratonia. Mimosa. Gleditsia. Guilandina. Poin-
ciana. Cæsalpinia. Cassia. Parkinsonia. Adenan-
thera. Hæmatoxylum.

XXXIV. Cucurbitaceæ.

Gronovia. Anguria. Elaterium. Sicyos.
Melothria. Bryonia. Cucurbita. Cucumis.
Trichosanthes. Momordica. Fevillea. Passi-
flora.

XXXV. Senticosæ.

Alchemilla. Aphanes. Agrimonia. Dryas.
Geum. Sibbaldia. Tormentilla. Potentilla.
Comarum. Fragaria. Rubus. Rosa.

XXXVI. Pomaceæ.

Spiræa . Ribes . Sorbus . Cratægus . Mespilus . Pyrus . Punica . Chrysobalanus . Prunus . Amygdalus .

XXXVII. Columniferæ.

Malva . Alcæa . Althæa . Lavatera . Malope . Melochia . Sida . Napæa . Pentapetes . Bombax . Adansonia . Gossypium . Hibiscus . Urena . Triumfetta . Heliocarpos . Bixa . Corchorus . Waltheria . Turnera . Hermannia . Helicteres . Kleinhovia . Ayenia . Theobroma . Grewia . Microcos . Muntingia . Camellia . Thea . Stewartia . Tilia . Kiggelaria .

XXXVIII. Tricoccæ.

Cambogia . Dalechampia . Plukenetia . Euphorbia . Clutia . Andrachne . Phyllanthus . Adelia . Croton . Thryallis . Excoecaria . Cupania . Tragia . Acalypha . Jatropha . Ricinus . Hernandia . Guettarda . Sterculia . Hippomane . Hura . Carica . Cliffortia . Mercurialis . Solandra . Cneorum . Buxus .

XXXIX. Siliquosæ.

Vide Classẽm XV. Tetradynamiam .

XL. Personatæ.

Chelone . Cymbaria . Antirrhinum . Dodartia . Bartia . Rhinanthus . Pedicularis . Euphrasia . Melampyrum . Mimulus . Lathræa . Orobanche . Obolaria . Martynia . Craniolaria . Torenia . Scrophularia . Gesneria . Schwalbea . Duranta . Columnea . Besleria . Gerardia . Ruellia . Justitia . Dianthera . Barleria . Stemodia . Petrea . Bignonia . Citharexylon . Halleria . Gme-

lina . Bontia . Cornutia . Clerodendron . Vol-
kammeria . Vitex . Ovieda . Capraria . Gratiola .
Scoparia . Veronica . Verbena . Phryma . Toz-
zia . Buchnera . Erinus . Lantana . Collinsonia .
Acanthus .

XLI. Asperifoliæ .

Symphytum . Onosma . Cerinthe . Borago .
Echium . Lycopsis . Asperugo . Pulmonaria . Li-
thospermum . Cynoglossum . Anchusa . Myoso-
tis . Heliotropium . Tournefortia . Varronia .
Eheretia . Cordia . Patagonula . Nolana .

XLII. Verticillatæ .

Ziziphora . Thymus . Satureja . Thymbra .
Melissa . Clinopodium . Origanum . Hyssopus .
Lavandula . Salvia . Rosmarinus . Ocimum .
Mentha . Nepeta . Dracocephalum . Glecoma .
Sideritis . Cunila . Lycopus . Amethystea . Tri-
chostema . Teucrium . Ajuga . Horminum . Me-
littis . Monarda . Lamium . Orvala . Galeopsis .
Betonica . Stachys . Ballota . Marrubium . Leo-
nurus . Phlomis . Mollucella . Cleonia . Prunel-
la . Scutellaria . Prasium .

XLIII. Dumosæ .

Sideroxylum . Rhamnus . Philica . Ceano-
thus . Chrysophyllum . Achras . Prinos . Ilex .
Tomex . Callicarpa . Evonymus . Celastrus .
Cassine . Viburnum . Sambucus . Rhus . Schi-
nus . Fagara .

XLIV. Sepiariæ .

Nyctanthes . Jasminum . Ligustrum . Phillyrea .
Olea . Chionanthus . Fraxinus . Syringa .

XLV. Umbellatæ

Eryngium . Arctopus . Hydrocotyle . Sanicula . Altrancia . Echinophora . Tordylium . Daucus . Arteria . Caucalis . Hasselquistia . Cachrys . Laferpitium . Ferula . Ligusticum . Angelica . Imperatoria . Heracleum . Pastinaca . Thapsia . Smyrnum . Aegopodium . Ammi . Bubon . Phellandrium . Sison . Sium . Oenanthe . Coriandrum . Aethusa . Cicuta . Scandix . Chærophyl- lum . Seseli . Anethum . Carum . Pimpinella . Apium . Cuminum . Crithmum . Bunium . Conium . Selinum . Atamantha . Peucedanum . Bupleurum .

XLVI. Hederaceæ.

Panax . Aralia . Xantoxylum . Hedera . Vitis . Cissus .

XLVII. Stellatæ.

Phyllis . Richardia . Crucianella . Spermacoce . Sherardia . Asperula . Galium . Valantia . Anthospermum . Hedyotis . Knoxia . Lippia . Diodia . Rubia . Ophiorrhiza . Spigelia . Houstonia . Oldenlandia . Coffea . Psychotria . Cornus . Ixora . Pavetta .

XLVIII. Aggregatæ.

Statice . Hartogia . Brunia . Protea . Globularia . Leucadendron . Hebenstretia . Selago . Cephalanthus . Dipsacus . Scabiosa . Knautia . Allionia . Valeriana . Morina . Boerhavia . Circea . Lonicera . Chiococca . Triosteum . Mitchellia . Linnæa . Morinda . Conocarpus . Loranthus . Viscum .

XLIX. Com-

XLIX. Compositæ.

Capitata.

Gundelia. Echinops. Sphæranthus. Arctium.
Serratula. Carduus. Cnicus. Onopordum. Cy-
nara. Carlina. Gorteria. Atractylis. Cartha-
mus. Centaurea. Elephantopus.

Semiflosculosa.

Scolymus. Cichorium. Catananche. Lapsa-
na. Hypochoeris. Seriola. Hyoseris. Andryala.
Crepis. Hieracium. Leontodon. Prenanthes.
Chondrilla. Lactuca. Sonchus. Picris. Scor-
zonera. Tragopogon. Geropogon.

Discoidea.

Gnaphalium. Xeranthemum. Stæhelina. Ta-
nacetum. Matricaria. Carpesium. Chrysanthemum.
Pteronia. Baccharis. Osmites. Conyza.
Inula. Erigeron. Cineraria. Tussilago. Doron-
icum. Arnica. Senecio. Solidago. Chrysocoma.
Aster. Leysera. Santolina. Anthemis.
Anacyclus. Cotula. Athanasia. Achillea. Ca-
calia. Perdicium. Bellis. Ageratum. Eupato-
rium. Ethulia. Kuhnia. Corymbium. Helenium.
Othonna. Calendula. Arctotis. Osteospermum.

Oppositifolia.

Bidens. Verbesina. Sigesbeckia. Coreopsis.
Silphium. Tetragonotheca. Polymnia. Helian-
thus. Rudbeckia. Milleria. Bupthalmum.
Chrysogonum. Melampodium. Tridax. Pectis.
Tagetes. Zinnia. Calea. Amellus.

Nucamentacea.

Stoebe. Tarchonanthus. Artemisia. Seri-
phium. Eriocephalus. Filago. Microtus. Iva.
Parthenium. Ambrosia. Xanthium. Strumphia.

L. Amen

L. Amentaceæ.

Salix. Populus. Platanus. Sloanea. Fagus.
Juglans. Quercus. Corylus. Carpinus. Betula.
Myrica. Pistacia. Cynomorium.

LI. Coniferæ.

Pinus. Cupressus. Thuja. Juniperus. Taxus.
Ephedra.

LII. Coadunatæ.

Xylopiæ. Annona. Uvaria. Michelia. Ma-
gnolia. Liriodendron.

LIII. Scabridæ.

Cecropia. Ficus. Dorstenia. Parietaria. The-
ligonum. Urtica. Morus. Ulmus. Celtis. Bo-
sea. Acnida. Cannabis. Humulus.

LIV. Miscellanæ.

Reseda. Datisca. Poterium. Sanguisorba.
Pistia. Lemna. Coriaria. Empetrum. Achy-
ranthes. Celosia. Amaranthus. Iresine. Gom-
phrena. Phytolacca. Nymphæa. Sarracenia.
Cedrela. Swietenia. Telephium. Limeum.
Corrigiola.

LV. Filices. LVI. Musci. LVII. Algæ.

LVIII. Fungi.

Vide Classẽm XXIV.

C A P U T IV.

De quorundam Ordinum Nat. viribus.

81.



Rimæ sese *Palmæ* offerunt, omnes sine ramis simplicissimo caule, ex cuius fastigio folia erumpunt, uti a Rheede & Plumierio describuntur. Omnes fructu esculento, drupa N. 19*. videlicet aliæ, aliæ nuce N. 21*. gaudent.

82. *Piperitæ* Ord. Nat. II. valde calefacientes sunt, noxiæ evadunt, si maiori copia fumantur.

* *Radix Ari* tam recens quam exsiccata in usu est: recens adhuc insigni pollet acrimonia; si aqua coquatur, haud parum efficaciam amittit, aceto penitus mitescit, & esculenta fit, ut Theophrastus & Dioscorides scribunt. Ceterum viscosum & spissum ventriculi & intestinorum mucum valde incidit, attenuat, & resolvit, hinc prostratum appetitum mire restaurat, & acuit,

ac

ac in melancholicis, *hypochondriacis*, ut ajunt, *hystericis* & *scorbuticis*, ut dicunt, affectionibus, quæ a succorum lentore pendent, feliciter adhibetur. Radix & ipsa planta recens ac viridis in aceto cocta, & mitior facta, sanguinis gruminum solvit, optimum remedium in casu ab alto; hinc ab Helmontio remedium magnum in casu magno vocatur. Ex radicibus stillatiæ quoque aquæ ad faciei pelliculam poliendam & illustrandam parantur: idem fæces in tenuissimum pulverem exsiccatæ præstant, quas succus ex recenti contusa radice expressus secernit, siquidem cuti splendorem nitoremque conciliare dicuntur. Piper calefacit, exsiccant, attenuat, resolvit, aperit, viscerum fibras nimis laxas firmat, lentos & crassos humores dividit, sanguinis motum auget; hinc præcipuus ejus usus in refrigeratione & ventriculi cruditate, colicis doloribus, ac frigida cerebri intemperie.

83. Plurima ex *Graminibus* vegetabilia in Classe Triandria Digynia continentur, in Ordine vero Naturali III. IV. & V. Characteres Graminum universales sunt: Calyx exterior aut nullus, aut ex gluma N. 13*. bifolia aut unifolia; interior ex duplici valvula, altera majori & gibba, minori altera

&

& plana constat. *Corolla* nulla. *Stamina* ut plurimum tria. *Stigmata* duo. *Pericarpium* nullum &c. *Folia Graminum* pecoribus præcipuum præbent alimentum, femina minora avibus, majora denique hominibus esculenta sunt.

* Omnia quidem Gramina comeduntur, sed alia aliis animantibus magis arrident, *Festuca* ovibus, *Carex* bobus, *Scirpus pallustris* suibus &c. præplacent; minora *Phalaridis* femina Canariensi passeri, *Panici* vero *Milii* &c. gallinis gratiora, majora vero, cerealia dicta, hominibus in cibum veniunt, præprimis *Triticum*, *Oriza*, *Hordeum* &c. Ex ipsis *Lolii* feminibus panis, urgente annonæ necessitate, confici potest, pauperibus usui futurus; uti & ex *Scirpi maritimi* radicibus exsiccatis, & probe contusis. Quod si ex majoribus *Lolii* feminibus potus fiat, temulentiam is facit, dolores capitis & vertiginem, quin etiam cæcitatem inducit.

84. *Ensatae*, quarum folia ensis speciem referunt, radix carnosæ est, caulibus simplex, articulis distinctus, Ordinem Naturalem VI. constituunt. *Ireos* effectus nobis cognitus est; & quidem *Ireos vulgaris* radix vomitum excitat,
Flo-

Florentinæ expectorans est vis, id est, scretum elicit, & ut ajunt, *errhina*, seu mucum e naribus educit, *Ireos* seu *pallustris Acori* radix *diuretica* est, seu urinam movet, hinc hydrope laborantibus commoda; *Ireos* denique *tuberosæ*, quam Tournefort *Hermiodactylum* vocat, vis purgans est, & ad obstructa in minimis vasis referenda celebris. *Gladioli* radix digestionem & suppurationem adjuvat, purgat &c. *Xyridis* radix *diuretica* vi prædita est, & *drastica*, ut ajunt, qua violentissime alvum movet. *Croci* virtus resolvens, purgans, pellens &c. Annon idem de aliis Ordinis hujus plantis pronuntiandum?

* An diversa *Ensatarum* vis, vel eadem potius diversæ distributa? An distincta idcirco principia, vel eadem potius varie aptata? Eadem equidem *Ippecacuanha Euphorbiæ* species, si coquatur, leniter purgat; si excoquatur, *diuretica* fit, *sudorifera*, seu sudorem ciet, & *emmenagoga*, hoc est *menstrua* expellit; si adhuc magis excoquatur *expectorans* evadit &c. Quod si ars hæc, quid natura?

85. Ord. Nat. VII. *Orchideæ* seu

Clas

Classis Gynandriæ Diandriæ *aphrodisiacæ* dicuntur; hoc est Orchidearum radices præprimis venerem excitare putant. Apud Americanos potissimum *Epidendri* filiqua, vulgo *Vanilla* dicta, in usu est: apud Orientales *Salep*, seu bulbus N. 9*. cujusdam *Orchidis*, ut Cl. Gèoffroy observavit, speciali modo paratus: apud Europæos autem *Satyrium*, ejusdem nempe bulbus maceratus, & juxta methodum a Cl. Gèoffroy præscriptam exsiccatus *Mémoires de l'Acad. des Sciences A. 1740.*

* Ex eo forte plantas has jam Theophrastus, Galenus, Plinius, & pleno dein agmine omnes fere posterius *aphrodisiacas* arbitrati sunt, quod earum bulbi, ex quibus radix constat, testibus quam simillimi sint: hanc iisdem vim Cl. Gèoffroy negat, fateturque, experientia quotidie comprobari, cujuscunque speciei *Orchidem* hac ficta dote haud esse præditam, præsertim si soli sumantur bulbi, *Piperitas* potius ad hunc effectum præstandum longe esse aptiores.

86. *Scitamineæ* Ord. Nat. VIII. foliis simplicibus, integris, alternis, caule
her-

herbaceo, culmiformi, aromatica gaudent radice; hinc *Kæmpferia*, off. *Zedoaria* & *Galanga*, *Amomum*, off. *Zingiber*, *Cardamomum*, & *Grana paradisi* &c. calefacientes sunt, nervinæ, ut vocant, seu vitales functiones promovent, diaphoreticæ, hoc est perspirationem juvant, emmenagogæ N. 84*, eccoproticæ, seu leniter alvum cient, diureticæ N. 84., stomachicæ, id est orexim seu ad cibos appetitum excitant.

87. Ordinis Naturalis IX. X. XI. Hexandriæ Classis potissimum radices palato & odoratu examinandæ, an esculentæ, an noxiæ sint. Si odore expertes, ut *Lilii Martagonis*, *Tulipæ*, *Ornithogali* &c. in cibum sumi possunt, & re ipsa apud quosdam in usu sunt. Si virosum odorem spargunt, venenatæ censendæ sunt, ut *Gloriosæ* radix *Colchici*, *Scillæ*, *Hyacinthi*, *Antherici*, *Leucoii*, *Narcissi*, *Fritillariæ* seu *Coronæ imperialis*, *Galanthi*, *Pancratii*, *Amaryllidis*, *Crini*, *Convallariæ*, *Aloe* &c.

* In Diss. *Experim. curios. de Colchico veneno* &c. Genæ 1718. Cl. Wedelius refert, se ab anno 1668. usque ad A. 1718. Colchici radicem pro amuleto collo appensam semper gestasse, & optimo quidem cum successu, neque se ipsum solum sed & alios plurimos, neque solum in peste sed etiam in morbis quibuscunque, ut ajunt epidemicis, seu popularibus, dysenteria, febribus malignis, variolis, morbillis &c. incolumem præstitisse, Auctor nomine D. Caspar narrat, ait in prædicta Diss., quemdam præfectum militum in bellis Hungaricis suos milites solo hoc amuleto a sevientī peste immunes semper fecisse, quod a rustico didicerat, qui asserbat, omnes vicini cujusdam pagi incolas ab eodem præfecto hic degente eodem amuleto præmunitos, pestifera lue affectos non fuisse, dum in pagis & urbibus vicinis dire sæviret Cum ante aliquot annos, addit Wedelius, in urbe Amburgensi grassaretur pestis, illustris Magistratus a facultate Medica nostra desiderabat duos medicos pestilentiales, quos illuc mandabamus divinæ tutelæ commissos, & hoc amuletum ipsis appendendum suadebamus. Bene gesta re, liberata urbe, salvi utrique & incolumes redierunt. Bulbos Colchici circa autumnale æquinoctium colligendos, sericeo sacculo inclusos de collo suspendendos, tum post tres menses amuletum renovandum volunt. Annon forte amuleto hoc confisi rudes præsertim homines magnanimi redduntur, minus conta-

gium perhorrescentes, hacque ratione grafsanti malo obicem ponunt? Id ipsum Rivinus in *Tract. de peste Lipsiensi* 1680. existimat. Eximia est *Colchici* virtus eaque certior & quam plurimis experimentis, ab Illustrissimo Barone D. Storckio S. C. R. & A. M. Archiatro institutis, comprobata in glutinoso incidendo, sputis promovendis, & pellenda urina, ut videre est in egregio ejusdem de *Colchico autumnali* libello; hinc provide ab Eximio Gradiscani Comitatus Protomedico D. Barth. Patuna contra hydropem optimo cum successu *Colchicum* adhibitum est, ut elapso anno in foliis, quæ *Nova Goritienſia* dicuntur, N. 8. & 9. legimus.

88. *Bicornes* Ord. Nat. XVIII., quarum flores antheris bicornibus gaudent, egregia adstringendi vi pollent.

* Notissimæ sunt *Erica*, *Vaccinium*, *Arbutus* seu *Uva ursi*, cujus foliis *Rhois coriariæ* loco ob adstringentes & corroborantes vires *Coriarii* utuntur. *Pyrola* ob adstringendi efficaciam aptissima ad sanguinis fluxum, albos fluores, hæmorrhagiasque, seu nimium sanguinis fluxum, diffractis quacunque ratione vasis, sistendum semper adhibita est, atque, ut herba *Thee* solet, usurpata &c. Ex *Bicornibus* quædam bacciferæ sunt, ut *Myrsine*, *Arbutus*, *Vaccinium*, *Royena*, *Diospyros*, quarum baccæ,
etſi

etsi in quibusdam acidæ & nigræ, esculentæ sunt. *Vaccini myrtilli* recentes baccae sapidæ, *Vaccinii oxycoccos* baccae valde acidæ detergunt, & adstringunt; hinc humorum læstum, in corpore humano ab acri & adurente bile ortum, sedant, utilesque sunt in ardentibus febribus, stomachum & intestina roborant, ac appetitum revocant, ventris fluxum sistunt, & opportune in hæmorrhagiis, ab humorum acredine & sanguinis solutione provenientibus. Idem hujus folia & flores præstant. *Vaccinii* denique *uliginosi* baccae liberalius sumptæ temulentiam excitare dicuntur.

89. Plantæ quædam Ord. Nat. XIX. XXXV. XXXVI. eæ scilicet, quæ in Classe Icosandria continentur, fructus pulposos & esculentos producant, hujusmodi sunt *Eugenia*, *Psidium*, *Rosa*, *Rubus*, *Fragaria*, *Sorbus*, *Cratægus*, *Mespilus*, *Pyrus*, *Punica*, *Prunus*, *Amygdalus*, *Cerasus* &c. &c.

* Inter Icosandrias nullum venenatum fructum invenire est, nisi *Padi* aut *Pruni*, quæ *Laurocerasus* dicitur, hujus fructus feris præcipue lethales sunt, ut Cl. Duhamel *Traité des Arbres* T. I. experimenta testantur. *Geum rivale*, *Caryophyllata aquatica* vulgo, succedanea forte *China* esse

potest, Americani enim Canadenses hujus cortice in febribus intermittentibus cum successu ut plurimum utuntur.

90. Classis Polyandria, pleraque *Multisiliquas* & *Rhoeadeas* Ord. Nat. XXVI. & XXVII. continens, potissimum plantis veneno imbutis constat, ita ut quorundam major copia sumpta damnum ingens & perniciem adferat. Notæ sunt *Aquileja*, *Delphinium*, *Staphisagria*, *Helleborus*, *Peganum*, *Nigella*, *Caltha*, *Bocconia*, *Argemone*, *Papaver*, *Chelidonium*, *Nimphæa* &c. Item omnes *Aconiti* species suspectæ sunt, maxime vero *Aconitum*, *Lycostonum*, & *Napellus* veneno scatent. *Anemone pulsatilla* acerrima, corpori applicata, vesicas generat, *Anemone* vero *hepatica* mitis & interdum utilis invenitur. Tota *Ranuncutorum* familia magnam movet suspicionem, & quidem *Ranunculus sceleratus*, off. *Apium risus*, jam olim a Dioscoride veneno infectus deprehensus est, *Ranunculus flammula* & *alpestris* acerrimi censentur, *Ranunculus* denique *thora* omnium venenatissimus habetur. *Actææ*, Christo-

phoriana vulgo, *baccæ nigrae* valde venenatae, Veteribus etiam suspectae, externe applicatae ad scabiem nonnullis videntur utiles. Plures *Clematidis* species noxiae censentur, præprimis *Vitalba* acerrima & ad inurenda ulcera recepta. *Pæonia* violenter operatur &c. &c.

- * Quod pro dirissimo adhuc inter vegetabilia omnia veneno habitum est, inde plurimis salus per Celeberrimum L.B. Storckium accersita est, Cl. enim Author in præstanti libello de *Aconito Napello*, repetitis in se alio atque alio modo experimentis, plantam hanc variis in morbis ac præprimis in *venerea arthritide* perutilem esse ostendit: id, quod in quacunque alia arthritide, ut ipse mihi fallus est, Cl. Gradiscanus Protomedicus D. Patuna sæpius feliciter est expertus.

91. Ordo Nat. XXVIII. *Luridas* complectitur, hæ in Classe Pentandria continentur, cujus Monogynia monopetala baccifera ut plurimum venenata est.

- * *Atropa*, *belladonna* dictæ, minor radicis quantitas species vanas, duplicata mentis aliena-

nationes, quadruplicata mortem adfert, teste Dioscoride; baccæ ejusdem venenatissimæ dicuntur. Cl. Scopoli in *Flora Carniol.* hæc narrat. Parochus quidam adposuit hospitibus inter cetera hæc baccas, a rustico eodem die collectas. Pulchritudo inusitati fructus impulit ignaros, ut ederent abunde; sed vix aliquot elabuntur horæ, cum domus illa in fatuorum xenodochium commutata est; mente enim capti omnes, & furore perciti, quidam de fenestris præcipientes se dederunt; alii vero ejulatibus vicinas domos terrore implebant omnes; vomitu tamen & usu aceti communis expugnavit deliria sapiens Medicus, qui mihi hunc casum communicavit. Radix, herba & semina *Hyoscyami* tum Veterum tum Recentiorum experimentis stupefacientia deprehensa sunt; immo a solo vapore temulentus Cl. Boerhave redditus est, dum emplastrum pararet; L. B. Van Swieten proprio experimento a comestis seminibus oculorum tenebras, memoriæ lapsam observavit: teste Cl. Crantzio. Verum annon venenum optimi interdum medicamenti N. 71. naturam induit? Id Cl. L. B. Storckius in egregio de *Hyoscyamo* libello evidenter demonstrat, herbamque hanc contra spasmos seu convulsiones, melancholiam, maniam, epilepsiam, id est, comitiales morbum aut caducum perutilem esse docet; in cane enim primum quidem expertus est, extra-

Etum

Etum *Hyoscyami* succum, majori copia haustum, nimia stupefaciendi vi esse prædictum, eosque circiter produxisse effectus, quos acetaria ex ejusdem foliis & radice cum *Cichorio* casu mixtis, a Rinoviensibus Benedictinis 25 Martii Anno 1649. vespri sumpta effecere, ut Wepserus *Tract. de Cicuta aquat.* refert; a minori autem quantitate accepta optimos in se ipso effectus productos sensit. *Strychnos*, *Nux vomica* vulgo, fructus profert, certissimum canibus, felibus, glyribus &c. venenum; quindecim ejusdem granis puellam interceptam Fr. Hoffmannus adfert. Omnes *Solani* species suspicionem moveant, oportet; quidam *Solanum*, amoris pomum dictum, sale pipere & oleo conditum, edunt; cave, ne nimium, majori enim copia sumptum apoplexiam induxisse observatum est. Minima *Daturæ* seu *Stramonii* seminum quantitas ebrietatem velut adfert, nonnihil mediocris fluxam & infidam efficit memoriam, ac de mente deturbat, major denique convulsiones, frigidum sudorem & mortem infert; *Daturæ* quoque expressus succus a solertissimo, laboriosissimo, & publici commodi studiosissimo Storckio deprehensus est, optimum esse remedium contra vertigines, delirationem, amentiam, membrorum tremores, epilepsiam &c. *Capsicum* corrodens valde, *Physalis* vehementissime diuretica seu urinam pellens,

Mirabilis Jalapa, Lycium, Convolvulus purgans est, *Verbascum* temulentos reddit pifces, & occidit, *Cyclamen* fervida & acri natura gaudet, externus ejusdem crebrior & minus noxius est usus, recentes radices contuxæ & applicatæ *scirrhus*, *scrophulas* seu duriores corporis tumores emolliunt, & resolvunt.

92. *Papilionaceæ* Ord. Nat. XXXII. *Diadelphix* sunt Classis, plantæ fere omnes esculentæ, & quidem folia jumentis & pecoribus cedunt, præstantissimum enim pabulum *Medicago, Trifolium, Trigonella, Hedysarum, Lathyrus, Vicia, Lotus* &c. suppeditant; femina vero aut legumina, flatus licet excitent, etiam hominibus grata & esculenta sunt, seu cocta, seu in pulvim contrita, utpote farinacea: hujusmodi sunt, *Faba, Pisum, Phaseolus, Cicer, Lens, &c.*

* *Lotus* abstergit, digerit, dolores lenit, sanguinem effusum & concretum resolvit, vulnera consolidat. Oleum vulgare, in quo *Loti* flores macerati, ad vulnera glutinanda, & ab inflammatione defendenda, puerorum hernias sanandas, tumoresque molliendos & maturandos plurimum commendatur; exsiccata vero ejusdem herba,

vestibus interposita, tineas arcere dicitur; Pulvis *Ornithopi* vel *Ornithopodii* cum albo vino mane jejuno stomacho sumptus, attenuat, pellitque calculos glareaeque, in renibus & vesica consistentes. *Orobi* radix cocta nutrit, semina ejusdem gratissimus est columbis cibus, quo mirum in modum multiplicantur.

93. *Columniferæ* Ord. Nat. XXXVII. *Monodelphiæ* Classis viribus emolliendi, & acria involvendi præditæ sunt; præprimis Ord. *Polyandriæ* ejusdem Classis, ut *Althæa*, *Malva*, *Alcea* &c.; hinc in tussi, stranguria seu urinæ stillicidio, vel ejusdem reddendæ difficultate, nephritide hoc est, lumborum dolore, in colico morbo & excoriatione acria involvendo lubricant, & dolores leniunt, tumores autem duros emolliendo maturant.

* Hinc *Althææ* decoctum in affectionibus renum & vesicæ, ab urinæ acrimonia, a calculo, aut ab arenulis orta, efficax est, urinæ namque sales mucosis suis partibus involvit, & vasculorum meatus abstergit &c. *Malva* in Veterum mensis frequens erat ac pene quotidiana tum cocta, tum cruda in acetariis cum *Lactuca* ad ventrem exonerandum, de qua Martialis L. 10.

Exo-

Exoneraturas ventrem, mihi villica *Malva*
Attulit, & varias, quas habet hortus, opes.

Alcea minus ac præcedentes efficax, ejus
tamen decoctum in alvi torminibus &
epidemicis, ut ajunt, dysenteriis plurimum
commendatur.

94. *Tricoccæ* Ord. Nat. XXXVIII.
pleræque Classis Monoeciæ, & Dioeciæ,
ut *Phylanthus*, *Dalechampia*, *Acalypha*,
Croton, *Jatropha*, *Ricinus*, *Hippoma-*
ne, *Andrachne*, *Mercurialis*, *Cliffortia*,
Clutia &c. veneno infectæ censentur.

* *Semina Ricini* seu *Cataputiæ majoris* ob vim
inflammantem & exurentem acrimoniam,
quemadmodum & *Mercurialis*, tum *Grana*
Tigliæ, quæ *Croton* fert, suspicionem de se
movent, ut *Rajus* observat; idem testatur
verrucae *Mercurialis* succo illitas feliciter
exsiccare. Cortex *Clutiæ Eluteriæ*, vulgo
Cascarillæ cortex, *Chinæ* loco a quibusdam
adhibetur. *Cambogia* vi drastica prædita est,
seu violentissime intestina evacuat. *Euphorbiæ*
semina, *Cataputiæ minoris* dicta, &
lacteus succus acerrimus est, corrodit, &
gangrænam efficit.

95. *Siliquosæ* Ord. Nat. XXXIX.
Classem *Tetradynamiam* constituunt,
aquo-

aquosæ existunt, acres, diureticæ N. 84., & antiscorbuticæ, ut ajunt, quamdiu nempe recentes sunt, exsiccatæ namque vim amittunt; hinc earum virtus in humido & sapido consistere videtur, maxime cum pleræque odore expertes sint. Tales sunt *Lepidium* seu *Nasturtium hortense*, *Cochlearia armoracia*, *Raphanus*, *Sinapis*, *Erisinum barbarea*, *Sisymbrium*, *Eruca* &c., quæ acredine donatæ viscida incidunt, & attenuant, tumoresque oedematosos, seu ex phlegmate, ac pituita provenientes, & frigidos resolvunt. Reliquarum nonnihil debilior sapor & vis.

* *Eruca* diversæ prorsus est, ac *Lactuca*, naturæ; ideoque Veteres in acetariis utramque simul sumebant, ut nimium frigus pari calore temperaretur. *Eruca* non Medicorum tantum, sed & Poetarum testimonio veneris conciliatrix dicitur: de qua *Mart.*

..... Et Venerem revocans *Eruca* morantem.
Ovid. Nec minus *Erucas* jubeo vitare salaces.
Colum. Excitat ad Venerem tardos *Eruca* maritos.

Omnes *Erucae* comestæ partes appetitum excitant, ciborum concoctionem promoven-

vent, viscosam saburram in ventriculo immorantem dissolvunt, & cum urina copiosa expellunt. In *scorbuto* & chronicis, ut vocant, morbis, sive cruda, sive ejusdem succus aut solus aut eum vino sumptus, conducit. In apoplexia præcavenda *Erucae* semina aut *Sinapeos* plurimum laudantur. Quidam sine ulla dubitatione affirmant, senes plurimos mane 20 aut 25 *Erucae* grana masticando per plures annos ab apoplexia, soporiferis affectionibus, & *paralysi*, seu morbo, quo motus & sensus aut totius corporis aut partis alicujus amittitur, immunes perstitisse.

96. *Asperifoliae* Ord. Nat. XLI. adstringendi virtute donatae sunt, *mucilaginosae*, seu acria involvunt, *vulnerariae*, seu vulnera consolidant, *glutinosa*, hoc est citius vulnera sanant, In Classe Pentandria Monogynia continentur, monopetalae & tetraspermæ sunt.

- * Inter has radix *Symphyti* seu *Consolidæ majoris* in pulmonum ulcere, & aliis eorum affectionibus, quæ a tenui, subtili, acri, & calida materia eveniunt, præprimis commendatur; sanguinis screatum & fluorem sistit; renum & vesicæ exulcerationibus medetur, & in dysenteria prodest. Externe admota vulnera conglutinat, dolores compescit,

ossum fracturas consolidat, ad hernias & luxata membra conducit, etenim potenter adstringit. Parkinsonus & Rajus radices recentes minutim concisas & contusas ad podagræ dolores leniendos & serpentina ulcera aut etiam gangrænas compescendas plurimum laudant.

97. *Verticillatæ* Ord. Nat. XLII., Classis vero Didynamix Gymnospermix fragrantæ sunt, flatum, urinam, lac, menstrua, sperma resolvunt, & pellunt, cephalicæ sunt, hoc est caput confirmant, cardiacæ, seu cor corroborant. Earundem efficacia in foliis viget. Fragrantissimæ sunt *Teucrium marum verum*, *Mentha*, *Melissa*, *Origanum majorana*, *Lavandula*, *Thymus*, *Ocimum basilicum*, *Rosmarinus*, *Salvia* &c.

* Rarus *Mari* usus est in officinis, eidem Wedelius virtutem incidendi, attenuandi, aperiendi, digerendi tribuit, lentorem ac torporem pituitæ corrigendi, bilis inertiam emendandi, sanguinis & spirituum motum augendi, speciatim frigidis & humidis affectibus medendi &c. Et Millerus *Marum cephalagix* seu capitis doloribus, & malis nervorum affectionibus

bus conducere scribit, illudque in apoplexia & catarrhis velut egregium medicamentum commendat. Pulvis ejusdem quam maxime *errhinus* est, seu egregie mucum e naribus elicit, sive solus, sive cum *Nicotiana* aut *tabaco* confociatus cerebrum expurgare, roborare, & amissum odoratum restituere dicitur. Interne & externe *Salvia* adhiberi potest ut *cephalica*, & apoplexiæ, *epilepsiæ* N. 91*. *paralysi* N. 95*. membrorumque tremoribus adversans jure merito reputatur, *antihysterica* quoque est, seu muliebri uteri affectionibus medetur, *diuretica* N. 84. *hæmorrhagica* N. 84*. *Salvia* usus, præprimis intra lapides crescentis, ad modum *Theæ* familiarissimus est, per dies plures si jejuno stomacho mane sumatur, vertigines & soporiferos affectus tollit, aliisque cerebri affectionibus medetur, humorum enim motum & circulationem promovet, utilissimus etiam ejusdem potus deprehenditur, in urinæ & menses suppressione, in ventriculi cruditate & imbecillitate, in *flatulenta*, ut ajunt, & colica affectione, ad vermes enecandos, pulmonesque asthmaticorum, seu eorum, qui respirationis difficultate laborant, expediendos.

98. *Dumosæ* Ord. Nat. XLIII. præque Classis Pentandriæ sunt. Uti ipse Ordo, ita & ejusdem efficacia ambigua adhuc existit: quarundam tamen

men nobis notæ sunt vires ; hinc de reliquis quidpiam suspicari possumus .

* *Sambuci vis subnarcotica est ; seu alvum , sudorem , lac , menstrua , sperma pellit . Rhus toxicodendron miro veneno scatet , rarius etiam contrectata nigras , & purulentas cum inflammatione pustulas , brevi per totum corpus diffundendas , excitat . Vim plantæ hujus Celebris Agriculturæ Prof. Patav. Petrus Arduinus expertus est , ipsum audire juvat , Memorie di. osserv. e di sper. sopra la coltura ed usi di varie piante &c. p. 103. En ejusdem verba : Mentre ero Custode del pubblico orto botanico , mi accadde di toccare superficialmente con una sola mano il legno della velenosissima pianta detta Toxicodendron foliis alatis , fructu rhomboideo Dill. Quantunque mi lavassi subito più volte con acqua fregando bene la stessa mano con sabbia e terra , niente mi giovò contro la somma violenza di detta pianta perniciosissima ; poichè il giorno dopo mi s' incominciarono a gonfiare le guancie e poi il collo : e nel terzo giorno eramisi talmente gonfiata la faccia , il collo , le braccia , e le coscie , che perduta avevo quasi la figura d' uomo . Benchè assistito da valenti Medici , mi fossero stati dati molti rimedj con estrazione di sangue , mi fu forza di starmene venti e più giorni così malconcio in letto senza poter aprire gli occhi : e cessata tale dolorosa infiammazione mi si mutò tutta la pelle . Lac ejus-*

ejusdem adhuc magis venenatum est, quin ipse halitus perniciosus advertitur. *Rhamni* species pleræque *Cervispina*, *Frangula* &c. valide purgant. *Baccæ*, quas *Viburnum* seu *Tinus* seu *Opulus*, *Rhus cotinus*, *Evo- nymus*, *Celastrus* generant, vix ab avibus gustantur.

99. *Umbellatæ* Ord. Nat. XLV. ple- ræque Classis Pentandriæ Digyniæ, in siccis locis ortæ odore aromaticæ, sa- pore calefacientes, viribus resolventes, & flatus, urinam, sudorem, menstrua, lac pellentes inveniuntur: & quidem earundem radix & semina efficacia hu- jusmodi, minime vero caudex & fo- lia prædicta sunt. Tales observantur esse *Ferula* seu offic. *Assa foetida*, *Li- gusticum* seu *Levisticum*, *Athamantia* seu offic. *Meum*, *Pastinaca* seu offic. *Opapanax*, *Thordylium* seu offic. *Sesa- li Creticum*, *Angelica*, *Imperatoria*, *Pim- pinella*, *Peucedanum*, *Bubon* seu offic. *Galbanum* & *Petroselinum*, *Macedonicum*, *Carum* seu offic. *Carvi*, *Cuminum*, *Dau- cus*, *Anethum* seu offic. *Foeniculum*, *Laserpitium* seu offic. *Sileris montana*, *Coriandrum*, *Anisum*, *Scandix* &c. In locis vero aquosis natæ venenatæ cen- sen.

sentur, ut *Cicuta aquatica*, *Oenanthe*, *Phellandrium*, *Thapsia*, *Cherophyllum*, *Apium palustre* &c.

* An omnes adhibitæ in officinis *Cicutæ* venenatæ? Celeberr. Storck in egregio suo *de Cicuta* libello propriis experimentis se didisse fatetur, *Cicutam* vulgarem utilem esse in induratis malis *scirrhis* & *scrophulis* N. 91 *, cancro limites ponere, acre *cancrosum*, ut vocant, emendare, ichorem seu faniem in bonum pus convertere, sanare fistulas, ulcera claudere, & consolidare, *catarrhas*, ut dicunt, seu membranulas, oculorum aciem turbantes, quæ primo incipiunt, solvere, earundem progressus impedire, &c. &c. Quod aliorum quoque tractu temporis experimentis & observationibus feliciter comprobatum est.

100. *Stellatæ* Ord. Nat. XLVII. *Tetrandriæ* *Monogyniæ* plures sunt, *diureticæ* N. 84 dicuntur, de quibusdam enim, experientia duce, constat easdem *diureticis* viribus esse præditas; hinc de aliis quoque idem suspicandum.

* *Rubia* a Boerhave in *Hist. Plant. Hort. Lugn. Batav.* plurimum commendatur ad spissum mucum, glareasque renibus & vesicæ inhærentes resolvendas, & folias

amandandas, tum calculos nonnunquam pellendos. Radix ejusdem crassos humores potenter resolvit, contumacibus hepatis, lienis, uterique obstructionibus apprimè opitulatur, & coagulatum sanguinem dissolvit. Aptissima quoque est ad menses, ut dicitur, ciendos, atque in hunc usum ab omnibus adhibetur Medicis. *Asperula* densos ac tenaces humores incidit, attenuat, discutit, & levi, qua donatur, adstringendi vi nimis laxas viscerum fibras firmat, & roborat.

101. *Compositæ* Ord. Nat. XLIX. Classem Syngenefiam constituunt, in medicina receptissimæ sunt, & ut plurimum amaræ.

Inter Compositas maxime amaræ *Arctii* seu *Bardanæ* semina, *Hieracium* *Auricula muris* offic., *Cichorium*, *Carduus marianæ*, *Carlina*, *Cnicus* seu *Carduus benedictus* offic. *Eupatorium*, *Tanacetum*, *Santolina*, *Artemisia Abrotanum*, *Artemisia Absinthium*, *Tussilago*, *Achillea ageratum*, *Matricaria Chamomilla*, *Verbesina acmella*, *Anthemis* seu *Cotula foetida*. *Arctii* *Bardanæ*, & *Leontodon Taraxaci* radices diuretici; *Carlinae* vero & *Tussilaginis petasitidis* radices sudorificæ N. 84*; *Cichorii*, *Centaurea beben* tonica seu corroborantes; *Scorzoneræ* denique radix alexiteria seu fragrantem ha-

halitum reddit, ejusdem succus mane, jejuna
 no stomacho sumptus ab iis, in quibus veneni
 suspicio locum habet, a Boerhavio in *Hist.*
Plant. Horti Lugduno Batavi magnopere
 commendatur, magnis quoque eam laudi-
 bus extollit adversus hypochondriacas af-
 fectiones, viscerumque obstructions, si
 eidem tantum tusæ, *hordei* decoctum su-
 perfundatur. Nullæ Compositarum vene-
 no scatent, nisi forte aliquæ lacteo succo
 in umbroso loco natæ, ut *Doronicum*,
Charthamus &c.

102. *Coniferæ* Ord. Nat. Lī. Mo-
 nadelphix Classis, Monoecix & Dioe-
 cix resiniferæ sunt; hinc semper viren-
 tes, calidæ, stimulant, & *diuretix*.

* Galbuli seu *Cupressi* fructus egregia ad-
 stringendi vi præditi deprehensi sunt; hinc
 in dysenteria, alvi fluxibus, hæmorrhagiis
 N. 88*. eorundem pulveres optimum præ-
 stant effectum; iisdem febres quoque fu-
 gandi virtus tribuitur. *Juniperi* baccae egre-
 gie resolvunt, attenuant, discutiunt, ca-
 lesfaciunt, abstergunt, roborant; hinc fri-
 gido ventriculo profunt, pituitam, quæ
 in illo coit, digerunt, flatus inde ortos
 discutunt, colicos dolores sedant, cibo-
 rum concoctionem juvant, urinam promo-
 vent, viscidum mucum renibus aut vesi-
 cæ inhærentem abstergunt, & expellunt,

calculos & arenulas hoc muco irretitas, in iisque partibus morantes extrudunt. Verum cum calefaciant, sanguinis æstum augeant, & partium solidarum ardorem promoveant, minime adhibendæ sunt, nisi rite prius perspectum sit, viscera ab omni æstu & inflammatione libera esse. Ejusdem lignum minutim concisum & accensum ob suavem odorem commendatur, aptumque fit ad aerem, pravis halitibus inquinatum, emendandum, & molestos ac noxios odores arcendos.

103. Classis ultima Cryptogamia suspecta vegetabilia complectitur. Vix ullæ *Filices* in cibum cedunt, male olent, vires tamen medicas obtinent.

* *Equiseti* vis adstringens est, in sanguinis & alvi profluvio, cruento mictu, & in aquosis anginis efficax est: recens contusum illico vulnerum sanguinem cohibet. *Adianthi* *Capilli veneris* offic. vis corroborans, diuretica. *Asplenii* seu *Caterach* herbæ vis roborans, diuretica, & ad depellendum ex renibus sabulum apta. *Asplenii* *Rutæ murariæ* offic. vis corroborans. *Asplenii* *Scolopendriæ* offic. vis adstringens, & exsiccans. *Polypodii* radix dulcis, subnauseosa alvum leniter movet &c.

104. *Musci* vix exculenti, haud gratum spargunt odorem. *Algæ* vix quoque

que esculentæ ; plures purgant , hinc suspectæ . Ex *Fungis* plerique veneno pollent , licet cocti & assati sæpe mitescant . Ipsi *Veteres Fungorum* naturam perspectam habuere , teste Dioscoride & Plinio ; is ancipiti hoc cibo integras familias periisse , asserit , ipsumque Claudium Cæsarem *Boleto* peremptum .

* *Licopodium repens* ad calculos in renibus attenuandos , & urinam ciendam juxta *Trogum* valet . *Lichen Muscus Islandicus* coctione mitescit , leniter alvum movet , & *hætica* febri laborantibus utilis invenitur . *Fungi* recenter collecti , in partes minutissimas contusi , & in vase probe obturato asservati in liquamen abeunt , quo *Cimices* , inunctis eorundem receptaculis , feliciter extirpari dicuntur .

105. Plantæ florem , nectario N. 14. a petalis distincto instructum , obtinentes , ut plurimum veneno scatent .

* Distincta nectaria observantur in *Aconito* , *Aquilegia* , *Nigella* , *Parnassia* , *Epimedio* , *Clutia* , *Kiggellaria* , *Hyacintho* , *Stapelia* , *Asclepiade* , *Mirabili* , *Nerio* , *Narcisso* , *Distamno* , *Meliantho* , *Hypechoo* , *Zigophyllo* ,

Impatiente, *Monotropa*, *Helleboro*; hinc omnes veneno infectæ.

106. *Lactescentes* quoque plantæ præque venenatæ. Hujusmodi sunt plures Ord. Nat. XXX., & quidem aliæ Classis Pentandriæ, ut *Rauwolfia*, *Cerbera*, *Thevetia*, *Plumeria*, *Tabernæmontana*, *Periploca*, *Apocynum*, *Cynanchum*, *Caropeja*, *Asclepias*; aliæ Classis Polyandriæ Ord. Nat. XXVII. *Papaver*, *Argemone*, *Chelidonium*, *Bocconia*, *Sanguinaria*. Accedunt quædam *Tricoccæ* Ord. Nat. XXXVIII. *Euphorbia*, *Cambogia*, *Dalechampia*, *Jatropha*. Item *Rhus*, *Ficus*, *Acer*, *Melia*, & *Agarici* quidam. Semiflosculosæ *Tournefortii* licet lactescentes minus aut vix veneno turgent, ut *Prenanthes*, *Chondrilla*, *Hieracium*, *Crepis*, *Hypochoeris*, *Picris*, *Hyoseris*, *Leontodon*, *Tragopogon*, *Lactuca*, excepta *Lactuca sylvestris* flavo succo, & viroso odore, quæ valde venenata invenitur. Plantæ igitur lactescentes, nisi experientia contrarium edoceat, suspectæ sint, oportet.

Lacteus Ficus humor acris est & saponis instar; hinc *cosmeticus*, ut vocant, seu faciei cuticulam, & carie obduetos dentes mundat. Dioscorides hocce lac vulnere a scorpione vel cane rabido affectis commendat; Plinius vero iis, qui crabronum, vesparum, similiumque venenato morfu afflicti sunt. *Lobebiam*, ex qua, si frangatur, copiose lacteus succus exillat, Kalmius in *Act. Acad. Scient. Holmens.* contra veneream luem mirum in modum extollit. Arcanum diu fuerat *Canadensium*, a chiliarcha Johnson detectum, & ab eodem communicatum Kalmio. Observare convenit, ait Kalmius, quod quemadmodum incolæ horum locorum subito hac peste corripiantur, ita illam quoque extemplo profligare possunt; imo vero, si usque adeo prævaluisset morbus, ut agrotus inde velut semiputris foetorem spargeret, qui alios longe arceret, tamen brevi sanaretur eo successu, ut nunquam in morbum recideret, nisi voluntario ausu eundem sibi denuo contraxerit Sumuntur radices herbarum quatuor, sex, vel plurium, prout violentia morbi id exegerit, easque lavant. Alii recentes radices commendabant, alii vero siccitas malebant Coquantur deinceps radices in vase quocunque Matutinis horis propinatur agroto, decocti quantum unquam placuerit, aut ipse potare possit, eodemque per reliquum diei pro potu ordinario utetur, inde, dum alvum ad hypercatharsin ciere coeperit, ut sæpe fit, extenuandum

est decoctum donec id recte ferre poterit, quæ dum aguntur, ab ebrietate omnino abstinendum est. Potissimum autem tenuiori victu vescatur, ac ipso quidem ex regno vegetabili desumpto, tametsi carne quoque ægotantem interdum ali liceat. Altero die, itemque tertio pergit æger eadem via decoctum non solum bibens, sed quotidie eodem etiam se totum, & præcipue partes læsas lavans; continuabit dietam isthanc per quatuordecim dies, aut septimanas tres, ex quibus morbum haud raro superatum experiri contingit. Idem omnino de Ceanothi seu Celastri radicibus Kalmius narrat.



C A P U T V.

*De plantarum tum liquidis tum
concretis succis, eorumque
viribus.*

107.



Utritium succum exa-
minandum minime
fumo, qualis in o-
mnibus omnino ve-
getabilibus adsit,
necesse est, sed pe-

culiare fluidum, quale ex quibusdam
plantis vel ultro, vel facto vulnere,
guttatim defluit, aut coctione, vel
quacunque ratione exprimitur, spe-
cialique virtute donatum est. Succus
hic vel flammam concipit, & a spiri-
tu vini rectificatissimo, ut appellatur,
ex toto dissolvitur, *Resina* dictus; vel
igne vix ardet, & aqua perfecte sol-
vitur, *Gummi* vocatus; vel partim
aqua partim spiritu vini penitus divi-
ditur, *Gummi-resina* nominatus; vel
ob colorem, quempiam, quo tingit,
commendatur.

108. Re-

103. Resina ex acido & oleo quodam æthereo præprimis generata, aut liquida & minus solida est, *Balsamum* que appellatur; aut magis solida & concreta *Resina* proprie nuncupata. *Balsamum* succus est vegetabilium liquidus aut minus solidus, fragrans; tenax, pinguis, *diureticus* N. 84., *vulnerarius* N. 96., a putredine fervans. Hujusmodi sunt *Opobalsamum* seu *Mechæ balsamum* aut *Judaicum* vel *Syriacum*, quod in Aegypto, Judæa, & maxime in Arabia felice ex planta, *Gilead* vulgo dicta, aut inciso cortice, quod optimum & rarissimum, aut coctione minus efficax & minus fragrans extrahitur. *Balsamum Brasiliense* *Copaivæ* ex arbore, *Copahu* vel *Copaiba* appellata, in Brasilia, insulis Maranhon, & vicinis Antillis, inflicto vulnere, vel coctione obtinetur. *Balsamum Peruvianum* ex arbore, *Hoitziloxilt* ab indigenis vocata, vel scisso trunco, optimum & albo flavum acquiritur, *Balsamum incisionis* vulgo dictum; vel abscissis ramorum fastigiis, & apposis vasculis excipitur, album primo, dein rubrum,

prum, & solis radiis exsiccatum, *durum* propterea & *siccum* appellatum; vel denique coctione fuscum aut nigrum exprimitur, & Coctionis Balsamum nominari solet. Balsamum Tolutanum in Americæ meridionalis Provincia Tolu prope Carthagenam ex arbore *Toluisera*, illato vulnere, extrahitur colore aureo, & *Citri* odore.

* *Copaiva* non tantum externe applicatum sed & interne exhibitum ad sananda vulnera præprimis nervorum valet, ea enim mundat & consolidat; dyssenteriam aliosque alvi fluxus sistit; album fluorem, & guttatim spermatis fluxum, seu gonorrhæam, ut ajunt, coercet; renes, ureteres, & vesicam arenulis, muco, aut pure obstructos, relaxatos, vel ulcerosos mirum quantum detergit, firmat, sanat; urinam ciet, ejus ardores extinguit, contentaque cruenta, foeda, & purulenta præ omnibus aliis balsamis efficaciter purgat. *Peruvianum* & *Tolutanum* ejusdem sunt efficaciae: a quibusdam *Tolutanum* anteponitur, & cum nulla præditum sit acrimonia, in potionibus solutum facilius ab ægrotantibus sumitur; præprimis ad vulnera a putredine defendenda & consolidanda, in articulorum vulneribus, sectionibus, & nervorum punctibus celebratur. Apud Anglos frequen-

quentior est ejusdem usus, præcipue in phthisi, seu pulmonum aliisque internis ulceribus.

109. Inter fluidas resinas *Terebinthina* quoque numeratur, præprimis *Cyprina*, quæ in Insula Chio ex *Pistacia* seu *Terebintho* Tourn., facto vulnere, extrahitur: si genuina est, inter balsama collocanda est, iisdem namque pollet virtutibus; at plerumque *terebinthinis* ex *Pino*, *Larice*, *Abiete* natis adulterari solet. Kæmpferus *Perficæ* mentionem facit, *Cyprinæ* haud dissimilis. *Hujus Terebinthinæ* apud Orientales populos usus, inquit Kæmpferus, non est alius, quam ut pro masticatorio serviat, quo mulierculæ citra Indum maxillas sine intermissione exercent, ita ut ægre, si ei adsueverint carere hac resina possint. Dicitur lympham proliciendo catarrhos tollere, albos & firmos dentes reddere, appetitum excitare, & gratum ori conciliare halitum.

* Item alia vocatur *Terebinthina Vereta*, quæ ex *Larice* autumnii tempore vel sponte, vel illato vulnere, aquæ instar limpida fluit.

luit; at brevi flavescit, & tractu temporis crassescit. In pulmonum, renum, vesicæ, ceterorumque viscerum exulcerationibus utiliter adhibetur, in gonorrhæa & fluore albo magni est usus. Alia *Abietina* ex *Abiete* profluens, priore pellucidior, minus lenta & tenax, odore magis grata, & amara magis, iisdem ac prior præstat viribus. Alia denique communis ex aliis *Pini* speciebus, præsertim *Pino sylvestri*, & *Pino tæda* prolecta; hæc ad medicos usus raro adhibetur, sed ad varia potius artificia inservit, ex ea enim *pix* lenta, *pix* navalis &c. præparantur.

110. *Resina* proprie dicta flammam concipit, spiritu vini vel oleis essentialibus, ut vocant, solvitur, sicca, solida, pellucida substantia est, digitis facile comminuitur, ad ignem mollis fit. Hujus species sunt *Resina animi orientalis*, ex *Aethiopia* olim adferebatur, nunc admodum rara; occidentalis albo citrina, fragrans, in *America* ex *Hymenæa*, *Courbaril* vulgo dicta, obtinetur, contra nervorum morbos valet. *Resina Elemi* alia genuina, alia spuria: genuina in *Aethiopia* ex specie quadam *Oleæ sylvestris*, ut fertur, desumitur, subflava est,

est, aut albo viridis, nonnihil mollis, odore *Foeniculi*; spuria in America ex *Amyride elemifera*, vulgo *Icicariba* vocata, stillat, albo flava est, vel albo viridis, pellucida, nonnihil mollis, pinguis, odora, diuretica, vulneraria, mundans. *Resina Caranna* substantia tenax, nigro viridis, ex arbore, ab Hernandez *Insania Caragna*, a Mexicanis vero *Hahelicoca* nuncupata, excipitur, resolvens est, & stomacho prodest: *Resina Benzoes* in Regno Siam & Insulis Java, Sumatra, & in Virginia ex arbore *Belzof*, a Linnæo inter *Lauros* relata, ultro, & inciso trunco, guttatim prodit: substantia est sicca, fragilis, fusco flavescent, ad laxas partes roborandas inservit. *Resina Copal* dura, splendicans, pellucida, coloris citrini, in nova Hispania ex arbore, quam Linnæus *Rhus copallinum* vocat, elicitor, ad sandaracham seu vernices, ut vulgo ajunt, conficiendas optima est.

III. *Olibanum* aut *Thus* ex Aethiopia & Arabia optimum adfertur, ex

ar-

arbore incisa, quam Linnæus *Juniperum thuriferam* vocat, aquiritur, candidans si sit, pellucidum, purum, nitidum, siccum, maxime probatur. Non solum Græcis & Arabibus, sed omnibus fere gentibus, & remotissimis etiam temporibus thus cognitum fuit, celeberrimusque ejus usus & frequentissimus in Sacris. Admischentur sæpe Olibano guttæ resinosæ exsiccatæ, ultro ex *Pino* effluentes. Resina *Sandaracha* ex *Junipero vulgari* in arborem elata ultro aut facto vulnere habetur, est substantia flavescens, pellucida, splendicans.

* *Sandaracha* calefaciens est, diuretica, externe admota sanguinem sistit, vulnera & putrida ulcera sanat, artuum dolores demulcet, nervorum resolutionibus, a frigidis humoribus ortis, opitulatur; ejusdem autem suffitus ad catarrhos commendatur.

112. Resina *Storax* fusci coloris, dulcis & nonnihil acris saporis, admota flamma, ardet, fragrantissimumque emittit odorem: *Calamita* quoque vocatur, quod olim ex Pamphylia in arundinibus adveheretur; nunc in Gal-

lia pariter ex arbore *Styrace folio mali cotonei* defluit. Resina *Tacamahaca* substantia est jam nonnihil flava, jam nonnihil viridis, & nonnihil pellucida, suaveolens *Lavandulæ* instar. In Mexico & Madagascar ultro, & facto vulnere, ex arbore, *Tacamahaca* dicta, inter *Populi* species numerata, extrahitur.

* Ob suaveolentem fragrantiam *Storax* ad cerebrum corroborandum, animales spiritus recreandos, inordinatosque eorum motus compescendos commendatur. *Tacamahacæ* rarus internus, frequentissimus autem externus est usus ad quoscumque externarum partium compescendos dolores, præsertim si a frigidis, quæ flatus excitant, humoribus proveniant, tumores enim resolvit & maturat; fluxiones quoque in oculos, aut alias faciei partes, linteo excepta, & emplastri modo temporibus aut post aures applicata, aut suffitu naribus attracta, revellit.

113. *Mastix* resina pellucida, aromatica, corroborans in catarrhis mucosis, ventriculi laxitate, fluore albo utilis est: ex *Pistacia Lentisco* maxime in Chio maris Aegæi Insula colligitur. Sanguis *Draconis* substantia resinosa est arboris,

Pte-

Pterocarpus Draco nuncupata, profunde rubra, dura, insipida, odore expers adstringentibus pollet viribus; hinc ad sanguinis profluvium & dysenteriam inservit. *Ladanum* in Creta, aliisque Aegæi maris insulis ex *Cisto ladanifera* exprimitur: odore grato est, colore rufo nigrescente. Externe adhibitum emollic, attenuat & resolvit; interne vero adstringit, roborat, & dolores sedat. *Resina Hederæ* arida, dura, compacta, colore fusco & subrubro, sapore subacri & leviter adstringente, odore expers: ex *arborea Hederæ* defluit, eidem balsamina virtus detergendi & consolidandi vulnera tribuitur.

* Chienfes tam viri quam feminae & pueri *Masticem* fere semper in ore habere dicuntur, ad roborandos dentes & gingivas, nec non ad oris halitum emendandum: hanc quoque masticando surditatem tolli volunt, materia enim, meatus a tympani cavo ad palatum obstruens, prolicitur. Item mulieres Græcæ globos ex *Ladano* aut solo aut cum ambra permixto confectos manibus oblectamenti causa sæpe gestant, & odorantur.

114. *Camphoram* quidam inter resinas constituunt; spiritu quidem vini & oleo solvitur; flammam concipit, ac resinarum principia ex ea haberi nequeunt; spiritu nitri & aqua regia evadit fluida; spiritu autem salis sublimis abit. Gummi aut sal minime dicenda est, aqua enim ex toto haud solvitur, & accensa flagrat. Corpus igitur specificum esse videtur, quod aeri expositum, totum fere avolat, aqua frigida non solvitur, calida vero in oleum abit; facile accenditur; lucidissimam concipit flammam; in aqua etiam & nive comburitur &c. Duplex est, alia Japonensis; ex Japonia occidentali & proximis insulis in Hollandiam rudis adhuc allata; ibique purgata; postea per totam Europam diffunditur. Ex *Caphura* specie *Lauri* obtinetur: Rusticorum opus est, ait Kæmpferus in Provincia *Satsuma* & Insulis *Gotho*, qui radices & ligna minutim concisa cum affusa aqua coquunt in vesica ferrea, imposito-que capitello fictili, amplo, rostrato, & stramine repleto. Alia est Borneensis & Sumatrana ex arbore, vulgo *Sladi*

nominata, exiguarum instar guttarum acquiritur, pretiosissima hæc est, nec apud nos datur, ipsi Japones eam summi faciunt, ita ut pro una Borneensis libra a 100 usque ad 600 libras propriæ largiantur. Ex aliis pluribus plantis camphora elici potest, ex *Lauro* nempe *Cinnamomo*, *Kæmpferia zedoaria*, *Mentha*, *Apluda* seu *Schoenantho*, *Artemisia* seu *Abrotano*, *Achillea* seu *Millefolio*, *Bellide*, *Amomo*, *Cardamomo*, *Junipero*, regionum tamen calidarum: ex nostris quoque quibusdam, ut *Rosmarino*, *Salvia*, *Hyssopo*, *Lavandula*, *Hormino*, *Erino*, *Agerato*, *Origano* seu *Majorana*, *Thymo* &c. extrahi potest.

* Vi admodum calefaciente pollet camphora, stimulante, penetrante, resolvente, pellente &c. Attamen plures eam frigidam esse asserunt, licet calidissimas ejusvires gustu explorare valent. Cum os totum excalefaciat, & siccet, non est, quod credam, tantillum quidem frigiditatis in camphora reperiri, ait Matthiolus. Ea forte perperam vulgari ducti opinione, quod camphora mares sobolis procreandæ impotentes reddat, libidinemque vel solo olfactu extinguat, juxta illud

Camphora per nares castrat odore mares.

At constat experientia eos, qui camphoræ depurandæ operam navant, copiosa prole donatos esse, ut Breynius testatur.

115, *Gummi* est succus vegetabilium concretus, pellucidus, ex modica phlogisti portione, terra; aqua, & sale compositus: ex toto aqua solvitur, eamque spissiore & glutinosam reddit, rupto cortice ex plantis haud aromaticis stillat, ex *Ceraso* videlicet, *Malo*, *Amygdalo persica*, *Pruno* &c., & vulgare hujusmodi *Gummi* dicitur. Aliud est *Arabicum* albo flavum, pellucidum, insipidum odore carens, in Arabia petrosa & in Aegypto ex *Mimosa* seu *Acacia vera* fluit. Aliud est *Senega* dictum, vel *Senica* offic., ex Provincia Nigritarum juxta fluvium Senega sita majore copia adfertur. Iisdem hæ tres species virtutibus gaudent, Arabicum tamen ceteris anteponitur, cum ejus vires magis cognitæ sint, in faucium enim affectionibus, raucitate, tussi, falsis catarrhis, hæmo-

ptisi

ptlisi seu sanguinis sputo, ex ruptis pulmonum vasculis orto, stranguria, & urinæ ardore utiliter adhibetur, etenim mucosis partibus acrem limpham demulcet, si tenuior est, spissam reddit, vehementiorem humorum motum sedat. Reliquæ duæ species ad mechanicos potius usus reservantur. Gummi *Tragacantha* in Asia & Græcia ex *Astragalo* *Tragacantha* ultro & facto vulnere stillat succi instar albi aut fusci, levis insipidi, sine odore, sumptum humectat, refrigerat, colicos dolores lenit &c.

116. *Manna*, Gummi species, non solum ex *Fraxino* & *Orno*, sed etiam interdum ex *Larice*, *Pino*, *Abiete*, *Quercu*, *Junipero*, *Acere*, *Olea*, *Ficu* &c. exsudat. Ob diversam firmitatis, natalis loci, formæ, arborum rationem diversa est *Manna*: alia liquida mellis instar aut solida, alia orientalis *Perfica*, *Arabica*, occidentalis *Calabra*, *Brigantiaca*, alia in grana conereta, in massulas seu grumos &c. alia cedrina, de qua Hippocrates, Galenus,

alia quercina, de qua Theophrastus, alia laricea, quæ in Brigantii territorio invenitur, alia fraxinea, quæ inter tot maxime in usu est.

* In Calabria potissimum ex duabus *Fraxini* speciebus, *Fraxino* nempe & *Orno* Manna sponte vel læsa arbore æstivis mensibus fuit. A 20. Junii videlicet usque ad Julii finem ex trunco & majoribus ramis post meridiem usque ad vesperam Manna limpidi instar liquoris ultro stillat, & sensim in grumos concrescit, indurescit, & albescit. Elapso Julio tum *Fraxini* tum *Orni* cortices usque ad lignum incidere opus est, ut effluat, & in crassiores massulas concrescat. Ipsa harum arborum folia Julio & Augusto circa meridiem pellucidum humorem exsudent, qui aeris æstu exsiccat, & albicantia granula milii instar constituit, ita ut interdum *Fraxini* folia albida, & veluti nive cooperta appareant. Frequentissimus est Mannæ usus ad alvum blande solvendum, *serosos*, ut ajunt, humores subducendos, & spissam ac glutinosam primarum viarum *suburram*, ut nominant, eliminandam.

117. *Gummi resina* succus est vegetabilium ex gummosa & resinosa substantia arcte invicem, & diversa ratio.

tionem unita: hujusmodi est *Gummi Ammoniacum*, sic dictum, quod juxta Ammonis templum in Lybia ex planta quadam umbellifera desumeretur: jam a Veteribus in genuinum seu *thrausma*, & minus probum *phyrana* distinguebatur. Asthmaticos, Hypochondriacos & Hystericas valde sublevat. *Assa foetida* est gummi resina, in Persia præprimis ex incisa radice *Ferulæ*, quam arborem Persæ *Hingiseh* vocant, fluens, partim flava partim rubra, aut nonnihil fusca, & pinguis. Recentis foetor est vehementissimus, ita ut unica drachma, teste Kæmpferio, majorem exhalet foetorem, quam centum vetustioris libræ, qualem Europa recipit. Nihilominus tamen apud Persas, & Indos fere omnes præsertim Baneanes gratissimum est ciborum condimentum, adeo ut Deorum cibum appellent. Viribus præcedentis donata est. *Euphorbium* gummiresina, in guttas, vel lacrymas, ut vocant, concreta pallidas vel flavescentes, saporis acerrimi, exurentis, nauseosi, odoris expers, ex *Euphorbio* planta inprimis

in Affrica effluit. *Galbanum* gummirefina, quam planta *Bubon*, *Ferula* dicta, largitur, flavescent, pinguis, amara, acer, graveolens, callefaciendi & resolvendi virtute pollet, ad suppressos menses, ut dicunt, restituendos, album fluorem curandum, obstructions tollendas, & ad hystericum levandum malum apta est.

118. *Gummigotta* succus est resinoso gummosus, ex arbore *Cambogia*, quam Orientales *Carcapulli* aut *Kanna-Goraka*, ejus vero fructum *Coddam-pulli* nominant, in Regno Siamensi, China &c. exsudans. Inter optima *hydrago-ga purgantia*, ut dicunt, reputatur, hinc hydropicis valde utilis: pictoribus quoque in usu est. *Opopanax* gummirefina pisi magnitudinem æquat, externe rufi vel crocei, interne albi coloris est; pinguis, fragilis, amara, graveolens, ex *Pastinaca* fluit, ad viscosa incidenda, languida stimulanda, & inordinatos spirituum motus compescendos &c. efficax est. *Sarcocolla* resinoso gumminosa substantia in Aethiopia, Persia,

Arabia ex *Penæa*, ut Linnæus vult, stillat, rufescens est, subamara, haud odora, purgans, *vulneraria*. Omnes maceratam in lacte asinino vel muliebri ad *ophthalmias* seu oculorum fluxiones commendant, lymphæ enim acrimoniam demulcendo compescit. *Bdellium* gummi resina, pinguis, tenax, ceræ instar, ferrugineo nigricante colore, *Myrrhæ* saporem & odorem æmulatur, in Arabia, Media, & India ex arbore nobis adhuc ignota defluit. Samuel Dale putat, esse arborem *lactescentem aculeatam foliis quernis*. *Sagapenum* gummi resina rufescens, juxta Dioscoridem ex *ferulacea* quadam planta in Media defluit, amara, mordax, *emmenagoga* N. 84* &c. *Scammonium* gummi resina ex *Convolvulo Syriaco* exstillat, amara, purgans, sanguinem solvens. *Mirrha*, Arabis *Mur* aut *Mor* dicta, resinogummosa materia, rufa, flava, aut ferruginea, amara, aromatica in morbis ventriculi, intestinorum, uteri &c. utilis, insignis enim in ea vis resolvendi viget. Ex qua arbore
fluat?

fluat? An nostra eadem ac Veterum?
Nihil certi traditur.

119. *Aloes Hepatica* densa, arida, opaca, ad hepatis colorem accedens, sapore amaro & adstringente, graviorique odore. *Aloes Succotrina* purissima, rufa, vel crocea, nitens, & pel lucida, sapore amaro, adstringente, nonnihil aromatico, odore gravi, nonnihil tamen grato. *Aloes Caballina* ponderosa, densa, nigra, terra arenulisque plena, amarissima, nauseosa, virus olens. Aloes ab omni ævo medicamentum fuit tum ad internum tum ad externum usum commendatissimum. Veteres viscera purgandi & roborandi, vulnera & ulcera glutinandi, & sanguinis profluvia sistendi huic succo facultatem tribuerunt. Substantia est juxta Gèoffroy salinogummosa & resinosa. *Opium* succus resinofus & gummosus, gravis, densus, lentus, fulvo nigricans, odore viroso, sapore amaro acri. In diversis Asiæ Provinciis agri albo *Papavere* conferuntur; ubi capitula producit, leviter inciduntur,

tur, & guttæ aliquot humoris lactei
effluunt, quæ sensim, ut concrefcunt,
colliguntur. Teste Tournefortio, ma-
ior Opii quantitas ex contusis & ex-
pressis *Papaverum* capitibus extrahitur.
Acaciæ succus gummosus ex *Acaciæ*
immaturis filiquis, aqua perfusis, &
contusis exprimitur, tum coctione spis-
sus redditur: adstringit, humorum a-
crimoniam demulcet, & solidas par-
tes roborat, ac firmat. *Hypocistidis* suc-
cus iisdem virtutibus pollet. *Catechu*
succus gummosus & resinofus, indu-
ratus, rufo nigricans, sapore adstrin-
gente primum, dein dulciore & gra-
to, odoris expers: planta, ex qua ex-
traitur, adhuc incerta est. Plura de
hoc Cl. de Jussieu *Mémoire de l'Aca-*
démie de Paris A. 1720.

120. Alii præterea succi, arte po-
tissimum ex vegetabilibus quibusdam
extracti, restant. Ut de saccharo aliis-
que paucis taceam, eos breviter attin-
gam, qui ad laneam, lineam, & fe-
ricam supellectilem tingendam præpri-
mis inferviunt. Notissima sunt vegeta-
bilia,

bilia, nobis ad hunc usum ex remotissimis Regionibus suppeditata. *Cæsalpinia*, Brasiliense scilicet, *Brasiletta*, *Sappan* & *Fernambuci* ligna in tinctoria, ut vulgo ajunt, arte decantata sunt. Medullare *Santali* lignum colorem præbet flavum, cæruleum *Galega*, *Lawsonia* radix rubrum, ejusdem folia luteum, violaceum *Hæmatoxylon Campechianum*, quo fundamenti instar panni, alio insuper & vel maxime nigro tingendi colore, imbuuntur. *Carthami* in Aegypto crescentis corollæ acido præparatæ nitidissimum colorem roseum serico inducunt. *Indigofera* cæruleus succus, & *Bixa orellana* ruber notissimus est.

* An in Indiis tantum non vero nostris in Regionibus *Indigofera* tam necessaria colorum infectoribus feliciter crescit? Profecto Cl. Petrus Arduinus A. 1764. & 65. optimo cum successu plantam hanc Patavii excoluit, egregiumque inde succum extraxit. Operæ pretium est elegantissimum æque & utilissimum ejusdem opus consulere. *Memorie di osservazioni e di sperienze sopra la coltura e gli usi di varie Piante, che servono, o che servir possono*

utilmente alla Tintura, all' Economia, all' Agricoltura ec.

121. In nostris quoque Regionibus plantæ haud paucæ vel ultro crescunt, vel etiam cultura indigent, ex quibus succus ad laneam, lineam, vel sericam materiam colore vel rubro, vel cæruleo, vel luteo, vel viridi, vel violaceo, vel nigricante inficiendam inferviens, arte extrahitur. Rubrum colorem *Rubiæ* radices subministrant, frequentissimo in usu apud infectores, seu *tinctorum*, ut vocant; apud nos quoque felici cum eventu hæc planta excoli potest: modum colendi, & colorem parandi tradunt. Duhamel *Eléments d'Agriculture T. II.*, & Petrus Arduinus *Memorie d'osservazioni* ec. *Asperulæ* radix *Rubiæ* loco, antequam caulem exerat, a pluribus sumitur. *Galii* quoque radix rubro tingit colore, non minus ineleganti rufo *Rhois cotini* radicum cortex. *Tormentillæ* radix coria rubro colore imbuit. Purpureum *Origani vulgaris* extremitates præbent, tum *Alga Lichen*, videlicet *Saxatilis*, *Tartareus*, & *Rocella*.

* Insecta quædam in vegetabilibus quoque deprehenduntur, ex quibus elegantes rubri colores præparantur, uti ex femellis uterum ferentibus & exsiccatis *Quercus Illicis*. Alia hujusmodi insecta ad radices *Scleranthi perennis* inveniuntur, in *Hieracio Pilosella*, in radicibus *Arbuti uvæ ursi*, & in ramulis *Ulni campensis*.

122. Nitidum cæruleum colorem, & si cum flavo misceatur, elegantem viridem *Isatis*, *Guado* vulgo, supeditat, non tam in Gallia, Anglia, Hetruria &c. planta hæc utiliter crescit, sed in nostro quoque Goritienfi agro læte nasceretur, ut Perill. D. Kappus de Pichelstein S. C. R. & A. M. in inclito hoc Comitatu a consiliis feliciter expertus est. Cum igitur tinctoriæ, ut ajunt, artis periti apud nos sint, maxime postquam hoc anno in Canalenfi Illustriss. D. C. Michaelis a Rabatta ditione plurima textoria præla erecta sunt, quibus venustis distincta coloribus & cannabina & linea optimæ notæ tela, institutore ac directore solertissimo D. Joann. Bapt. Fabricio, textitur, ne ex Hetruria pernecessarium hujus herbæ succum petere cogantur,

pro-

profecto expediret, si apud nos quoque *Isatis* coleretur, indeque succus exprimeretur. Tum colendi modum, tum succum extrahendi tradit *Savary Dictionnaire Universel de Commerce T. II.*, *Ray Hist. Plant. T. I.*, *Duhamel Eléments d'Agriculture T. II.*, *Arduinus Memorie d'osservazioni &c. &c.*

* *Fraxini* cortex cæruleam efficere aquam dicitur, eundem colorem *Croton* inducit, a salibus tamen facile mutandum. *Delphinii consolida*, & *Campanula rotundifolia* corollæ cæruleum præbent succum, pictoribus usui futurum.

123. *Reseda Luteola* præprimis, in aqua cum alumine cocta, pulcherrimum dat flavum colorem, saturationem in loco sicco & levi nata; si cum cæruleo misceatur, viridem exhibet; hinc infectoribus frequentissimo in usu est. Adhuc virides *Rhamni cathartici* baccæ exsiccatæ, dein aqua & aluminae maceratæ & tritæ præstantissimum croceum suppeditant colorem, ejusdem quoque cortex, at minus elegantem

luteum colorem largitur. *Rhois coriariae*, & *cotini* cortices flavo pannos colore inficiunt. *Radix Berberis* lixivio macerata lanas, cortex coria tingit. Item *Rhamni frangulae*, *Pruni domesticae*, *Pyri mali*, & *Carpini* cortices luteum dant colorem. Herba *Hieracii umbellati*, *Acanthae*, *Bidentis*, *Myricae*, *Centaureae Jaceae*, *Lysimachiae vulgaris*, *Polygoni persicariae*, *Anthyllidis*, *Stachydis sylvestris*, *Xanthii* quoque herba cum fructibus cocta luteo specioso tingit colore. *Salicis* folia exsiccata, *Betulae nanæ*, *Scabiosae succisae*, *Thalictri flavum* suppeditant succum. *Lycopodium muscus* pulcherrimum flavum exhibet pigmentum, *Lichen* pariter *juniperinus*, & *parietinus* algæ fulvo lanas colore inficiunt. *Anthemis tinctoria* & *Genista tinctoria* ad flavum conficiendum colorem flores præbent, uti & *Chærophyllum sylvestre*, ac *Thapsia villosa*; rarius in usu sunt *Hyperici* flores.

124. Viridis quidem color ex flavo & cæruleo junctis exsurgit, & apud infectores ut plurimum in usu est;

quæ-

quædam tamen ex vegetabilibus ex-
stant, purum & pulchrum viridem
succum largientia. *Chærophylli sylve-*
stris herba, immaturæ *Rhamni frangulæ*
baccæ, *Bromi secalini*, & *Arundinis*
phragmitidis paniculæ, *Trifolii pratensis*
capitula infectoribus seu tinctoribus,
pictoribus vero *Rhamni cathartici* bac-
cæ ut primum maturæ, tufæ, & vi-
treo vase custoditæ, *Iridis vulgaris*,
Anchusæ officinalis, & *Anemonis pulsa-*
tillæ corollæ viridem sistunt colorem.
Senecio Jacobæa tota planta, antequam
floreat, lecta, nec exsiccata, cum la-
neis vestimentis cocta, viridi ea tingit
colore, ad solares tamen radios de-
fluente. *Empetri* baccæ cum alumine
coctæ, & *Rhamni cathartici* probe ma-
turæ & serius lectæ violaceum, *Actææ*
vero spicatæ, baccæ nigricantem, uti
& *Lycopus* colorem exhibent.

C A P U T VI.

De Plantarum sapore.

125.



D saporem interdum, odorem, colorem, & natalem locum, uti superius monuimus, animum advertere oportet, ut eo certiores de plantarum viribus reddamur. Iphis natura brutis gustatum & odoratum tribuisse videtur, ut horum ope inter salubria & noxia absque periculo pabularentur, omnem enim cibum, antequam Simia comedat, gustu & olfactu explorare dicitur. Et profecto herbas masticando tum per saporem, tum per volatilia corpuscula earundem odorem percipimus, hacque ratione ingerendum cibum in examen vocamus, hinc animalibus omnibus nares ori proximæ, ne quidquam in ventriculum admitteretur, quod his duobus sensibus non fuisset exploratum. Nec abs re, sapore enim & odore expertia vix medicam vim exerunt, optimi e

con-

contra saporis & odoris egregia semper efficacitate pollent, nonnisi his destructis amittenda; hinc sapida & odorata ejusdem speciei plantæ, aut diversæ ejusdem generis species eas, quæ debilius gustus & odoratus sensum afficiunt, virtute & effectu longe superant,

- *Rhabarbarum* ergo officinarum *Rapontico* præferendum est; *Scorzonera sylvestris* sativæ, *Sedum acre* sapore carenti, *Agrimonia* offic. *Agrimonoidi* Tourn.; *Melissa* offic. *Calaminthæ*, *Thymus* offic. *Serpillo*, *Mentha crispa*, *Mentha aquosa*, *Cochlearia* offic. *Coronopo* &c. &c.

126. *Sapida & suaveolentia* vegetabilia humano corpori haud obesse inventa sunt, *graveolentia* e contra nocent, *nauseosa* purgant, ad vomitum provocant, & veneno infecta sunt. Nos ipsi & animalia omnia, natura duce, nonnisi cibos boni saporis utiliter eligimus, nimia tantum horum copia nocumento est, ut superius inuimus, Verum an omnia omnibus æque bene sapiunt? An omni tem po-

re? Minime profecto: id experientia evidenter demonstrat, non omnia omnibus arridere. Forte ob diversam corporis nostri structuram dulcibus alii, alii acidis delectantur, quin nobis ipsis haud raro jam acida jam dulcia placent. Annon putrida febre laborantes nec halitum quidem assatae carnis sustinent? Sapore & odore Equi ab esu exitialis sibi *Phellandrii* absterrentur; Boves e contra sapore & odore ad salubre sibi idem *Phellandrium* edendum alliciuntur.

107. Quemadmodum sapores varii existunt, ita & sapidorum, ut ajunt, qualitates diversae sint, oportet. Sapidula uti contraria inter se *dulcia* & *acria*, *pinguia* & *stiptica*, *acida* & *amara*, *salsa* & *viscosa*, *aquosa* & *sicca*, ita contrariis praedita esse viribus, quis non videt? Secus sapore affinia, virtute quoque affinia, quis non dicet? Hujusmodi sunt *dulcia* & *pinguia*, *acida* & *salsa*, *acria* & *amara*, *sicca* & *stiptica*, *aquosa* & *viscosa*. Hæc in humanum corpus ita vim suam exerunt,

runt, ut in solidas partes, fibras videlicet *nerveas* & *musculares*, easdem roborando aut debilitando agant, & in fluidas partes alterando, aut evacuando superfluas.

- * Sapida ex iisdem licet principiis formata, si diverso per diversam connexionem sapore gaudent, diversis quoque viribus pollent: id ex fructibus manifeste colligimus. Pyrum tenellum percipimus crudum, absque sapore, oleraceum; si adultius sit, at immaturum adhuc, austerum deprehendimus; si coquatur, acidum & refrigerans fit; at maturum, dulce est, suave, esculentum; si vero putrescat, amarum, nauseosum, venenatum evadit.

128, *Dulcia*, quæ cum voluptate linguam inungunt, nobis omnium gratissima ut plurimum sunt, & plerumque nutriunt; hinc alimenta nostra pleraque dulcia, ipse *chylus* dulcis evadat, necesse est, ut profit. In solida *relaxando* agunt, id est, teneriores & laxiores fibras efficiunt, suilla enim caro in insula S. Thomæ mollior longe & delicatior est, cum animalia hæc sacchariferis vescan-

Q 3

tur,

tur arundinibus , hinc nitidior eorum cuticula , qui saccharo delectantur , infantibus autem noxia sunt dulcia , quorum ceteroquin nervuli molles & laxi sunt , senibus vero salubria , quibus rigida fibræ &c. . Dulcia item expectorantia N. 84 , ut ajunt , sunt , pulmoneſque laxant . In fluida edulcando agunt , mites nempe humores reddunt , acrimoniamque eorundem temperant , ſaccharum enim ſinapis acrimoniam mitigat , aſterumque vinum corrigit ; hinc dulcia mites humores conciliando ſanos & longævos conſervant homines , ut plurium exemplo evincitur.

129. *Pingua* linguam quidem inungunt , at ſine voluptate , oleoſa , mitia , pene ſapore expertia ſunt , cum aqua mixta in artiſcioſum lac convertuntur , ut contuſa ſemina cum aqua mixta demonſtrant : verum recentia ſint , nec rancida , contrariam ſecus naturam aſſumptura , oleum enim ex his expreſſum , rancidum eſt , ex craſſo fit tenue , ex dulci acre , ex inſipido amarum ;

rum, ex albo flavum, ex obtundente incidens, ex emolliente corrodens. In solida *emolliendo* agunt, corium enim oleo imbutum mollescit, & quæ rigida sunt, flexilia evadunt; hinc vulnerum dolores leniunt, colicas affectiones mitigant, asperis, ambustis, angina laborantibus faucibus medentur &c.; etenim per pingua solidorum affricus imminuitur, & facilior humorum motus redditur: idcirco macilenti & rigidi senes, quorum solida minus lubrica, tristi & inquieto sæpe sunt animo, commune namque horum *sensorium*, ut vocant, molesto quodam, obscure licet, afficitur sensu: e contra quorum solida ob pinguedinem lubrica sunt, hilari plerumque gaudent animo. In fluida agunt *acria obtundendo*. Si venena vel alia corrodentia sumpta sunt, largissimus, & ut primum porrectus, pinguium potus certum præstat auxilium, pinguibus enim venenum irretitur, obtunditur, & ejicitur; hinc pingua alvi quoque tarditatem sublevant, *stranguria* N. 93, *nephritide* N. 93, & *rheumaticis* doloribus,

ex subtilissimorum humorum & feri fluxu ortis, afflictis levamen adferunt.

* *Mucilaginosæ* N. 96. præprimis plantæ pingues sunt, ut *Althæa*, *Malva*, *Alcea*, varia feminum olea, ut *Amygdali* &c.

130. *Acida* linguam sine dolore penetrant, lactis coagulum efficiunt, cum alcalinis effervescent, cæruleum herbarum succum in rubrum convertunt. In solida *attenuando* agunt, ossa enim acidis immersa mollescent, & flexilia fiunt, hinc nimio primarum viarum, ut ajunt, acido & hypochondria laborantes, languore & macie conficiuntur, obesis idcirco acida prodesse quidam volunt: in Boerhave Comment. pinguis nimium Bellidux aceti usu emaciatus fertur; frequens tamen acidorum usus varios morbos inducere valet. In fluida *refrigerando* agunt; hinc calorem & sitim tollunt, palloris causa sunt, putredinem impediunt; quare in putridis febribus, mortifera corruptione, gangræna, putridis ulceribus utilia dicuntur acida.

* *Acida sunt Berberis, Ribes, Tamarindi, Citri &c. fructus, Rumex, Acetosa, Oxalis acetosella, Sempervivum &c. &c.*

131. *Salsa*, linguam sine contractione detergentia, in solida irritando & abstergendo agunt, fibras scilicet pungunt, ac vellicant, evacuationes, ut ajunt, omnes, & excretiones, ut vocant, promovent, adglutinantes ulcerum humores abstergunt, putredinique resistunt; hinc si diu & majori copia fumantur, rigidos & inertes reddunt homines. In fluida penetrando agunt, perfecte enim salia in fluidis solvuntur, cum iisque commiscentur; adeoque aliam veluti naturam acrium instar incidentem humores induunt, idcirco sanguis salis particulis foetus propriis vasis coerceri nequit, sed maculas, validas hæmorrhagias N. 88 *. maligna ulcera &c. efficit.

* Hujusmodi sunt præprimis marinæ plantæ *Salsola, Salicornia, Crithmum, Atriplex Halimus, Triglochin, Chenopodium maritimum &c.*

132. *Acria* linguam cum dolore vel-

licant, initio licet sapore vix percipiantur, in solida *corrodendo* agunt; majori itaque copia sumpta irritant, rodunt, calefaciunt, minimas fibrillas destruunt, & veneni instar sæpe agunt, si externe cuti applicantur, rubefaciunt. In fluida *incidendo* agunt; hinc si sumantur, tam contraria naturæ videntur, ut hæc omnia sua emissaria aperiat, eaque per secessum, ut ajunt, sudorem, urinam &c., expellere conetur; adeoque *purgantia*, *sudorifera*, *diuretica* N. 84, *emmenogoga* N. 84*, & *abortiva* seu foetum expellentia sunt. Acres plantæ exsiccatæ, aut coctæ, sapore privantur, & esculentæ sæpe evadunt.

* Acres sunt *Arum*, *Capsicum*, *Euphorbia*, *Polygonum persicaria*, *Sedum*, *Selinum* seu *Thyselinum*, *Ranunculus*, *Fungi* quidam, *Gnidia*, *Piper*, *Caryophyllus*, *Kempferia Galanga* & *Zedoaria*, *Amomum* seu *zingiber*, *Acorus*, *Angelica*, *Pimpinella*, *Ruta*, *Allium*, *Sinapis*, *Lepidium*, *Cochlearia*, *Nasturtium*, *Eruca*, *Raphanus*, *Scilla* &c.

133. *Amara*, quæ linguam exasperant, & detergunt, calefacientia sunt.

In

In solida corroborando agunt ; hinc *tonica* seu corroborantia audiunt , & *stomachica* N. 86 , ciborum enim digestionem promovent , & nauseam tollunt . Nimio tamen amarorum usu tenerrimæ fibræ corroduntur , nam semper amara quidpiam de solidis deterunt ; hinc stomachi vis interdum enervatur , hinc ejusdem cruditas , hinc macies . In fluida agunt acidum domando & infringendo , *cerevisia* enim cum *Lupulo* coquitur , & æstivo tempore acescens *Absinthio* commiscetur , ut acidi vis infringatur ; hinc amaræ herbæ contra morbos ex nimio acido provenientes inserviunt , & cum acidis pallor inducatur , amaris bonus faciei color restituitur . Putredini resistunt , nam cadavera *Teucris* *scordio* & carnes *Absinthio* involutæ a putredine immunes conservantur ; hinc *Teucrium* *scordium* & *Chinæ* cortex nota sunt remedia contra *sphacelum* seu integram partis cujuspian corruptionem .

* Amaræ præter N. 101. adductas sunt *Trichosanthes* seu *Colocynthis* , *Elaterium* , *Aloes* , *Centaureum* , *Fumaria* , *Aristolochia* , *Cinna* ,
Di-

Distamnus, *Lupulus*, *Eupatorium*, *Rheum*, *Trifolium aquaticum*, *Santolina*, *Coris*, *Smilax China*, ejus cortice intermittentes febres, aut continuæ remittentes profligantur: hujus loco, si desit, amara alia vegetabilia adhiberi possunt, ut *Gentiana*, *Matricaria chamomilla*, *Faba Ignatiana*, *Cnicus carduus benedictus*, *Artemisia* seu *Absinthium*, *Hyssopus*, *Clusia Eluteria*, *Geum rivale* seu *Caryophyllata*, *Monarda* &c. *Gratiola* quoque inter amaras venit, hæc alvum vehementer purgat, bilem, pituitamque educit, trita & vulneribus superposita, ea celeriter sanat, ut vult Matthiæus, Cæsalpinus, & Camerarius; juxta vero Paulum Hermannum aquas hydropicorum, & *hypochondria* laborantium per superiora & inferiora, ut loquuntur, pellit, tum ad enecandos expellendosque vermes efficacissima est. Monet quidem Boerhave, *Gratiolam* a pluribus pro veneno haberi, quod, *gangrænosus* visceribus, vel si inflammatio adsit, adhibita mortem illico adferat: verum, integris adhuc visceribus, tuto ab omnibus sumi posse, affirmat.

134. *Sicca* linguam sine ulla irritatione dimittunt, sapore & humore fere destituuntur. In solida siccando agunt; hinc *musculares* fibras roborant, fortiores, rigidioresque efficiunt; idcirco *obesis sicca* profunt, & spon-

giosis ulceribus externe applicata, eadem exsiccant & roborant. In fluida absorbendo agunt; hinc in hæmorrhagiis N. 88*. sistendis feliciter adhibentur; internus tamen usus haud commendatur, ne absorbendo nimium humores canaliculos obturent.

* Hujusmodi sunt *Gnaphalium Stoechas*, herbæ capillares, *Hedera*, semina *Lycopodii*, *Lycoperdi*, *Lithospermi* &c.

135. *Stiptica* linguam cum contractione exsiccant. In solida adstringendo agunt; hinc roborant, fibras coarctant, diu masticata crassam linguam & indurata labia reddunt, alvi fluxus cohibent, ut *Sanguis Draconis*, *Tormentilla*, *Asarum hypocistis*, *Balaustia* seu *Malus punica*. In maligna ulcera *Rumex* seu *Herba Britanica* eminet. In fluida, eadem spissa reddendo, agunt, sanguinem enim coagulant; hinc externe applicata hæmorrhagiis medentur.

* Præter adductas stipticæ sunt *Areca Catechu*, *Alchemilla*, *Polygonum bistorta*, *Rhus* seu *Sumach*, *Quercus*, *Tamariscus*, *Spiræa* seu

seu *Ulmaria*, *Rhodiola*, *Geum*, seu *Caryophyllata*, *Minosa* seu *Acacia*, *Rosa rubra*, *Mespilus*, *Cydonia*, *Fragaria*, *Lapathum* &c. Plantæ quoque coriariæ, & omnes immaturi fructus.

136. *Aquosa* sapore fere expertia sunt, contusa & compressa multum aquei succi, parum solidæ substantiæ largiuntur. In solida humectando agunt; hinc laxas debilesque efficiunt fibras, quare, qui oleribus vescuntur, languent, immoderatoque esu hydropem sibi comparant, in senili igitur rigiditate utilia sunt, noxia vero, si ventriculus debilior, & fibræ laxiores &c. In fluida mundando agunt, impurum enim sanguinem abluunt, salia eluunt, hinc *diluentia* a quibusdam vocantur, obstructions solvunt, idcirco a veteribus *aperientia* & *anastomotica* nominata sunt, varias concretiones impediunt, nimiam solidorum pressionem & affricum tollunt &c. &c.

* *Aquosa* sunt *Spinacia*, *Atriplex*, *Asparagus*, *Portulaca oleracea*, *Borago*, *Rapa*, *Brassica*, *Batatas*, *Tragopogon*, *Bardana*, *Valeriana locusta*, *Cynara cardunculus*, *Leontodon*

don Taraxacum, Lactuca, Cichorium endivia &c. Omnes quidem *Lactucæ* varietates *la-tescentes* sunt, suspectæ igitur & malignæ ut plurimum indolis indicium præ se ferunt; maxime cum ex his quædam succum veneno infectum & soporiferum contineant: in sativa tamen *Lactuca* lacteus succus tam iners est, ut nullum ab eo metuendum sit periculum, quin potius mundat, sanguinem abluit, & refrigerat: adeoque qui impuram sanguinis massam habent, & mane linguam siccam, viscosam, & immundam observant, per diligentem ejus esum incommoda hujusmodi evanescere deprehendent. *Lactuca* vesperi sumpta non tantum ob humectantem & refrigerantem vim sed etiam ob *la-tescentem* succum nonnihil *narcoticum* seu stupefacientem tranquillum conciliat somnum: quod jam olim veteribus notum, ideoque *Lactucis* conciliandi somni causa vescebantur, ut Galenus de se ipso fassus est, se, ingravescente ætate, dum somnus evanesceret, omni vespere *Lactucam* comedisse. *Endivia* acres humores per urinam diluit, tum præcipue ob laxantem vim commendatur. *Taraxaci* folia primo vere collecta lactucæ instar usurpantur, sanguineam massam optime purificant, & urinam egregie expellunt.

137. *Viscosa* in mucosam, glutinosam ac fere insipidam materiam sol-

vuntur. In solida *lubricando* agunt, rigidiiores enim fibras lubricas reddunt; hinc ad leniendos dolores, in calculo, rheumatica affectione N. 129. &c. usurpantur. In fluida *involvendo* agunt, acria namque mucosuo suo involvunt; hinc horum usus ad tussim, ex humorum acrimonia ortam tollendam, & acres destillationes, ad lotiones in colicis doloribus & dysenteria &c. egregius est.

* Huiusmodi sunt Gummi arabicum Tragacanthæ & Cerasorum, Viscus, Althæa, Malva, Alcea, Parietaria, Symphytum seu Consolidamajor, Tussilago, Pulmonaria &c.

138. Alios quoque sapores, ex simplicibus supra adductis, ortos dari extra dubium est, ut plurimis patet exemplis. Acido-acris sapor in Polygala Senega advertitur; acido-amarus in Physali Alkekengi; amaro-acer in Citro; amaro-acerbus in Rusco; amarodulcis in Solano dulcamara; dulci-stipticus in Polypodio, Glycyrrhiza; dulci-acidus in Tamarindo, Vino; dulci-acris in Foeniculo; acri-viscosus in Allio &c. Ipse sti-
pti-

pticus sapor compositus videtur, ideoque Veteres *stipticum* in duos diversos divisere, in *austum* ex sicco & acido, & in *acerbum* ex sicco & amaro, quem etiam *ponticum* nominarunt.

CAPUT VII.

De Plantarum odore.

139.



Vegetabilia per odores quoque miras in corpore humano mutationes efficiunt, ut quotidiana docet experientia, in nervos enim quam maxime subtilissima ex plantis promanantia effluvia agunt. Hujusmodi vegetabilia plurima sese offerunt, quorum aut folia aut cortices, aut radices, & in primis flores odorem emittunt, ita quidem, ut inter tot millia vix duo diversæ speciei conveniant, in quibus nulla omnino odoris advertitur differentia: diversæ igitur plantæ diversa ratione nervos

R

affi-

afficiant , oportet , & diverſum in iis effectum producant . Plurimas equidem herbas , ſi animum adverterimus , eodem odore , ſapore quoque eodem præditas eſſe deprehendemus ; licet e contra non omnes , quæ eodem modo ſapiunt , eundem etiam odorem ſpargunt . Odor igitur in vegetabilibus eſſe videtur , qui tantam in plantis ejusdem generis differentiam efficit . Quare ſupremus Conditor olfactus ſenſum ſupra animalium os collocavit , ut nihil per hoc demitteretur , quod prius narium veluti examen non ſubiſſet : ſcilicet ſenſum hunc utrumque animæ ſedi quam proximum eſſe voluit , ut eo promptius vehementiusque , quæ noxia futura eſſent , admoneremur ; hinc eſt , quod odor citiſſime in noſtro corpore mutationes excitet .

140. Cum innumeræ pene ſint odorum varietates , difficillimum eſt , eodem ad certos reducere ordines : generalia igitur quædam in medium adferemus , eaque ex ſimplicium conſi-

de-

deratione, deducta: Alii itaque odores *suaveolentium* nomine veniunt; alii *graveolentium*; alii *suaveolentes* quibusdam, quibusdam *graveolentes* videntur, hos *intermedios* vocare placuit. *Suaveolentes* dividuntur in *aromaticos* & *fragrantes*; *graveolentes* in *tetros* & *nauseosos*; *intermedii* denique in *ambrosiacos*, *alliacos* & *hircinos*.

* *Intermedios* dari odores experientia testatur. *Affam foetidam* nos quam maxime aver-
samur; *Indi* e contra, quibus in delitiis est, *suaveolentem* omnino arbitrantur. Multa olim propter odorem accepta erant, quæ hodie haud grata deprehenduntur. *Citri* odorem plerique Veterum execrati sunt, is nobis admodum arridet. *Allii* ne quidem halitum plures ferunt, *sapidum* e contra pluribus condimentum est. Hujus initio seculi *Moschi* odor inter delicias reputabatur, nunc ita fere exolevit, ut posteris forsan ejus indoles obscura futura sit, quibus scilicet noxium ejusdem odorem cum pristina suavitate componere difficillimum videbitur.

141. *Aromatica*, seu quæ aromati-
cum fundunt odorem, nervos maxi-
me excitant, & corroborant, ac per

hos vasa omnia intenduntur, promptior inde fit sanguinis motus; quare aromatica, quin corrodat, calefacientia sunt, & resolventia; hinc vires inflantur, & cor roboratur: nimius tamen eorum usus perniciosus esse potest.

* Aromatici odoris sunt præprimis *Acorus*, *Ammi*, *Angelica*, *Cinnamomum*, *Macis*, *Nuxmoscbata*. *Cardamomum*, *Caryophyllus*, *Camphora*, omnes *Lauri* species, *Dianthus* &c.

142. *Fragrantia* flaccidos nervos stimulant, & gratissimo sese commendant odore.

* Hujusmodi sunt flores *Tiliae*, *Lilii*, *Jasmini*, *Nyctanthidis*, *Cheiranthi*, *Viola*, *Croci*, hujus moderatus quidem odor animales spiritus excitat & exhilarat; at majori copia haustus caput gravat, mentem turbat, & sensus omnes sopit, quemadmodum & fragrans *Polianthis* florum odor, qui maxime *histericis* & *hypochondria* laborantibus noxius esse dicitur.

143. *Tetra* nervos quasi suffocant & sopiunt, repellentia & relaxantia ut plurimum sunt.

* Graveolento odore notissima est *Stachys*,
Co-

Cotula, *Papaver*, *Astæa*, *Solanum*, *Doronicum*, *Hyoscyamus*, *Melanthus*, *Anagyris*, de qua Ray Hist. Plant. Folia *Anagyridis* trita & imposita tumores reprimunt. Sicca in passō pota menses & secundas movent, foetum mortuum ejiciunt. Semen commanducatum vomitiones movet, nec semen tantum sed & folia unanimi Botanicoꝝ consensu. Accidit interdum; ut Capræ & Oves in Creta fame vexatæ hujus folia depascant, licet odoris sint ingratiſſimi, & postea ex horum lacte caseus conficiatur, quo si forte ignarus aliquis vescatur, aut lac bibat, statim excitantur tum vehementiſſimi vomitus tum fluxus ventris; & eum sæpiſſime accidat, multi in discrimen vitæ veniunt, quam ob causſam frutex omnibus sit exosus. Vel halitu sæpe noxiæ sunt *Buxus*, *Cannabis*, *Humulus*, *Ruta*, *Sambucus*, *Juglans*, *Tagetes*; hinc male ad domos & habitacula feruntur.

144. *Nauseosa* convellunt; hinc nervi, quacunque data via, eadem excutere conantur: ex ventriculo quidem per vomitum; ex intestinis per secessum, ut ajunt, expelluntur; si vero sanguineam massam invaserunt, suis quoque viis illico evacuantur; hinc diaphoretica, seu perspirationis ope ejiciuntur, sudorifera, diuretica, emmenagoga, abortiva evadunt.

* Taliã sunt *Boletus*, *Bryonia*, *Convallaria*, *Dracontium*, *Asarum*, *Stapeliæ* flores &c. *Colocynthis* solo odore purgare & vomitum excitare dicitur. De *Veratro* Boyle testatur, hoc adstantes, dum contunderetur, purgatos fuisse: *Veratrum* quidem malignum & noxium communis fere consensus pronunciat; verum, si certa quantitate, si certo modo paratum sumatur, ut jam de hujusmodi diximus, annon levamen adferre potest? Cl. Biwald in suis Additamentis: De *Veratri* usu hæc mihi a viro docto, ait, fideque dignissimo relata fuisse. In quadam inferioris *Stiriae*, qua *Croatia* contermina est, *Paræcia* vir quidam ejus loci Curia ad senam ætatem pertigit, qui professus est se quotidie foliorum *Veratri* in pulverem redactorum, & cum triplo sacchari commixtorum dosin exiguam assumpsisse. Conveniunt hæc quam optime cum iis, quæ Cl. Autor libelli de *Aconito Napello* tradidit, de temperanda plantæ hujus acrimonia admixtione sacchari in pulverem contriti.

145. *Ambrosiaca* analeptica sunt, seu nervos corroborant, vires efferunt, & præprimis cordis vim intendunt; hinc *Turcæ*, qui maxime hoc odore delectantur, longævi sunt: quod si apud aliquem fortior, quam par est, cordis vis evadat, & alia sese obstacula offe-

offerant, timendum est, ne talis in virtutis discrimen veniat, & suffocetur; idcirco *histericæ* hunc odorem minime ferunt,

* *Ambrosiaca* sunt *Geranium moschatum*, *Malva Moschata*, *Asperula*, *Hibiscus Abelmoscus*, *Latyrus moschatus*, *Holcus*, *Kleinia* &c.

146. *Alliacia alexiteria* & *carminativa* habentur, seu halitum tam per superiorem quam per inferiorem partem expellunt, perspirationi scilicet præcipue inserviunt, nervos irritant, & corroborant, a quibus fibrarum & intestinorum tonus, ut ajunt, dependet, ita ut olidam quasi atmosphæram circa os fumentium efforment, hacque ratione aliorum noxiorum effluviolorum attractionem impediant,

* Hujusmodi sunt *Allium*, *Erysimum alliaria*, *Teucrium* seu *Scordii* herba, *Thlaspi alliaceum*, *Petiveria*, *Ferula* seu *Assa foetida*.

147. *Hircina*, quæ hircum olent, *aphrodisiaca* dicuntur, seu ad venerem excicare,

* Hircinum emittunt odorem *Orchis*, *Chenopodium*, *Vulvaria*, *Hieracium*, *Geranium Robertianum*, *Hypericum hircinum*, *Lycoperdon*, *Eruca*, hujus folia Veteres semper cum *Lactuca* admiscebant, iis enim venerem excitari putabant, & contra *Lactucæ* foliis obtundi.

C A P U T VIII.

De plantarum colore, naturali loco, easque colligendi tempore.

148.



PAuca quædam ex vegetabilium colore, experientia magistra, deducere licet: & quidem *ruber* florum & fructuum color acidum ut plurimum saporem denotat, quod ex baccis *Vaccinii oxycocci*, *Berberis*, *Rubi*, *Ribeos*, *Mori* &c. patet; rubra quoque plantarum folia idem designant, uti *Scorbi*, *Rumicis acetosæ*, *Vitis* &c. *Viridis* color austerum quid & crudum significat, omnes enim fructus immaturi, crudi adhuc, & a-

cer-

cerbi, virides esse solent, nec meliorem, nisi mutato colore, saporem consequuntur. *Pallidus* color minime sapidas indicat herbas, nam tenella adhuc primo vere *Laëtuca*, *Brassica*, *Asparagus*, *Gichorium*, *Leontodon* &c. vix sapida, cum pallida existunt, deprehenduntur. *Albus* color dulcis sæpe indicium est saporis, sic *Pruna*, *Poma*, *Mori albi* &c. dulces sunt. *Luteus* vero color amarum demonstrat, ut in *Gentiana*, *Centaurea*, *Rheo* seu *Rhabarbaro*, *Chelidonio* &c. *Luridus* floris color, & tristis totius plantæ aspectus suspicionem moveat, oportet, uti & niger baccarum color, cum plures huiusmodi plantæ veneno infectæ inveniuntur, luridi namque flores in *Papavere nigro*, *Aconito*, *Atropa*, *Rhoe*; nigrae vero baccæ in *Atropa*, *Actæa*, *Coriaria*, *Solano*, *Empetro*, *Pado* &c. conspiciuntur.

* Si vegetabilium succi cæruleo plantæ cuiuspiam succo admixti, eundem rubrum vel viridem efficiunt, manifesto sit indicio, acidam horum vel alcalinam esse indolem.

149. Natalem plantarum locum haud spectandum esse, quis pronuntiabit? Quotidiana docti fumus experientia, ejusdem speciei plantam diverso in loco natam haud raro diversis gaudere viribus. Et profecto plantæ in sicco genitæ solo sapidiores, magisque actuosæ evadunt; sive radix sive ramus, folia, flores, semina, fructus, gummi, aut resina spectetur, majori equidem medendi virtute polent, quam quæ in humidioris crevere loco: & quidem quo magis exsuccum solum, magisque solaribus expositum est radiis, eo validiori efficacia præditæ in eo reperiuntur herbæ, vegetatio enim his in locis & melius & perfectius peragitur, pluribusque salinis & oleosis quam aqueis particulis vegetabilia replentur, hinc in calidioribus plagis longe nobiliores plantæ, & in ficcis Orientis regionibus longe magis aromaticæ oriuntur,

* Plantæ quædam totam vim succo debent, hinc exsiccatae efficaciam amittunt. Recens *Gratiola* validissime purgat, & ad vomitum provocat, siccata iners deprehendi-

ditur. *Iris vulgaris* diuretica est quamdiu viridis & recens. *Sedum minus* nulla in *scorbutum* efficacia pollet, si exsiccetur: quemadmodum *Raphanus*, *Cochlearia*, *Nasturtium*, *Alliaria* ob succum tantum grassanti forte *scorbuto* opponi possent, recentes igitur sint, oportet. Aliæ e contra validiores fiunt, postquam superfluis ex iis humor in auras abivit, ut *Cinnamomum*, *Rosmarinus*, *Salvia*, *Thymus*, *Satureja*, *Clinopodium*, *Origanum*, *Lavandula*, *Melissa*, *Caryophyllus* &c.

150. Herbæ in humidula ortæ humo nonnihil insipidæ evadunt, olera enim in umbrosis locis, & solaribus radiis minus expositis genita, fructusque omnis generis annon magis insipidi, dulces e contra & sapidi in sicca terra, & a sole calefacta inveniuntur? Quin plerumque aquosum solum corroden-tes producit plantas, hinc est, quod aquatica vegetabilia acria & corroden- tia sint, ut *Ranunculus*, *Calla*, *Arum*, *Nymphæa*, *Rumex* seu herba Britanni- ca, *Sium*, *Phellandrium*, *Cicuta*, *Polygonum persicaria*, *Cochlearia armoracia*, *Nasturtium aquaticum* &c., hinc ver- næ plantæ plurimæ acres, ut *Pulsatil-*

la ; *Anemone* , *Chrysoplenium* , *Daphne* &c. Cum aquaticis igitur herbis caute agendum , nisi cultura acrimoniam dimiserint : sic *Apium* sponte in paludosis crescens , acre est , nauseosum & venenatum , in ficciore loco per culturam dulcescit , esculentum fit , & gratissimum pluribus evadit.

* Ut plurimum locus spectandus erit , plures enim plantæ in aliis locis ortæ venenatæ , in aliis proficue inventæ sunt. *Taxi* baccæ moles & succo refertæ a *Dioscoride* , *Galeno* , *Plinio* , aliisque antiquioribus quam plurimis inter venena numeratæ sunt , idque *Matthiolus* , *Joann. Bauhinus* , *Rajus* &c. experimentis confirmant . *Lobellius* e contra , *Camerarius* , *Gerardus Anglus* , *Géoffroy* &c. *Taxi* baccas a puerulis etiam absque periculo comestas fuisse testantur . Fatendum igitur est , *Taxum* aliasque nonnullas plantas quibusdam in regionibus veneno imbui , aliis in plagis innoxias persistere .

151. Tempus quoque eruendi & legendi plantas haud parum ad vires confert : eo scilicet colligendæ sunt tempore , quo ad maturitatem & perfectionem devenere , tunc enim pluris

Humum salini & oleosi succi in se continent. Experientia didicimus, herbarum radices effodiendas, postquam omnis in iisdem humor conquievit. Bulbi igitur, caule & foliis exsiccatis, eruantur, reliquæ autem radices post autumnales pluvias, represso per frigus humorum cursu, aut veris initio: adhærentes radiculae amputandæ sunt, truncus descendens unice adhibendus,

* Verno tempore, postquam salina & oleosa corpuscula ab aqua recens ingressa diluta sunt, minus efficaces & crudiores evadunt radices, alvum, si sumantur, cum impetu dejiciunt, crebrisque torminibus infirmum excruciant: sic *Caryophyllata* radix, nisi primo statim vere, antequam aromatica vis in folia diffunditur, evellatur, expeditam haud præstabit efficaciam.

152. Herbarum caudex & folia decerpenda sunt, cum florere primum planta incipit, tunc enim delicatissima censentur; quod si corroborandi scopus intendatur, paulo serius colligenda sunt. Flores nec sole exsiccati, nec rore madidi, ut primum explicantur, auferendi sunt, attamen servatis antheris,

ris, antequam pollen dimittant, cum
 haud exigua in iis vis deprehendatur.
 Si præcipua plantarum quarundem vis
 in corolla sita sit, ut in *Rosa*, *Lilio*
 &c. a calyce ea sedulo separanda est.
 Fructus tunc optimi cum epidermis
 juxta plantæ indolem saturatiore colo-
 re tincta est. Gummi, Resinæ aliique
 succi tunc excipiendi, cum lentorem
 quemdam obtinuisse videntur. Plura
 experientia dabit.

F I N I S.

INDEX GENERUM ET SYNONIMORUM QUORUNDAM.

Numerus Romanus Ordinem Nat. a pag.

176.3 Arabicus Generum numerum

a pag. 121. indicant.

A bies	1083	Adoxa	XIII. 503
Abrotanum	949	Aegilops	90. IV. 1156
Absinthium	949	Aegopodium	XLV. 370
Acacia	1164	Aeschynome	XXXII. 892
Acajou	522	Aesculus	XXIII. 464
Acalypha	XXXVIII. 1088	Aethusa	XLV. 357
Acanthus	XL. 797	Agaricus	1215
Acer	XXIII. 1161	Agave	X. 433
Acetosa	453	Ageratum	775. XLIX. 940
Achillea	XLIX. 975	Agrimonia	XXXV. 610
Achras	XLIII. 440	Agrostemma	XXII. 585
Achyranthes	LIV. 289	Agrostis	IV. 81
Acinos	36. 730	Aira	IV. 82
Acnida	LIII. 1120	Ajuga	XLII. 708
Aconitum	XXVI. 685	Aizoon	XIII. 632
Acorus	II. 436	Albuca	X. 418
Acrostichum	1179	Alcea	XXXVII. 844
Actæa	XXVI. 647	Alchemilla	XXXV. 166
Adansonia	XXXVII. 840	Aldrovanda	XIV. 392
Adelia	XXXVIII. 1143	Aletris	X. 430
Adenanthera	XXXIII. 528	Alisma	V. 462
Adiantum	1186	Allionia	XLVIII. 118
Adonis	XXVI. 701	Allium	IX. 411
		Allophylus	478

<i>Alnus</i>	1058	<i>Andryala</i>	XLIX. 919
<i>Aloe</i>	X. 432	<i>Anemone</i>	XXVI. 697
<i>Alopecurus</i>	IV. 79	<i>Anethum</i>	XLV. 366
<i>Alpinia</i>	VIII. 4	<i>Angelica</i>	XLV. 349
<i>Alfene</i> 570	XXII. 382	<i>Angiopteris</i>	1177
<i>Alstroemeria</i>	XI. 434	<i>Anguria</i>	XXXIV. 1043
<i>Althæa</i>	XXXVII. 843	<i>Annona</i>	LII. 696
<i>Alyssum</i>	809	<i>Anthemis</i>	XLIX. 974
<i>Amaranthoides</i>	316	<i>Anthericum</i>	X. 424
<i>Amaranthus</i>	LIV. 1066	<i>Anthoceros</i>	1207
<i>Amaryllis</i>	IX. 408	<i>Anthospermum</i>	XLVII.
<i>Ambrosia</i>	XLIX. 1063		1170
<i>Ambrosinia</i>	II. 1038	<i>Anthoxanthum</i>	IV. 43
<i>Amellus</i>	XLIX. 982	<i>Antholyza</i>	VI. 59
<i>Amethystea</i>	XLII. 34	<i>Anthyllis</i>	315. XXXII.
<i>Ammannia</i>	XVII. 156		868
<i>Ammi</i>	XLV. 336	<i>Antidesma</i>	1116
<i>Amomum</i>	VIII. 2	<i>Antirrhinum</i>	XL. 754
<i>Amorpha</i>	XXXII. 865	<i>Aphanes</i>	XXXV. 167
<i>Amygdalus</i>	XXXVI. 622	<i>Aphyllanthes</i>	V. 410
<i>Amyris</i>	475	<i>Apium</i>	XLV. 369
<i>Anabasis</i>	XII. 314	<i>Apluda</i>	IV. 1153
<i>Anacardium</i>	XII. 522	<i>Apocynum</i>	308. XXX.
<i>Anacyclus</i>	XLIX. 973		307
<i>Anagallis</i>	XX. 207	<i>Aquartia</i>	137
<i>Anagyris</i>	XXXII. 511	<i>Aquifolium</i>	173
<i>Ananas</i>	397	<i>Aquilegia</i>	XXVI. 687
<i>Anastatica</i>	802	<i>Arabis</i>	822
<i>Anchusa</i>	XLI. 183	<i>Arachis</i>	XXXII. 880
<i>Andrachne</i>	XXXVIII.	<i>Aralia</i>	XLVI. 388
	1101	<i>Arbutus</i>	XVIII. 554
<i>Andromeda</i>	XVIII. 551	<i>Arctium</i>	XLIX. 927
<i>Andropogon</i>	IV. 1151	<i>Arctopus</i>	XLV. 1174
<i>Androsace</i>	XXI. 197	<i>Arctotis</i>	XLIX. 995

AIA AIA

VIV VIV

AIA AIA

Areca	1231	Atriplex	XII. 1159
Arenaria	XXII. 571	Atropa	XXVIII. 250
Arethusa	VII. 1018	Avena	IV. 92
Aretia	XXI. 196	Averrhoa	XIV. 578
Argemone	XXVII. 652	Avicennia	795
Aristida	IV. 95	Aurantium	905
Aristolochia	XI. 1026	Auricula ursi	198
Armeniaca	623	Axyris	XII. 1053
Arnica	XLIX. 962.	Ayenia	XXXVII. 1024
Arteria	XLV. 334	Azalea	XVIII. 213
Artemisia	XLIX. 949	Azedarach	529
Arum	II. 1033	Baccharis	947. XLIX.
Arundo	IV. 94	953	
Asarum	XI. 592	Bæckea	493
Asclepias	XXX. 308	Ballota	XLII. 723
Ascyrum	XX. 907	Balsamina	1012
Aspalathus	XXXII. 864	Balsamita	948
Asparagus	XI. 426	Banisteria	XXIII. 575
Aspergillus	1214	Barba capræ	633
Asperugo	XLI. 190	Barleria	XL. 789
Asperula	XLVII. 122	Barrera	389
Asphodelus	X. 423	Bartia	XL. 743
Asplenium	1184	Basella	XII. 384
Aster	XLIX. 958	Batis	1110
Asteriscus	981. 990	Bauhinia	XXXIII. 513
Astragalus	XXXII. 896	Begonia	XII. 1162
Astrantia	XLV. 329	Belladonna	250
Astronium	1117	Bellis	XLIX. 966
Athamanta	XLV. 340	Bellonia	227
Athanasia	XLIX. 947	Benzoe	505
Atractylis	XLIX. 934	Berberis	444
Atragene	XXVI. 698	Bermudiana	1021
Atraphaxis	XII. 451	Besleria	XL. 759

Beta	XII.	312	Brunia	XLVIII.	275
Betonica	XLII.	721	Brunsfelsia		261
Betula	L.	1058	Bryonia	XXXIV.	1099
Bidens	XLIX.	936	Bryum		1200
Bignonia	XL.	763	Bubon	XLV.	352
Biscutella		812	Bucca ferrea		176
Biserrula	XXXII.	897	Bucephalon		1236
Bixa	XXXVII.	657	Buchnera		776
Blæria	XVIII.	140	Bucida	XII.	543
Blakea		596	Buddleja		141
Blasia		1205	Bufonia	XXII.	169
Blechnum		1181	Buglossum		183
Blitum	XII.	14	Bugula		708
Bobartia	IV.	72	Bulbocastanum		337
Bocconia	XXVII.	594	Bulbocodium	IX.	409
Boerhavia	XLVIII.	9	Bunias		827
Boletus		1216	Bunium	XLV.	337
Bombax	XXXVII.	839	Buphthalmum	974. XLIX.	
Bonarota		26		981	
Bontia	XL.	795	Bupleurum	XLV.	330
Borago	XLI.	189	Burmannia	X.	399
Borassus		1226	Bursa pastoris		806
Borbonia	505. XXXII.		Bursera		442
		861	Butomus	V.	509
Bosca	LIII.	317	Buxbaumia		1194
Brabejum		161	Buxus	XXXVIII.	1059
Brassica		824	Byssus		1214
Briza	IV.	85	Byttneria		269
Bromelia	X.	397	Cacalia	XLIX.	937
Bromus	IV.	90	Cacao		904
Brossæa		1235	Cachrys	XLV.	344
Browallia	XXVIII.	777	Cactus	XIII.	616
Brownæa		837	Cæsalpinia	XXXIII.	518

<i>Calamintha</i>	731	<i>Cardiaca</i>	723
<i>Calamus</i>	V. 438	<i>Cardiospermum</i>	XXIII.
<i>Calceolus</i>	1019		500
<i>Calea</i>	XLIX. 945	<i>Carduus</i>	XLIX. 929
<i>Calendula</i>	XLIX. 994	<i>Carelia</i>	940
<i>Calla</i>	II. 1035	<i>Carex</i>	III. 1052
<i>Callicarpa</i>	XLIII. 136	<i>Carica</i>	XXXVIII. 1133
<i>Calligonum</i>	XII. 683	<i>Carlina</i>	XLIX. 933
<i>Callisia</i>	VI. 64	<i>Carpesium</i>	XLIX. 952
<i>Callitriche</i>	XII. 13	<i>Carpinus</i>	L. 1079
<i>Calophyllum</i>	661	<i>Carthamus</i>	XLIX. 935
<i>Caltha</i>	994. XXVI. 706	<i>Carvi</i>	367
<i>Calycanthus</i>	642	<i>Carum</i>	XLV. 367
<i>Cambogia</i>	XXXVIII. 653	<i>Caryophyllata</i>	639
<i>Camellia</i>	XXXVII. 852	<i>Caryophyllus</i>	567. XIX.
<i>Cameraria</i>	102. XXX.		672
	301	<i>Caryota</i>	1234
<i>Camocladia</i>	50	<i>Cassia</i>	1107. XXXIII. 516
<i>Campanula</i>	XXIX. 219	<i>Cassida</i>	737
<i>Camphora</i>	505	<i>Cassine</i>	XLIII. 373
<i>Camphorata</i>	165	<i>Cassya</i>	507
<i>Camphorosma</i>	XII. 165	<i>Castanea</i>	1078
<i>Canella</i>	601	<i>Catananche</i>	XLIX. 924
<i>Canna</i>	VIII. 1	<i>Cataria</i>	713
<i>Cannabis</i>	LIII. 1121	<i>Catesbæa</i>	XXVIII. 131
<i>Cannabina</i>	1138	<i>Caucalis</i>	XLV. 333
<i>Capparis</i>	XXV. 646	<i>Ceanothus</i>	XLIII. 268
<i>Capraria</i>	XL. 772	<i>Cecropia</i>	LIII. 1105
<i>Caprifolium</i>	234	<i>Cedrela</i>	LIV. 278
<i>Caprificus</i>	1174	<i>Cedro</i>	278
<i>Capficum</i>	XXVIII. 253	<i>Cedrus</i>	1140
<i>Cardaminum</i>	468	<i>Celastrus</i>	XLIII. 271
<i>Cardamine</i>	816	<i>Celosia</i>	LIV. 290

Celsia	XXVIII. 761	Chelidonium	XXVII. 650
Celtis	LIII. 1149	Chelone	XL. 752
Cenchrus	IV. 1155	Chenopodium	XII. 311
Centaurea	XLIX. 988	Cherleria	XXII. 572
<i>Centaurium majus</i>	988	Chiococca	XLVIII. 232
<i>Centaurium minus</i>	324	Chionanthus	XLIV. 21
Centella	XI. 1057	Chironia	XX. 256
Centunculus	XX. 146	Chondrilla	XLIX. 914
Cepa	411	<i>Christophoriana</i>	647
Cephalanthus	XLVIII. 114	Chrysanthemum	XLIX. 970
Cerastium	XXII. 587	Chrysobalanus	XXXVI. 624
Cerasus	623	Chrysocoma	XLIX. 943
Ceratocarpus	XII. 1041	Chrysogonum	XLIX. 992
<i>Ceratoides</i>	1053	Chrysophyllum	XLIII. 264
Ceratonia	XXXIII. 1173	Chrysofplenium	XIII. 560
Ceratophyllum	XV. 1071	Cicer	XXXII. 872
Cerbera	XXX. 295	Cichorium	XLIX. 925
Cercis	XXXIII. 512	Cicuta	338. XLV. 356
Cerinth	XLI. 187	<i>Cicutaria</i>	348
Ceropegia	XXX. 303	Cinchona	229
<i>Cervi - spina</i>	266	Cinna	IV. 15
Cestrum	XXVIII. 262	Cinnamomum	505
Chærophyllum	XLV. 360	Cineraria	XLIX. 961
Chamædaphne	135. 551	Circæa	XLVIII. 24
Chamæjasme	490	Cirsium	929
Chamælea	49	Cissampelos	XI. 1144
Chamæmelum	974	Cissus	XLVI. 148
Chamænerion	473	Cistus	XX. 676
Chamærhododendros	550	Citharexylon	XL. 764
Chamærops	1225	Citrus	XVIII. 905
Chara	1209		
Cheiranthus	819		

<i>Clanlectina</i>	747	<i>Conium</i>	XLV. 338
<i>Clathrus</i>	1219	<i>Connarus</i>	834
<i>Clavaria</i>	1222	<i>Conocarpus</i>	XLVIII. 237
<i>Claytonia</i>	XIII. 288	<i>Convallaria</i>	XI. 427
<i>Clematis</i>	XXVI. 699	<i>Convolvulus</i>	XXIX. 216
<i>Cleome</i>	XXV. 830	<i>Conyza</i>	XLIX. 954
<i>Cleonia</i>	XLII. 739	<i>Copaifera</i>	544
<i>Clerodendrum</i>	XL. 793	<i>Coral</i>	859
<i>Clethra</i>	XVIII. 555	<i>Coralloides</i>	1208, 1222
<i>Cliffortia</i>	XXXVIII. 1139	<i>Corchorus</i>	XXXVII. 678
<i>Clinopodium</i>	37. XLII. 728	<i>Cordia</i>	XL. 257
<i>Clitoria</i>	XXXII. 873	<i>Coreopsis</i>	XLIX. 985
<i>Clusia</i>	1160	<i>Coriandrum</i>	XLV. 358
<i>Clusia</i>	XXXVIII. 1146	<i>Coriaria</i>	LIV. 1135
<i>Clypeola</i>	811	<i>Corindum</i>	500
<i>Cneorum</i>	XXXVIII. 49	<i>Coris</i>	244
<i>Cnicus</i>	XLIX. 930	<i>Corispermum</i>	XII. 12
<i>Coccoloba</i>	XII. 498	<i>Cornucopiæ</i>	IV. 73
<i>Cochlearia</i>	807	<i>Cornus</i>	XLVII. 150
<i>Cocos</i>	1229	<i>Cornutia</i>	XL. 770
<i>Coffea</i>	XLVII. 231	<i>Corona imperialis</i>	413
<i>Coix</i>	IV. 1049	<i>Corona solis</i>	283
<i>Colchicum</i>	IX. 459	<i>Coronilla</i>	XXXII. 887
<i>Coldenia</i>	174	<i>Corrigiola</i>	291. LIV. 389
<i>Collinsonia</i>	XL. 40	<i>Cortusa</i>	8. XXI. 199
<i>Columnea</i>	XL. 796	<i>Corylus</i>	L. 1080
<i>Colutea</i>	XXXII. 884	<i>Corymbium</i>	XLIX. 1008
<i>Coma aurea</i>	943	<i>Corypha</i>	1227
<i>Comarum</i>	XXXV. 641	<i>Costus</i>	VIII. 3
<i>Combretum</i>	477	<i>Cotula</i>	XLIX. 972
<i>Commelina</i>	VI. 63	<i>Cotyledon</i>	XIII. 580
<i>Conserua</i>	1213	<i>Crambe</i>	829
		<i>Craniolaria</i>	XL. 756
		S 3	Craf-

Crassula	XIII. 394	Cynoglossum	XLI. 184
Cratægus	XXXVI. 625	Cynometra	521
Crateva	XXV. 602	Cynomorium	521. L. 1039
Crepis 912.	XLIX. 918	Cynofurus	IV. 88
Crescentia	XXV. 766	Cyperoides	1052
Cressa	315	Cyperus	III. 67
Crinum	IX. 407	Cypripedium	VII. 1019
Crithmum	XLV. 342	Cytinus	XI. 1028
Crocus	VI. 56	Cytisus	XXXII. 881
Crotalaria	XXXII. 866	Daëtylis	IV. 87
Croton	XXXVIII. 1089	Dais	XXXI. 542
Crucianella	XLVII. 127	Dalea	898
Crucita	168	Dalechampia	XXXVIII.
Cucubalus	XXII. 568	1087	
Cucumis	XXXIV. 1098	Damasonium	462
Cucurbita	XXXIV. 1097	Daphne	XXXI. 487
Cuminoides	286	Datisca	LIV. 1138
Cuminum	XLV. 353	Datura	XXVIII. 247
Cunila	XLII. 35	Daucus	XLV. 335
Cunonia	558	Delima	675
Cupania	XXXVIII. 280	Delphinium	XXVI. 684
Cupressus	LI. 1085	Dens canis	416
Curatella	682	Dens leonis	916
Curcuma	VIII. 6	Dentaria	815
Cuscuta	171	Dianthera	XL. 28
Cyanella	X. 422	Dianthus	XXII. 567
Cycas	1228	Diapensia	XXI. 195
Cyclamen	XXI. 202	Dictamnus	XXVI. 524
Cydonia	629	Digitalis	XXVIII. 762
Cymbaria	XL. 755	Dillenia	691
Cynanchum	XXX. 306	Diodia	XLVII. 123
Cynara	XLIX. 932	Dioscorea	XI. 1128
Cynocrambe	1074	Diosma	273
		Dios-	

Diospyros	XVIII.	1167	Empetrum	LIV.	1106
Dipsacus		115	Ephedra	LI.	1142
Dorca	XXXI.	488	Ephemerum		400
Dodartia	XL.	784	Epidendrum	VII.	1020
Dodecatheon	XXI.	201	Epigæa	XVIII.	552
Dolichos	XXXII.	871	Epilobium	XVII.	473
Doronicum	XLIX.	963	Epimedium	XXIV.	149
Dorstenia	LIII.	159	Equisetum		1175
Draba		804	Eranthemum		23
Dracocephalum	XLII.		Erica	XVIII.	486
732			Erigeron	XLIX.	955
Dracontium	II.	1034	Erinus	XL.	775
Drosera	XIV.	393	Erioccephalus	929.XLIX.	
Dryas	XXXV.	640	998		
Drypis	XXII.	383	Eriocaulon	VI.	101
Duranta	XL.	790	Eriophorum	III.	69
Ebenus	XXXII.	899	Erithalis		239
Echinophora	XLV.	331	Erucago		827
Echinops	XLIX.	1003	Ervum	XXXII.	878
Echites	XXX.	300	Eryngium	XLV.	326
Echium	XLI.	192	Erysimum		818
Ehretia	XLI.	258	Erythrina	XXXII.	859
Elæagnus	XVI.	160	Erythronium	XI.	416
Elæocarpus		666	Erythroxyton		577
Elate		1232	Ethulia	XLIX.	938
Elaterium	1096.XXXIV.		Eugenia	XIX.	619
1042			Evolvulus	XXIX.	387
Elatine	754. XV.	504	Evonymus	XLIII.	272
Elephantopus	XLIX.	1001	Eupatorium	XLIX.	939
Elephas		744	Euphorbia	XXXVIII.	
Ellisia	790. XXVIII.	245	612		
Elvela		1220	Euphrasia	XL.	745
Elymus	1068. IV.	97	Exacum	XX.	142

Ex-

Excoecaria	XXXVIII.	Gale	1113
1108		Galega	XXXII. 894
Faba	877	Galenia	XIII. 494
Fabago	532	Galeopsis	722. XLII. 720
Fagara	XLIII. 151	Galium	XLVII. 126
Fagonia	XIV. 533	Garcinia	XVIII. 597
Fagus	L. 1078	Gardenia	XXX. 297
Ferraria	VI. 1022	Garidella	XXVI. 573
Ferrum equinum	889	Gaura	XVII. 472
Ferula	XLV. 345	Gaultheria	XVIII. 553
Festuca	89	Genipa	XXX. 241
Fevillea	XXXIV. 1124	Genista	862. XXXII. 863
Ficoides	631	Genista spartium	885
Ficus	LIII. 1174	Gentiana	XX. 324
Filago	XLIX. 999	Geoffræa	XXXII. 882
Filipendula	633	Geranium	XVI. 836
Flagellaria	V. 452	Gerardia	XL. 751
Fluvialis	1102	Geropogon	XLIX. 908
Foeniculum	366	Gesneria	XL. 753
Foenum græcum.	902	Gethyllis.	IX. 593
Fontinalis	1196	Geum	561. XXXV. 639
Fragaria	XXXV. 636	Ginora	608
Frangula	266	Gladiolus	VI. 58
Frankenia	XVII. 447	Glaux	XVII. 292
Fraxinella	524	Glecoma	XLII. 717
Fraxinus	XLIV. 1166	Gleditsia	XXXIII. 1165
Fritillaria	X. 413	Glinus	XXII. 613
Fuchsia	129	Globularia	XLVIII. 113
Fucus	1211	Gloriosa	XI. 415
Fumaria	XXIV. 853	Glycine	XXXII. 872
Fungoides	1220. 1222	Glycyrrhiza	XXXII. 886
Galanthus	IX. 403	Gmelina	XL. 767
Galax	277	Gnaphalium	999. XLIX.

<i>Gnaphalodes</i>	1000	774	
<i>Gnidia</i>	XXXI. 489	<i>Hedera</i>	XLVI. 284
<i>Gomphrena</i>	LIV. 316	<i>Hedyotis</i>	XLVII. 149
<i>Gorteria</i>	XLIX. 986	<i>Hedypnois</i>	920
<i>Gossypium</i>	XXXVII. 349	<i>Hedysarum</i>	XXXII. 891
<i>Govania</i>	1163	<i>Heisteria</i>	855. XII. 537
<i>Granadilla</i>	1025	<i>Helenium</i>	960. XLIX. 965
<i>Gratiola</i>	XL. 29	<i>Helianthus</i>	XLIX. 983
<i>Grewia</i>	XXXVII. 1031	<i>Helicteres</i>	XXXVIII.
<i>Grias</i>	662	1030	
<i>Grielum</i>	589	<i>Heliocarpus</i>	XXXVII.
<i>Grislea</i>	XVII. 476	609	
<i>Gronovia</i>	XXXIV. 283	<i>Heliophila</i>	820
<i>Grossularia</i>	282	<i>Heliotropium</i>	XLI. 180
<i>Guajacana</i>	1167	<i>Helleborine</i>	1016
<i>Guajacum</i>	XIV. 520	<i>Helleborus</i>	XXVI. 705
<i>Guajava</i>	618	<i>Helonias</i>	X. 460
<i>Guettarda</i>	XXXVIII.	<i>Hemerocallis</i>	X. 435
1070		<i>Hemionitis</i>	1182
<i>Guilandina</i>	XXXIII. 519	<i>Heracleum</i>	XLV. 347
<i>Gundelia</i>	XLIX. 1004	<i>Herba paris</i>	502
<i>Gypsophila</i>	XXII. 565	<i>Hermannia</i>	XXXVII. 832
<i>Hæmanthus</i>	IX. 402	<i>Hernandia</i>	XXXVIII.
<i>Hæmatoxylum</i>	XXXIII.	1035	
527		<i>Herniaria</i>	XII. 310
<i>Halesia</i>	XVIII. 599	<i>Hesperis</i>	821
<i>Halleria</i>	XL. 765	<i>Heuchera</i>	822
<i>Hamamelis</i>	170	<i>Hibiscus</i>	XXXVII. 850
<i>Hamelia</i>	233	<i>Hieracium</i>	XLIX. 917
<i>Harmala</i>	604	<i>Hillia</i>	446
<i>Hartogia</i>	XLVIII. 274	<i>Hippocastanum</i>	464
<i>Hasselquistia</i>	XLV. 343	<i>Hippocratea</i>	55
<i>Hebenstretia</i>	XLVIII.	<i>Hippocrepis</i>	XXXII. 889
		T	Hip-

Hippomane	XXXVIII.	Jalapa	243
1094.		Jambolifera	484
Hippophae	XVI. 1112	Jacquinia	255
Hippuris	1209. XV. 11	Jasione	XXIX. 1009
Hirtella	281	Jasminum	XLIV. 17
Holcus	IV. 1152	Jatropha	XXXVIII. 1090
Holoiteum	XXII. 105	Iberis	808
Hordeum	IV. 99	Ilex	1076. XLIII. 173
Horminum	39. XLII. 733	Illecebrum	XII. 294
Hottoria	XXI. 204	Illicium	614
Houstonia	XLVII. 125	Impatiens	XXIV. 1012
Hugonia	835	Imperatoria	XLV. 361
Humulus	LIII. 1122	Indigofera	XXXII. 893
Hura	XXXVIII. 1093	Inula	XLIX. 960
Hyacinthus	X. 429	Yontheaspis	811
Hyacinthus stell.	421	Ipomoea	XXIX. 217
Hydnum	1217	Iresine	LIV. 1112.
Hydrangea	XIII. 559	Iris	VI. 60
Hydrattis	707	Isatis	828
Hydrocharis	1132	Ischæmum	IV. 1154
Hydrocotyle	XLV. 327	Isnardia	XVII. 157
Hydrolea	320	Isoetes	1190
Hydrophyllum	205	Isopyrum	XXVI. 704
Hymenæa	XXXIII. 514	Itea	276
Hyoscyamus	XXXVIII. 248	Iva	XLIX. 1065
Hyoseris	XLIX. 920	Juglans	L. 1077
Hypocoum	XXIV. 172	Juncago	455
Hypericum	XX. 906	Juncus	V. 439
Hypnum	1201	Jungermannia	1202
Hypochæris	XLIX. 922	Juniperus	LI. 1140
Hypocistis	1028	Jussiaea	XVII. 540
Hypoxis	X. 419	Justicia	XL. 27
Hystopus	XLII. 712	Ixia	VI. 57
Jacobaea	957	Ixo-	

<i>Ixora</i>	XLVII. 132	<i>Lechea</i>	110
<i>Kæmpferia</i>	VIII. 7	<i>Lecythis</i>	667
<i>Kali</i>	313	<i>Ledum</i>	551 XVIII. 548
<i>Kalmia</i>	XVIII. 547	<i>Lemna</i>	LIV. 1044
<i>Ketmia</i>	850	<i>Lens</i>	879
<i>Kiggelaria</i>	XXXVII. 1134	<i>Lenticula</i>	1044
<i>Kleinhovia</i>	1029 XXXVII.	<i>Leontice</i>	XXIV. 425
<i>Knautia</i>	117	<i>Leontodon</i>	XLIX. 916
<i>Knoxia</i>	XLVII. 124	<i>Leontopetalon</i>	425
<i>Krameria</i>	162	<i>Leonurus</i>	XLII. 725
<i>Kuhnia</i>	XLIX. 238	<i>Lepidium</i>	805
<i>Lachnæa</i>	XXXI. 492	<i>Leucadendron</i>	XLVIII.
<i>Lacryma Job</i>	1049		III
<i>Lactuca</i>	XLIX. 913	<i>Leucojum</i>	819 IX. 404
<i>Lætia</i>	664	<i>Leysera</i>	XLIX. 969
<i>Lagerstroemia</i>	670	<i>Lichen</i>	1204. 1208
<i>Lagoecia</i>	286	<i>Ligusticum</i>	XLV. 348
<i>Lagurus</i>	IV. 93	<i>Ligustrum</i>	XLIV. 18
<i>Lamium</i>	XLII. 719	<i>Lilac</i>	22
<i>Lantana</i>	XL. 769	<i>Lilio-Asphodelus</i>	435
<i>Lappa</i>	927	<i>Lilio-Hyacinthus</i>	421
<i>Lapsana</i>	XLIX. 923	<i>Lilio-Narcissus</i>	408
<i>Larix</i>	1083	<i>Lilium</i>	X. 412
<i>Laserpitium</i>	XLV. 346	<i>Lilium convallium</i>	427
<i>Lathræa</i>	XL. 747	<i>Limeum</i>	LIV. 465
<i>Lathyrus</i>	XXXII. 876	<i>Limodorum</i>	1013. VII.
<i>Lavandula</i>	XLII. 714		1017
<i>Lavatera</i>	XXXVII. 846	<i>Limon</i>	905
<i>Laugieria</i>	260	<i>Limonia</i>	536
<i>Laurus</i>	XII. 505	<i>Limofella</i>	XXI. 780
<i>Lawsonia</i>	484	<i>Linagroftis</i>	69
		<i>Lingua cervina</i>	1184
		<i>Linnæa</i>	XLXIII. 778

Linum	XIV.	391	Malus	629
Lippia	XLVII.	785	Mammea	652
Liquidambar		1082	Mangifera	279
Liriodendrum	LII.	692	Manibot	1090
Lithospermum	XLI.	182	Maranta	VIII. 5
Lobelia	XXIX.	1010	Marcgravia	XXV. 643
Loeflingia	XXII.	53	Marchantia	1204
Loefelia		771	Marrubium	XLII. 724
Lolium	IV.	96	Marsilea	1188
Lonchitis	1185.	1183	Martynia	XL. 757
Lonicera	XLVIII.	234	Matricaria	XLIX. 971
Loranthus	XLVIII.	445	Matthiola	1237
Lotus	XXXII.	901	Mays	1048
Ludwigia	XVII.	154	Medeola	XI. 457
Lunaria		813	Medicago	XXXII. 903
Lupinus	XXXII.	869	Melampodium	XLIX. 993
Lupulus		1122	Melampyrum	XL. 746
Luteola		611	Melanthium	X. 456
Lychnis	XXII.	586	Melastoma	XVII. 546
Lycium	XXVIII.	263	Melia	XXIII. 529
Lycoperdon		1223	Melianthus	XXIV. 799
Lycopodium		1191	Melica	IV. 83
Lycopsis	XLI.	191	Melicocca	474
Lycopus	XLII.	33	Melissa	XLII. 731
Lygeum	IV.	71	Melittis	XLII. 734
Lysimachia	XX.	206	Melochia	XXXVII. 833
Lythrum	XVII.	607	Melopepo	1097
Macrocnemum	XXX.	226	Melothria	XXXIV. 51
Magnolia	LII.	793	Memecylon	483
Malacoides		847	Menais	240
Malope	XXXVII.	847	Menispermum	XI. 1137
Malpighia	XXIII.	574	Mentha	XLII. 716
Malva	XXXVII.	845	Mentzelia	XVII. 673
			Me-	

Menyanthes	XXI. 203	Morinda	XLVIII. 236
Mercurialis	XXXVIII.	Morisonia	XXV. 645
1131		Morsus ranæ	1132
Mesembryanthemum		Morus	LIII. 1061
XIII. 631		Moschatellina	503
Mespilus	XXXVI. 628	Mucor	1224
Mesua	668	Muntingia	XXXVII. 654
Methonica	415	Musa	VIII. 1147
Meum	340	Mussaenda	242
Michelia	LII. 694	Myagræum	800
Microcos	XXXVII. 665	Myginda	179
Micropus	XLIX. 1000	Myosotis	587. XLI. 181
Milium	IV. 80	Myosurus	XXVI. 396
Millefolium	975	Myrica	L. 1113
Millieria	XXXIII. 1164	Myriophyllum	XV. 1072
Mimulus	XL. 787	Myrsine	XVIII. 270
Mimusops	XII. 480	Myrtus	XIX. 620
Minuartia	XXII. 108	Najas	1102
Mirabilis	243	Nama	XIII. 319
Mitchella	XLVIII. 135	Napæa	XXXVII. 842
Mitella	XIII. 563	Narcissus	IX. 405
Mnium	1199	Nardus	IV. 70
Moehringia	XXII. 496	Nasturtium	805
Molle	1136	Nauclea	224
Mollugo	XXII. 107	Nepenthes	1023
Moluccella	XLII. 727	Nepeta	XLII. 713
Momordica	XXXIV. 1096	Nerium	XXX. 298
Monarda	XLII. 37	Neurada	XIII. 590
Monnieria	XXIV. 854	Nicotiana	XXVIII. 249
Monotropa	538	Nigella	XXVI. 688
Montia	102	Nissolia	XXXII. 857
Moræa	VI. 61	Nitraria	605
Morina	XLVIII. 41	No-	

Nolana	XLI. 194	Orobus	XXXII. 873
Nux	1077	Orontium	II. 437
Nyctanthes	XLIV. 16	Ortegia	XXII. 52
Nymphæa	LIV. 656	Orvala	XLII. 718
Nyssa	XII. 1169	Oryza	IV. 450
Obolaria	XL. 782	Osbeckia	XVII. 469
Ochna	660	Osmites	XLIX. 987
Ocimum	XLII. 735	Osteospermum	XLIX. 996
Oenanthe	XLV. 354	Osyris	XVI. 1107
Oenothera	XVII. 471	Othonna	XLIX. 997
Olex	46	Ovieta	XL. 791
Oldenlandia	XLVII. 155	Oxalis	XIV. 584
Olea	XLIV. 20	Padus	623
Olyra	IV. 1051	Pæderota	26
Omphalea	1045	Pæonia	XXVI. 681
Onagra	471	Panax	XLVI. 1172
Onoclea	1176	Pancrätium	IX. 406
Ononis	XXXII. 867	Panicum	IV. 77
Onopordum	XLIX. 931	Papaver	XXVII. 651
Onosma	XLI. 188	Papaya	1133
Ophioglossum	1178	Parietaria	LIII. 1158
Ophiorrhiza	XLVII. 211	Paris	XI. 502
Ophioxylon	1148	Parkinsonia	XXXIII. 515
Ophrys	VII. 1015	Parthassia	386
Opulus	372	Parthenium	XLIX. 1064
Opuntia	616	Paspalum	IV. 76
Orchis	VII. 1013	Passerina	XXXI. 491
Origanum	XLII. 729	Passiflora	XXXIV. 1025
Ornithogalum	X. 420	Pastinaca	XLV. 364
Ornithopus	XXXII. 888	Patagonula	XLI. 209
Ornus	1166	Pavetta	XLVII. 133
Orobanche	XL. 783	Paullinia	XXIII. 499
Orobanchoides	538	Pectis	XLIX. 967

Pedaliū	XXVIII.	798	Phlomis	XLII.	726
Pedicularis	XL.	750	Phlox	XX.	215
Peganum	XXVI.	604	Phoenix		1230
Pelecinus		897	Phryma	XL.	741
Peltaria		810	Phytica	XLIII.	267
Penæa	855.	139	Phyllanthus	XXXVIII.	
Pentapetes	XXXVII.	838		1056	
Penthorum	XIII.	582	Phyllis	XLVII.	325
Peplis	XVII.	448	Physalis	XXVIII.	251
Pepo		1097	Phyteuma	XXIX.	221
Perdiciū	XLIX.	964	Phytolacca	LIV.	591
Periploca	XXX.	305	Picris	XLIX.	911
Perilla		742	Pilularia		1189
Persica		622	Pimpinella	1075.	XLV.
Persicaria		497		368	
Pervinca		296	Pinguicula	XXIV.	30
Petesia		134	Pinus	LI.	1083
Petiveria	XII.	461	Piper	II.	44
Petrea	XL.	768	Piscidia	XXXII.	860
Peucedanum	XLV.	341	Pisonia		1168
Peziza		1221	Pistacia	L.	1114
Phaca	XXXII.	895	Pistia	LIV.	1027
Phalangium		424	Pisum	XXXII.	874
Phalaris	IV.	75	Plantago		143
Phallus		1218	Platanus	L.	1081
Pharnaceum	XXII.	381	Plinia		674
Pharus	IV.	1069	Plukenetia	XXXVIII.	
Phascum		1195		1086	
Phaseolus	XXXII.	870	Plumbago		214
Phellandrium	XLV.	355	Plumeria	XXX.	299
Philadelphus	XIX.	617	Poa	IV.	84
Phillyrea	XLIV.	19	Podophyllum	XXVII.	649
Phleum	IV.	78	Poinciana	XXXIII.	517
			Po-		

Polemonium	XXIX.	213	Pforalea	XXXII.	898
Polianthes		428	Psychotria	XLVII.	235
Polycarpon	XXII.	106	Ptelea		153
Polycnemonum	XII.	54	Pteris		1180
Polygala	XXXIII.	855	Pterocarpus	XXXII.	858
Polygonoides		683	Pteronia	XLIX	941
Polygonum	XII.	497	Pulmonaria	XLI.	185
Polymnia	XLIX.	991	Pulsatilla		697
Polypodium		1185	Punica	XXXVI.	621
Polypremum	XXII.	138	Pyrola	XVIII.	556
Polytrichum		1198	Pyrus	XXXVI.	629
Pontederia	VI.	401	Quamoclit		217
Populago		706	Quassia	XIV.	531
Populus	L.	1129	Quercus	L.	1076
Porella		1192	Queria	XXII.	109
Porrum		411	Quinquefolium		637
Portlandia		228	Quinquina		229
Portulaca	XIII.	606	Quisqualis	XXXI.	541
Potamogeton	XV.	175	Rajania	XI.	1127
Potentilla	XXXV.	637	Randia		212
Poterium	LIV.	1075	Ranunculus	XXVI.	702
Pothos	II.	1036	Rapa		824
Prasium	XLII.	740	Raphanus		826
Prenanthes	XLIX.	915	Rapunculus		221
Primula	XXI.	198	Rapuntium		1010
Prinos	XLIII.	443	Rauvolfia	XXX.	294
Prockia		677	Reaumuria	XIII.	689
Proserpinaca	XV.	103	Renealmia		398
Protea	XLVIII.	112	Reseda	LIV.	611
Prunella	XLII.	738	Rhabarbarum		508
Prunus	XXXVI.	623	Rhacoma		145
Pseudoacacia		883	Rhamnoides		1112
Psidium	XIX.	618	Rhamnus	XLIII.	266
			Rhee-		

Rheedia	644	Ruppia	1037. XV. 176
Rheum	XII. 508	Ruscus	XL. 1145
Rhexia	XVII. 470	Ruta	XXVI. 525
Rhinanthus	XL. 744	Saccharum	IV. 74
Rhizophora	XII. 595	Sagina	XXII. 177
Rhodiola	XIII. 1130	Sagittaria	V. 1073
Rhododendrum	XVIII. 550	Salicaria	607
		Salicornia	XII. 10
Rhodora	XVIII. 549	Salix	L. 1104
Rhus	XLIII. 371	Salsola	XII. 313
Ribes	XXXVI. 262	Salvadora	164
Riccia	1206	Salvia	XLII. 39
Richardia	XLVII. 441	Sambucus	XLIII. 374
Ricinoide	1039	Samolus	XXI. 223
Ricinus	XXXVIII. 1091	Samyda	545
Ricotia	814	Sanguinaria	XXVII. 648
Rivinia	XII. 163	Sanguisorba	LIV. 147
Robinia	XXXII. 883	Sanicula	XLV. 328
Roella	220	Santalum	482
Rondeletia	225	Santolina	XLIX. 946
Roridula	304	Sapindus	XXIII. 501
Rosa	XXXV. 634	Saponaria	XXII. 566
Rosmarinus	XLII. 38	Sarcocolla	XX. 385
Ros solis	393	Sarracenia	LIV. 655
Royena	XVIII. 557	Sassafras	505
Rubeola	127	Satureja	XLII. 710
Rubia	XLVII. 128	Satyrium	VII. 1014
Rubus	XXXV. 635	Saururus	44. II. 466
Rudbeckia	237. XLIX. 984	Sauvagesia	287
		Saxifraga	XIII. 501
Ruellia	XL. 788	Scabiosa	XLVIII. 116
Rumex	XII. 453	Scandix	XLV. 359
Rumphia	48	Scheuchzeria	V. 454
		V	Schre-

Schinus	XLIII. 1136	Sideritis	XLII. 713
Schoenus	III. 66	Sideroxylum	XLIII. 265
Schrebera	321	Sigesbeckia	XLIX. 977
Schwalbea	XL. 748	Silene	XXII. 569
Scilla	X. 421	Siliqua	1173
Scirpus	III. 68	Siliquastrum	512
Schleranthus	XXII. 564	Silphium	XLIX. 990
Scolymus	XLIX. 926	Sinapis	825
Scoparia	XL. 144	Sinapistrum	830
Scorpiurus	XXXII. 890	Siphonanthus	130
Scorzonera	XLIX. 910	Sifon	XLV. 351
Scriphium	1007	Sisymbrium	817
Scrophularia	XL. 760	Sisyrinchium	60.VI. 1021
Scutellaria	XLII. 737	Sium	XLV. 350
Secale	IV. 98	Sloanea	L. 658
Sedum	XIII. 581	Smilax	XI. 1126
Seguiera	679	Smyrnium	XLV. 365
Selago	XLVIII. 773	Solandra	XXXVIII. 1067
Selinum	XLV. 339	Solanoidea	163
Sempervivum	XIII. 615	Solanum	XXVIII. 252
Senecio	XLIX. 467	Soldanella	XXI. 200
Septas	XIII. 467	Solidago	XLIX. 959
Serapias	VII. 1016	Sonchus	XLIX. 912
Seriola	XLIX. 921	Sophora	XXXII. 510
Seriphium	XLIX. 1007	Sorbus	XXXVI. 626
Serratula	XLIX. 928	Sparganium	III. 1047
Sesamum	XXVIII. 786	Spartium	XXXII. 862
Seseli	XLV. 362	Spathelia	375
Sesuvium	XIII. 627	Spergula	XXII. 588
Sherardia	XLVII. 494	Spermacoce	XLVII. 120
Sibbaldia	XXXV. 395	Sphæranthus	XLIX. 1002
Sibthorpia	779	Sphagnum	1193
Sicyos	XXXIV. 1100	Sphondilium	347
Sida	XXXVII. 841	Spi-	

Spigelia	XLVII.	210	Tamarindus	47
Spinacia	XII.	1118	Tamarix	XIII. 377
Spiræa	XXXVI.	633	Tamus	XI. 7125
Splachnum		1197	Tanacetum	XLIX. 948
Spondias		579	Tarchonanthus	XLIX.
Stachys	XLII.	722		944
Stæhelina	XLIX.	942	Targionia	1203
Stapelia	XXX.	309	Taxus	LI. 1141
Staphilea	XXIII.	376	Telephioides	1101
Statice	XLVIII.	390	Telephium	LIV. 379
Stellaria	13. XXII.	570	Tenga	1229
Stellera	XXXI.	490	Terebinthus	1114
Stemodia	XL.	781	Ternatea	873
Sterculia	XXXVIII.	1092	Tetracera	696
Stewartia	XXXVII.	851	Tetragonia	XIII. 630
Stipa	IV.	91	Tetragonotheca	XLIX.
Stoebe	XLIX.	1005		980
Stramonium		247	Teucrium	XLII. 709
Stratiotes		690	Thalia	VIII. 8
Strumpfia	XLIX.	1006	Thalictrum	XXVI. 700
Strychnos	XXVIII.	254	Thapsia	XLV. 363
Styrax	XVIII.	598	Thea	XXXVII. 671
Suber		1076	Theligonum	LIII. 1074
Subularia		803	Theobroma	XXXVII. 904
Suriana	XIII.	583	Theophrasta	208
Symphytum	XLI.	186	Thesium	XXXI. 293
Symplocos		680	Thlaspi	806
Syringa	617. XLIV.	22	Thlaspidium	812
Swertia	XX.	323	Thryallis	XXXVIII. 535
Swietenia	LIV.	523	Thuja	LI. 1084
Tabernæmontana	XXX.		Thymbra	XLII. 711
	302		Thymelæa	487
Tagetes	XLIX.	968	Thymus	XLII. 730
			Thys-	

<i>Thysselinum</i>		339	<i>Trientalis</i>	XX.	463
<i>Tiarella</i>	XIII.	562	<i>Trifolium</i>	XXXII.	900
<i>Tilia</i>	XXXVII.	663	<i>Triglochin</i>	V.	455
<i>Tillæa</i>	XIII.	178	<i>Trigonella</i>	XXXII.	902
<i>Tillandsia</i>	X.	398	<i>Trillium</i>	XI.	458
<i>Tinus</i>	372. XII.	506	<i>Triopteris</i>	XXIII.	576
<i>Tithymalus</i>		612	<i>Trionitum</i>	XLVIII.	235
<i>Toluifera</i>		526	<i>Triplaris</i>		104
<i>Tomex</i>	XLIII.	152	<i>Triplacum</i>	IV.	1050
<i>Tordylium</i>	XLV.	332	<i>Triticum</i>	IV.	100
<i>Torenia</i>	XL.	758	<i>Triumfetta</i>	XXXVII.	603
<i>Tormentilla</i>	XXXV.	638	<i>Trollius</i>	XXVI.	703
<i>Tournefortia</i>	XLI.	193	<i>Tropæolum</i>	XXIII.	468
<i>Toxicodendron</i>		371	<i>Trophis</i>	XIV.	1109
<i>Tozzia</i>	XL.	749	<i>Tulipa</i>	X.	417
<i>Trachelium</i>	XXIX.	222	<i>Turnera</i>	XXXVII.	378
<i>Tradescantia</i>	VI.	400	<i>Turritis</i>		823
<i>Tragacantha</i>		896	<i>Tussilago</i>	XLIX.	956
<i>Tragia</i>	XXXVIII.	1054	<i>Typha</i>	III.	1046
<i>Tragopogon</i>	XLIX.	909	<i>Vaccinium</i>	XVIII.	485
<i>Tragoselinum</i>		368	<i>Valantia</i>	XLVII.	1157
<i>Trapa</i>		158	<i>Valeriana</i>	XLVIII.	45
<i>Tremella</i>		1210	<i>Valezia</i>	XXII.	449
<i>Trevia</i>		1238	<i>Vallisneria</i>		1103
<i>Trianthema</i>	XIII.	539	<i>Vanilla</i>		1020
<i>Tribuloides</i>		158	<i>Varronia</i>	XLI.	259
<i>Tribulus</i>	XIV.	534	<i>Vateria</i>		669
<i>Trichilia</i>	XXIII.	530	<i>Vella</i>		801
<i>Trichomanes</i>	1184. 1187		<i>Veratrum</i>	X.	1150
<i>Trichosanthes</i>	XXXIV.		<i>Verbascum</i>	XXVIII.	246
	1095		<i>Verbena</i>	XL.	32
<i>Tricostema</i>	XLII.	736	<i>Verbesina</i>	XLIX.	979
<i>Tridax</i>	XLIX.	976	<i>Veronica</i>	XL.	25

Viburnum	XLIII.	372	Waltheria	XXXVII.	831
Vicia	XXXII.	877	Weinmannia		495
Vinca	XXX.	296	Winterania	XII.	601
Viola	XXIX.	1011	Xanthium	XLIX.	1062
<i>Virga aurea</i>		959	Xeranthemum	XLIX.	951
Viscum	XLVIII.	1111	Ximenia		479
Vitex	XL.	794	Xylopia	LII.	1032
Vitis	XLVI.	285	Xyris	VI.	65
<i>Vitis idæa</i>		485	Yucca	X.	431
Ulex	XXXII.	885	Zamia		1232
Ulmus	LIII.	318	Zannichellia	XV.	1040
Ulva		1212	Zanonia	63.	1123
Uniola	IV.	86	Zanthoxylum	XLVI.	
Volkameria	XL.	792		1115	
Urena	XXXVII.	848	Zea	IV.	1048
Urtica	LIII.	1060	Zinnia	XLIX.	978
Utricularia	XXIV.	31	Zizania	IV.	1068
Uvaria	LII.	695	Ziziphora	XLII.	36
Uvularia	XI.	414	Zosteria	II.	1037
<i>Vulneraria</i>		868	Zygophyllum	XIV.	532
Wachendorfia	VI.	62			

48 Rumphia
 50 Canocladia.
 228 Pontlandia.
 261 Brunfelsia.
 281 Histella.
 473 Chamænexion.
 482 Sandalum.
 934 Crocodilodes.
 984 Rudbeckia.
 1007 Scriphium.
 1039 Gynomorium.
 1097 Cuaurbita.
 1133 Rapaya.
 1191 Selaginoides.
 1193 Sphnagnum.

pag. 283 Linnæa
 XLXIII.

Rumphia
 Camocladia.
 Portlandia.
 Brunsfelsia.
 Hirtella.
 Chamænerion.
 Santalum.
 Crocodiloides.
 Rudbeckia.
 Seriphium.
 Cynomorium.
 Cucurbita.
 Papaya.
 Selaginoides.
 Sphagnum.

XLVIII.



[illegible]

Michelazzi, Augustinus

Compendium regni vegetabilis ...

Goritium 1770

Phyt. 460

urn:nbn:de:bvb:12-bsb10302520-0